

**Printed and Published by K Mittra, at The Indian Press, Ltd.,
Allahabad.**

समर्पण

अपने परम सुयोग्य गुरु

आसोदा-निवासी स्वामी मित्रसेनजी महाराज

के

चरण-कमलों में

परम शङ्कर और भक्तिपूर्वक

समर्पित

भूमिका

स्थियों के गर्म और बच्चों के पालन-पोषण के सम्बन्ध का यह पुस्तक माता-पिताओं के लाभ के लिए और विशेषतः ऐसी माताओं के लिए लिखी गई है जो अपनी शक्ति भर स्वयं अपना स्वास्थ्य भी बनाये रखना चाहती है और यह भी चाहती है कि हमारी सन्तान ठीक तरह से बढ़ती रहे। मनुष्यजाति के लिए यह विषय बहुत ही आवश्यक है, और विशेषतः भारत के लिए तो राष्ट्रीय दृष्टि से इसका और भी अधिक महत्व है, जहाँ समाज में स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों के बारे में लोगों में अनेक प्रकार के सिद्ध्या विश्वास, गहरे पक्षपात और बहुत बड़ी अज्ञानता फैली हुई है। इस पुस्तक में सब बातें बहुत ही सीधे सादे ढंग से और ऐसी भाषा में बतलाई गई हैं जिसमें विशेष पारिभाषिक शब्द नहीं हैं; और ऐसा इसी लिए किया गया है कि सब प्रकार के लोग इससे लाभ उठा सकें। चिकित्सा-सम्बन्धी ड्योरे की बातें छोड़ दी गई हैं; क्योंकि चिकित्सा का काम अच्छे चिकित्सकों पर ही छोड़ना चाहिए। माता-पिता को अपने बच्चों की चिकित्सा आप नहीं करनी चाहिए।

चिकित्सा-विज्ञान के विद्यार्थियों और चिकित्सकों के लिए भी यह पुस्तक विशेषरूप से उपयोगी है। चिकित्सा-शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तो यह इस दृष्टि से उपयोगी है कि इसमें प्रसव और छोटे बच्चों की देख-रेख और रक्त के सम्बन्ध की जानने योग्य सभी बातें अच्छी तरह बतलाई गई हैं; और चिकित्सकों के लिए यह पुस्तक इस दृष्टि से उपयोगी है कि इसमें उन अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया है जो नियमप्रति चिकित्सकों के सामने उपस्थित होते हैं। इस देश के और यूरोप के लेखकों ने इस विषय पर जो ग्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं,

उनके आधार पर तो यह पुस्तक लिखी ही गई है, पर इसका बहुत सा अंग उस अनुभव और निरीक्षण पर भी अपना आधार रखता है, जो मैंने वीस वर्षों तक चिकित्सा करके प्राप्त किया है।

इस पुस्तक में यारह प्रकरण रखे गये हैं। पहला प्रकरण विषय-प्रवेश के रूप में है और उसमें यह बतलाया गया है कि छोटी अवस्था के बच्चों के मरने के क्या क्या कारण हैं, विवाह करने से पहले वर और कन्या के अच्छे स्वास्थ्य का कितना महत्व है, छोटी अवस्था के बच्चों का ब्याह करने से क्या क्या हानिर्या होती है और वर तथा कन्या की अवस्था में बहुत अन्तर होने से क्या क्या दोष होते हैं। दूसरा प्रकरण गर्भवती स्त्री के सम्बन्ध में है और उसमें यह बतलाया गया है कि उसके स्वास्थ्य की अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसे कौन सी खास खास वीमारियां होती हैं और उसे किस प्रकार बचना चाहिए। तीसरे प्रकरण में मैंने यह बतलाया है कि जन्म लेने के समय बच्चे की देख-रेख और रक्त के लिए क्या क्या करना चाहिए। चौथा प्रकरण कठान्चित् सबसे अधिक महत्व का है। वह स्वयं नये जन्मे हुए बच्चे के सम्बन्ध में है; और उसे वैज्ञानिक ढंग से दूध पिलाने के सम्बन्ध में जितनी कठिन समस्याएँ हैं, उन सब पर विचार किया गया है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए दाँड़ नियुक्त करने के सम्बन्ध में जिन बातों का विचार होना चाहिए, उनका वर्णन पांचवें प्रकरण में है। छठे प्रकरण में यह बतलाया गया है कि बच्चे से माता का दूध किन अवस्थाओं में और किस प्रकार हुड़ना चाहिए जिसमें उसे कोई हानि न पहुँचने पावे। बनाघटी तरीके से दूध पिलाने के महत्वपूर्ण विषय का विवेचन सातवें प्रकरण में किया गया है। नये जन्मे हुए बच्चे के सम्बन्ध की जो और फुटकर वार्ते हैं, जैसे बच्चे की साधारण स्वास्थ्य-रक्षा, दाँत निकलने के समय होनेवाली खुराकियां, उनकी साधारण शारीरिक वृद्धि, उन्हें होनेवाले रोग और विकार, आठतों और चरित्र का बनना विगड़ना आदि और इसी प्रकार

की और दूसरी बातों का उसके बाद के तीन प्रकरणों में वर्णन है। इस विषय के इतने ही बड़े दूसरे अन्यों में ये बातें जितने विस्तार के साथ बताई गई हैं उनकी अपेक्षा इस पुस्तक में वे बातें बहुत अधिक विस्तार के साथ दी गई हैं। अन्त का प्रकरण ख्राब दिमाग्-बाले बच्चों के सम्बन्ध में है और वह चिकित्सकों तथा साधारण जनता दोनों के लिए ही समानरूप से मनोरंजक और शिक्षाप्रद है। समाज-शास्त्र की इष्टि से यह विषय बहुत ही महत्व का है; क्योंकि भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें ख्राब दिमाग्-बाले बच्चों की देख-रेख की जाती हो; और इसी लिए इस विषय का अपेक्षाकृत कुछ अधिक विस्तार किया गया है और उसके लिए अधिक स्थान दिया गया है।

मैंने यह शिक्षाप्रद और काम की पुस्तक इसलिए लिखी है जिसमें खियों की मृत्यु और रोग कम हों और छोटी अवस्था के बच्चों के मर जाने के कारण मानव-जीवन का जो भीषण नाश होता है, वह घटे। भारत और सारे संसार के आजकल के जीवन में यह सबसे अधिक दुःखद बात है जो अभी तक बनी हुई है।

मूल पुस्तक झंगरेज़ी में है। तीन वर्ष हुए वह विलायत में छपी थी। वहाँ और भारत में उसका खूब स्वागत हुआ था। अतएव लेखक ने उचित समझा कि सार्वजनिक हित के लिए इसका उद्योग अनुवाद भी छापा जाय। उद्योग अनुवाद इतना लोकप्रिय हुआ कि पंजाब-सरकार के शिक्षा-विभाग ने इसकी एक सहज प्रतिरूप खरीद की और लेखक को साढ़े सात सौ रुपया पुरस्कार में दिया।

अब उसी का हिन्दी-अनुवाद जनता की सेवा में मैंट किया जा रहा है। अधिक संभव यही है कि इस प्रकार की पुस्तक पहले हिन्दी में कोई नहीं छपी। इस देश की अधिकांश माताओं और बहनों को स्वयं इसे पढ़ने और इससे जाम उठाने का अवसर पूरे तौर पर हिन्दी-भाषान्वत्तर से ही हो सकता है। वे इसके अध्ययन से देखेंगी कि यह

पुस्तक नन्हे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के रोगों को रोकने के लिए कितनी उपयोगी है।

मैं बाबू रामचन्द्र वर्मा को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होने अतीव सावधानी से हिन्दी-भाषा-भाषी जनता के लिए इसका हिन्दी-भाषान्तर तैयार किया है।

अपने परम भित्र श्रीयुत सन्तरामजी बी० पू० का मैं यथेष्ट रूप से धन्यवाद नहीं कर सकता कि जिन्होंने अपने निजी काम को परे रखकर बड़े प्रेम से ग्रफो का संशोधन किया है।

मैं मैनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने पुस्तक को बहुत सावधानी से प्रकाशित किया है।

प्रभु से प्रार्थना है कि वे अपनी अपार दया से उस उद्देश्य में जिससे यह पुस्तक लिखी गई है अपना आशीर्वाद प्रदान करें।

मेलाराम रोड, } बोधराज चौपडा,
जाहौर } एम० बी०, सी-एच० बी० (एडिनबरा)

विषय-सूची

प्रकरण	विषय			पृष्ठ
१	छोटे बच्चों की मृत्यु और उसके कारण	१
२	गर्भिणी माता	१२
३	जन्म के समय से बालक की रक्षा	६२
४	बच्चों को दूध पिलाना	७०
५	दूध पिलानेवाली दाढ़ी	१००
६	दूध कुड़ाना	१०८
७	कृत्रिम रूप से भोजन देना	११४
८	बच्चों की स्वास्थ्य-रक्षा	१५६
९	बच्चों की उचित वृद्धि और विकास	१६५
१०	बच्चों के कुछ साधारण और कूटवाल्से रोग	२०६
११	बच्चों में मस्तिष्क के विकार	२३६

—

माँ और बच्चा

पहला प्रकरण

छोटे बच्चों की मृत्यु और उसके कारण

पाठकों से निवेदन—इस प्रकरण में आप लोगों को वे अनेक कारण बताये जायेंगे जिनसे छोटे छोटे बच्चे बहुत अधिक मरते हैं। आप इन कारणों को बहुत अच्छी तरह समझें, क्योंकि जब ये कारण अच्छी तरह समझ में आ जायेंगे, तब छोटी अवस्था के बच्चों का मरना बहुत कुछ रुक जायगा। इनमें कुछ कारण तो ऐसे हैं जो आपके वश के बाहर के होंगे। पर कुछ कारण ऐसे भी होंगे जो शोहा सा विचार करने और ध्यान रखने से दूर किये जा सकेंगे। इससे आपका भी भला होगा और आपके बच्चों का भी। इससे एक बात तो अवश्य ही दूर की जा सकेगी। आज-रुक सभी तरह के लोग यह बात अच्छी तरह नहीं जानते कि नये जन्मे हुए छोटे छोटे बच्चों को पालने-जो सने के मुख्य नियम क्या हैं; और उन्हीं नियमों को न जानने के कारण सारे संसार में नये जन्मे हुए बच्चे बहुत मरते हैं। इन बातों को जान लेने से वह अज्ञान अवस्था दूर हो सकेगा।

भारत में छोटे बच्चों की मृत्यु और रोग—इस देश में हर साल बहुत अधिक छोटे छोटे बच्चे मरते हैं। जितने ज्यादा बच्चे यहां मरते हैं, उतने ज्यादा संसार के और किसी सभ्य देश में नहीं मरते। यह बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं; इसलिए बड़ी बड़ी संख्यायें देकर इस बात का प्रमाण देने

की अवश्यकता नहीं है^१। तो भी हम यह बतला देते हैं कि भारत में एक वरस के अन्दर २०,००,००० के क़रीब नये जन्मे हुए बच्चे मरते हैं। एक साल के अन्दर इतनी जानें का जाना ऐसी बात है कि उसके बारे में कुछ अधिक कहने की ज़रूरत नहीं है। जिन कारणों से इतने अधिक बच्चे मरते हैं, वे कारण सब लोगों का जान लेने चाहिएँ; क्योंकि कोई देश इतना अधिक जानें का व्यर्थ जाना सह नहीं सकता। जहाँ और कहाँ बातों से यह जाना जाता है कि किसी देश की सरकार अच्छी है या बुरी, वहाँ एक इस बात से भी जाना जाता है कि वहाँ के नये जन्मे हुए बच्चों में से कितने मरते और कितने बचते हैं। सरकार को इस बात की बहुत अच्छी तरह जाँच करानी चाहिए और नये जन्मे हुए बच्चों की रक्षा के लिए वह जो नये उपाय करे, उनका हर साल एक ध्योरा तैयार करके छपवाना चाहिए।

१—विटिश साम्राज्य के और और देशों में नये जन्मे हुए कितने कितने बच्चे मरते हैं, इसका एक क्षेत्र (भारत-सरकार के स्वास्थ्य-विभाग के कमिशनर की सन् १९२४ वाली सालाना रिपोर्ट से लेकर) यहाँ दिया जाता है। इसे देखकर पाठक सभी सर्वेंगे कि हमारे देश में और देशों से कितने अधिक बच्चे मरते हैं।

सन् १९२४ में एक वरस से छोटे बच्चों के प्रति १००००० मरने का ध्योरा

भारत.....	१८६०	आस्ट्रेलिया.....	८७०८,
इंग्लैड और वेल्स....	७५०,	न्यूज़ीलैंड.....	४०२३,
स्काटलैंड....	६७७, कनाडा (क्वेबेक को छोड़कर)	७१००,	
सन् १९२४ में यहा जितने बच्चे हुए थे, उनमें से प्रति हजार			
१८६ बच्चे मर गये थे। पर सन् १९२३ में प्रति हजार १७६ और सन् १९२२ में प्रति हजार १७५ बच्चे ही मरे थे। इससे यह साफ़ पता चल जाता है कि छोटे बच्चों के मरने की संख्या बराबर बढ़ रही है। इसे रोकने की ओर स्वास्थ्य-विभाग के अधिकारियों को तुरन्त ध्यान देना चाहिए।			

ये तो छोटे बच्चों के मरने के बहुत से कारण हैं, पर लोगों की जानकारी के लिए यहाँ उनमें से कुछ बड़े बड़े कारण बतला दिये जाते हैं। जब इसके मुख्य कारण समझ में आ जायेंगे, तब लोग इन्हें दूर करने के उपाय भी सहज में समझ लेंगे।

व्याह से पहले माता-पिता (स्त्री और पुरुष) की अच्छी तन्दुरुस्ती—यदि व्याह से पहले लड़की और लड़का दोनों स्त्रीब तन्दुरुस्त न हो, तो फिर यह आशा नहीं करनी चाहिए कि इन दोनों से जो सन्तान होगी, वह भी अच्छी और तन्दुरुस्त होगी। इस-लिए व्याह करके गृहस्थी मे पैर रखने से पहले लड़की और लड़के दोनों को स्त्री तन्दुरुस्त होना चाहिए। यह एक तुर्भाग्य की बात है कि भारत मे लोगों को व्याह का तो बहुत चाव रहता है, पर वे लड़कों और लड़कियों की तन्दुरुस्ती पर पूरा ध्यान नहीं देते। इसके सिवा यह बात भी सभी जगह देखने मे आनी है कि व्याह-शादी में तो लोग व्यर्थ बहुत सा धन लुटाते हैं, पर लड़कों और लड़कियों की तन्दुरुस्ती सुधारने के लिए बहुत ही कम खर्च करते हैं। इन बातों मे हमारे समाज मे इस समय जो विचार फैले हुए हैं, उन्हें एक सिरे से बदल देने की आवश्यकता है। हम लोगों मे ऐसी बहुत सी रसमे हैं जो सूखतापूर्ण, व्यर्थ और मिथ्या विश्वास के कारण हैं; और उन रसमों को अदा करने के कारण कभी कभी लोग अपने लड़के या लड़की का व्याह करने के बाद विलक्षण दरिद्र हो जाते हैं और उस दरिद्रता के हुए फल भोगते हैं। उदाहरण के लिए, लोग व्याह करने से पहले ज्योतिषियों के पास जाते हैं। पर हमारी समझ मे यदि लोग इसके बदले मे किसी अच्छे डाक्टर आदि से लड़के या लड़की के भावी कल्याण के लिए सलाह ले लिया करे, तो बहुत अच्छा हो। प्रायः देखा जाता है कि कुछ जवान लड़के व्याह करने के बाद बहुत दिनों तक नहीं जीते और थोड़े या बहुत दिनों तक बीमार

रहकर मर जाते हैं। ऐसे लोगों के मरने के कई कारण होते हैं। छाह के बाद इतनी जलदी मर जानेवाले लोगों में से बहुतों के मरने का कारण प्रायः यह देखा जाता है कि पहले से ही उन्हें लथनोग या हृदय का और कोई रोग रहता है। ऐसी दशाओं में जो रोग पहले से बना रहता है, वह ना-समझी से अधिक सम्भोग करने के कारण और भी ज़ोर पकड़ता है, और जब शरीर का ठीक ठीक व्यान नहीं रखा जाता और उसे पुष्ट करनेवाले पदार्थ नहीं मिलते, तब नतीजा यह होता है कि लड़का या लड़की जलदी मर जाते हैं।

जब भाता और पिटा दोनों कमज़ोर होते हैं और उनकी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं होती, तब उनसे उपक्रम होनेवाली सन्तान भी जितनी तन्दुरुस्त होनी चाहिए, उतनी तन्दुरुस्त नहीं होती। सभी रोगों को सहने और उनका मुकाबला करने की शक्ति बहुत कम होती है, जिससे वे सहज में सब प्रकार के छूटवाले रोगों के शिकार हो जाते हैं, और उन पर जल्दी ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जो उनकी तन्दुरुस्ती बिगड़ देते हैं और जिनसे उनके जलदी मरने का भय होता है। इस कारण बच्चे बहुत दिनों तक बीमार रहते हैं और प्रायः अन्त में मर भी जाते हैं।

छोटी उमर में ब्याह—यह भी समाज में फैला हुआ एक दूसरा दोष है। इसे सभी लोग दोष मानते हैं लेकिन इसना होने पर भी यह दोष आज दिन तक भी उसी तरह चला चलता है, जिस तरह आज से दस या बीस वरस पहले चलता था। हमारी जाति पर इस दोष के जो बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, वे बहुत ही सहज में सभी जा सकते हैं; उनका अनुमान करने के लिए बहुत बड़ी कल्पना-शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जिस लड़की के भीतरी अंग पूरी तरह से बढ़े और विकसित न हुए हों, उसके गर्भ से ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जिसके सब अंग पूरी तरह से बढ़े हुए हों। इसलिए इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लड़कियों का छाह उसी समय होना चाहिए, जब उनकी अवस्था अधिक हो जाय,

जब वे अच्छी युवती हो जायें। भारत बहुत बड़ा देश है और इसके भिन्न भिन्न प्रदेशों से लड़कियों के जीवन होने की उमर कहीं कम और कहीं अधिक होती है। परन्तु फिर भी सभी अवस्थाओं में यह निश्चय समझ रखना चाहिए कि अगर सोलह वरस से कम उमर में लड़की का ब्याह होगा और उसी बीच में उसे गर्भ रह जायगा, तो उसकी भी तन्हुरुस्ती ख़राब हो जायगी और उससे उत्पन्न होनेवाली सन्तान भी तन्हुरुस्त न हो सकेगी। कच्ची उमर की लड़कियों के पेट से जो सन्तान होती है, वह स्वभावतः दुबली-पतली और कमज़ोर होती है। उनमें जीवन-शक्ति बहुत ही कम होती है, उन्हें अनेक ग्राकार के रोग बहुत जलदी हो जाते हैं और बहुत ही छोटी अवस्था में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हमारे यहाँ छोटे बच्चे जो इतनी अधिक ^१सुख्या में भरते हैं, उसका एक सुख्य कारण छोटी अवस्था में लड़कों और लड़कियों का ब्याह होना है। हमारी समझ में अब ऐसा समय आ गया है जब कि हमारे समाज का यह दोष दूर करने के लिए एक सरकारी कानून बन जाना चाहिए जो अनुभवी चिकित्सकों की सम्मति के अनुकूल हो^२।

पति और पत्नी की अवस्थायें—पति और पत्नी दोनों की अवस्थाओं में बहुत अधिक अन्तर भी इन्हीं सब कारणों से डुरा और निष्ठनीय है। जिन माता-पिता की अवस्थाओं में बहुत अधिक फ़ूँक होता है, उनके बच्चों में से भी प्रायः बहुत से बच्चे ऐसे ही होते हैं जो शरीर से भी दुर्बल होते हैं और मन से भी और जो जीवन की कठिनाईयों सहने के योग्य नहीं होते। ऐसे माता-पिता के बच्चों का दिमाग् प्रायः ठीक नहीं होता, उनमें बहुत से मानसिक दोष होते हैं।

१—मूल पुस्तक के छप जाने के बाद प्रसिद्ध शारदा विल कानून बन गया है जिससे १८ वरस से कम उमर के लड़कों और १४ वरस से कम उमर की लड़कियों का ब्याह नहीं हो सकता।—अनुवादक।

जिन वच्चों में ऐसे भानसिक दोप हों, उनसे प्रायः अच्छे जीवन की वहुत ही कम आशा की जा सकती है और वे जन्म से मृत्यु तक सदा अपने माता-पिता के लिए एक बोल से बने रहते हैं। प्राण-शक्ति कम होने के कारण उनमें से वहुत से वच्चे तो वहुत ही छोटी घमर में मर जाते हैं।

लड़कियों पर आज-कल की शिक्षा के प्रभाव——हमारे देश में इधर थोड़े दिनों से लड़कियों को आज-कल के ढंग की शिक्षा दी जाने लगी है। चिकित्सा-शास्त्र के जानकार लोग प्रायः यह कहते हैं कि आज-कल के स्कूलों में लड़कियों को जो शिक्षा दी जाती है, उससे कुछ लड़कियों की तन्द्रुरस्ती ख़राब हो जाती है। यह ठीक है कि कोई समझदार आदमी कभी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जिस प्रकार की शिक्षा लड़कों को दी जाती है, उसी प्रकार की शिक्षा पाने का लड़कियों को जन्मासिद्ध अधिकार है। पर लड़कों और लड़कियों के शारीर की बनावट में जो विशेष अन्तर है, उसके कारण लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शिक्षा का पाठ्य-क्रम निश्चित करने में अधिक ध्यानपूर्वक जुनाव करने की आवश्यकता होती है। वहुत अधिक पुस्तकें पढ़ने और वह भी विशेषतः विदेशी भाषा के द्वारा पढ़ने और परीक्षा में पास होने की चिन्ता करने के कारण जबान खियों के स्वास्थ्य पर अनावश्यक रूप से ज़ोर पड़ता है। और जब उन्हे शारीरिक व्यायाम या कसरत करने के लिए मुनासिब सलाह नहीं मिलती, तो स्वास्थ्य के लिए शिक्षा के ये द्वारे प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं। जो माता-पिता अपनी लड़कियों को पढ़ाना-खिलाना चाहते हों, उन्हे सदा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन लड़कियों को अपना शारीर और स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए पूरी स्वतन्त्रता और सुभीता मिलता रहे। हमारी जाति या राष्ट्र के लिए यह बात वहुत अधिक महत्व की और ध्यान देने योग्य है; क्योंकि हमारी लड़कियों को माता के रूप में जो परम पवित्र कार्य और कर्त्तव्य करने पड़ते हैं, उन्हें

छोटे बच्चों की मृत्यु और उसके कारण

७

ठीक तरह से पूरा करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की होती है कि जिस समय वे स्कूल में पढ़ती हों, उस समय उनका शरीर भी ठीक तरह से बराबर बढ़ता रहे, उनकी तन्त्रुरस्ती खुराक न होने पावे।

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियाँ—

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियों के जो हुए प्रभाव होते हैं, उनसे भी बहुत से छोटे बच्चे मर जाते हैं। क्लॉ-करकट या गन्दगी, गन्दी हवा या खुराक नलों और सेरियों आदि का साधारणतः सारे समाज के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है; पर छोटी अवस्था के बच्चों पर तो उनका और भी जल्दी बुरा प्रभाव होता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इन परिस्थितियों का उन स्थियों की तन्त्रुरस्ती पर भी कुछ कम बुरा असर नहीं पड़ता, जिन्हें दिन-रात प्रायः घरों में बन्द रहना पड़ता है। उन्हें दिन-रात बैठे रहने की आदत पड़ जाती है; उनका मन बुझ सा जाता है और वे प्रायः बैचैन और अप्रसन्न या दुखी सी रहती हैं। साधारणतः उनकी तन्त्रुरस्ती खुराक हो जाती है और उनमें से बहुत सी बांक भी हो जाती हैं। ऐसी माताओं से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, वे प्रायः बहुत ही दुष्करो-पत्तरों और कमज़ूर होते हैं। वे या तो बराबर बीमार रहते हैं और या जल्दी मर जाते हैं। इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि साफ़ हवा में रहने और घर के बाहर धूमने-फिरने या तरह तरह की कसरतें करने से शरीर में बहुत साफ़ खून बनता है। केवल उन्हीं जातियों में सबसे अच्छे बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं जिनकी स्वास्थ्य-सम्बन्धी और रहन-सहन की अवस्थाएँ सन्तोषजनक होती हैं और जो स्वास्थ्यप्रद खुस्ती हवा में अपना बीवन बिताती हैं।

दरिद्रता और सामाजिक अवस्थाएँ—छोटे बच्चों के बहुत अधिक मरने के जो बहुत से कारण हैं, उनमें से बहुत से कारणों

की जड़ दरिद्रता या गुरीबी है। इसी के कारण बहुत सी माताओं को शरीर का पोषण करनेवाले ठीक और पूरे द्रव्य नहीं मिलते; और इसी लिए उनके बच्चों का भी ठीक ठीक पोषण नहीं होता। इसका फल यह होता है कि उनके बच्चे जन्म से ही स्वास्थ्य और शक्ति के विचार से घाटे में रहते हैं—वे न तो तन्दुखस्त रहते हैं और न उनमें प्राण-शक्ति होती है। इसके सिवा जिस भोजन में शरीर को युष्ट करने-वाला अंश कम होता है, उस भोजन से बच्चों के शरीर की बाढ़ आरम्भ में ही खड़ जाती है।

गुरीब लोग प्रायः ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है और उनके छोटे बच्चों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। गुरीब माता-पिताओं के बहुत से लड़कों को आवश्यक वस्तुएँ नहीं मिलतीं और वे प्रायः कढ़ी सरदी या गरमी में खुले पड़े रहते हैं, जिससे उनमें रोगों को रोकने की या सहने की शक्ति कम हो जाती है और अन्त में वे मर जाते हैं। भारत में छोटी लड़कियों पर इस दिनिता का और भी बुरा प्रभाव होता है। पुराने ज़माने में तो बहुत अधिक गुरीबी और परम्परा से लड़कियों का होना बुरा समझने के कारण माता-पिता जान-दूर कर छोटी लड़कियों को मार डालते थे। आज-कल भी जब वे बीमार हो जाती हैं, तब लड़कों की अपेक्षा उनके इसाज आदि का बहुत ही थोड़ा ध्यान रखा जाता है; और माता-पिता के व्यवहार के इस कारण भी बहुत सी लड़कियां छोटी अवस्था में ही मर जाती हैं।

धन-दौलत की दृष्टि से भी मध्यम श्रेणी या औसत दर्जे के लोगों को अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर ठीक ठीक ध्यान देने में कठिनाइयां होती हैं। वे उनके लिए पूरे पूरे सुमित्रे नहीं कर सकते। इधर कुछ दिनों से लोगों के रहन-सहन का ख़र्च तो बहुत बढ़ गया है और उन्हे पहले से आराम की भी ज्यादा ज़्यादत होने लग गई है, पर आज-कल सब लोगों को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए बहुत अधिक महँगे

और प्रयत्न करने पड़ते हैं जिससे इधर कुछ दिनों से उनकी आमदनी कम होने लग गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अच्छा और पौष्टिक भोजन बहुत ही कम मिलने लगा है। प्रायः उन लोगों को बहुत अधिक चिन्ता करनी पड़ती है। इसका उनके बच्चों के शरीर और मन दोनों पर बहुत ही हुरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से कुछ लड़के ऐसे निकल आते हैं, जिनके मस्तिष्क का तो ठीक ठीक विकास हो जाता है, पर इसके लिए उन्हे प्रायः अपने शरीर का स्वास्थ्य गँवा देना पड़ता है। उनमें से बहुत से लड़के ऐसे ही होते हैं जो अधिक दिनों तक नहीं जीते। अब मध्यम श्रेणी के लोगों में दिन पर दिन ऐसे वंश बहुत ही कम होते जाते हैं, जिनमें लोग बहुत अधिक दिनों तक जीते हैं।

भारत में जो लोग धनवान् हैं, वे छोटे बच्चों का पालन-पोषण करने में विशेषरूप से अनजान हैं। दूसरी श्रेणियों की जियों को ऐसी वास्तों की जितनी जानकारी होती है, धनवानों की स्त्रियों को उससे अधिक जानकारी नहीं होती। इसके विपरीत प्रायः यही देखने में आता है कि वे घर-गृहस्थी के काम-काज से बहुत उदासीन रहती हैं, उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देती। यो देखने में यही जान पड़ता है कि धनवानों के यहाँ छोटे बच्चे कम मरते हैं; पर इसका सुख्ख कारण यह है कि उनके यहाँ बच्चे होते ही कम हैं और उनकी काम-वासना जीवन की और और बातों में लग या बँट जाती है।

घर में बेंगा इलाज—बच्चों के अधिक मरने का एक कारण यह भी है कि जब वे बीमार होते हैं, तब पहले घर में ही उनका मनमाना और बेंगा इलाज होने लगता है। घर में जो बड़ी बूढ़ी स्त्री होती है, वह बीमार बच्चों का इलाज करने के लिए बहुत ही उपयुक्त और योग्य समझी जाती है। यदि घर में कोई बड़ी बूढ़ी नहीं होती तो पास-पड़ोस की कोई स्त्री इस काम के लिए हुला ली जाती है; या इससे भी बढ़कर बुरी बात यह होती है कि कोई ऐसा हुड्डा

आदमी पकड़ लिया जाता है जो इलाज करना बिलकुल जानता ही नहीं। इस तरह के अटकल पच्चू इलाज के जो हुरे परिणाम होते हैं, उनका अनुभान सहज में ही किया जा सकता है; और यह एक ऐसी प्रथा है जो बहुत ही निन्दनीय है।

विज्ञापनों की दवाएँ—आज-कल अखबारों आदि में जिन बहुत सी दवाओं के विज्ञापन लिकलते हैं, उन दवाओं का व्यवहार करने से भी इसी प्रकार के फल होते हैं। जिस दवा के बारे में अखबारों में बहुत धमधारम से विज्ञापन दिये जाते हैं, भोजे-भाजे लोग उन दवाओं का बहुत व्यवहार करते हैं। जिन दवाओं के विषय में इस बात का पता ही न हो कि ये किन किन चीज़ों से बनी हैं, उनका व्यवहार करने से अनेक प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं, और विशेषतः छोटे बच्चों पर तो उनका बहुत ही बुरा प्रभाव हो सकता है। अपनी दवाओं का बहुत अधिक विज्ञापन देनेवाला आदमी तो बहुत सा धन कमा लेता है, पर सर्व-साधारण की उन दवाओं से बहुत हानि होती है।

फ़क़ीरों और साधुओं की दवायें—भारतवर्ष के लोग इस प्रकार की भी बहुत सी दवाओं का व्यवहार किया करते हैं। आज-कल के फ़क़ीर और साधु भी वैसे ही संसारी होते हैं, जिस प्रकार और चिकित्सा करनेवाले लोग होते हैं। फ़क़ीरी दवाओं के बारे में लोग यह तो जानते ही नहीं कि यह क्या चीज़ है, पर सीधे सावे लोगों का उन पर विश्वास बहुत अधिक होता है; और वे लोग अपनी दवायें भी बड़ी तरकीब से देते हैं। इसलिए उनका काम बहुत मज़े में चलता है। जब केवल अन्धविश्वास के कारण बिना समझे-हूसे बच्चों का इस प्रकार का इलाज किया जाता है, तब प्रायः उन बच्चों की जान पर आ बनती है। इस प्रकार के इलाज से सर्वसाधारण को बहुत सचेत रहना चाहिए।

छोटी अवस्था के बच्चों के मरने के जो अनेक कारण हैं, उनमें से कुछ कारण ऊपर बतला दिये गये हैं। हून कारणों का जानकर

हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे कौन से उपाय हैं जिनसे मनुष्य के जीवन का यह नाश रोका जा सकता है। आगे के प्रकरणों में हमने विस्तार के साथ इस बात पर विचार किया है कि इन सब बातों में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि मनुष्य के जीवन की इन विकट समस्याओं के सम्बन्ध में लोगों में जो अज्ञान फैला हुआ है, वह दूर हो जायगा और लोगों का ध्यान इन बातों में सुधार करने की ओर जायगा।

दूसरा प्रकरण

गर्भिणी माता

गर्भिणी मानाओं से निवेदन—आप लोगों से ये बातें बहुत ही गम्भीर भाव से कही जाती हैं। हस्त प्रकरण में आपकी और आपके कल्याण की बातें कही गई हैं। इसका एक एक पृष्ठ आप बहुत ध्यान से पढ़ें; और हस्त प्रकरण में जो नहीं नहीं बातें बतलाई गई हैं, उनके हर एक अंग को बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करें। हस्त प्रकरण में आपसे जो जो बातें करने के लिए कहा गया है, उन सब बातों पर आप तब तक थार थार विचार करें, जब तक वे पूरी तरह से आपकी समझ में न आ जायें और आप उनके अनुसार चलने के योग्य न हो जायें। इन पृष्ठों में जो बातें बतलाई गई हैं, आपको उन बातों के अनुसार पूरी तरह से चलने और धैर्य-पूर्वक उनके अनुसार काम करने की आवश्यकता है। आपको कम से कम अपनी तन्तुरस्ती का स्वयं बढ़ाकर ज्ञान रक्षना चाहिए। गर्भ के दिनों ने आपको जितनी शारीरिक और मानविक कठिनाइयाँ होंगी, उन सब कठिनाइयों को दूर करने में आपको इन मुच्चनाओं से बहुत अधिक सहायता मिलेगी।

गर्भ के लक्षण—जिन चिह्नों को पहले से अनुभव नहीं होता, उन्हें कठिनता से अपने गर्भवती होने का पता चलता है। आगे जो लक्षण बतलाये गये हैं, उनसे हर एक खी यह समझ सकती है कि वह गर्भवती है या नहीं।

(१) मासिक धर्म का बन्द होना—मासिक धर्म का मत-खब है जननेन्द्रिय से खून जाना। ऐसा खून प्रायः एक एक महीने के अन्तर पर जाया करता है। यह जवान या बालिंग होने के समय से आरम्भ होता है और प्रायः ४५ वर्ष की अवस्था तक जारी रहता है। पर लड़कियों के जवान या बालिंग होने की सब जगह कोई एक उम्र नहीं है। ठंडे देशों में लड़कियां कुछ देर से जवान या बालिंग होती हैं और गरम देशों में उससे कुछ पहले ही हो जाती हैं। भारत में लड़कियों को प्रायः बारह बरस की उम्र से ही खून जाना शुरू हो जाता है। यह खून तीन से पाँच दिनों तक जाता रहता है। कुछ लियों को खून जल्दी जल्दी जाता है और कुछ को देर से। इसी प्रकार कुछ को अधिक दिनों तक जाता है और कुछ को कम दिनों तक।

जिस समय गर्भ रहता है, उस समय खून जाना बन्द हो जाता है; और जब तक गर्भ रहता है, तब तक नहीं जाता। यह गर्भ रह जाने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। प्रायः बहुत सी लियां ऐसी ही होती हैं जो मासिक-धर्म बन्द होते ही यह समझ लेती हैं कि इसे गर्भ रह गया है। परन्तु शरीर में खून की कमी या पूरा भोजन न मिलना आदि और भी कहै ऐसी अवस्थायें हैं, जिनमें मासिक-धर्म बन्द हो जाता है। यदि किसी कारण से मन में कोई भय समा जाय, तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी जिस लियों को पहले बराबर हर महीने ठीक तरह से खून जाता हो, उसका खून बढ़ बन्द हो जाय, तब उसे यही समझना चाहिए कि गर्भ रह गया है।

(२) सवेरे के समय तबीयत खुराव रहना और जी मिचलाना—गर्भवती होने का यह दूसरा लक्षण है; पर यह लक्षण सभी लियों में नहीं पाया जाता, केवल कुछ लियों में ही होता है। गर्भ रह जाने पर शुरू के कुछ महीनों में सवेरे के समय लियों की तबी-

यत बहुत भारी या ख़राब जान पड़ती है और उसे मिचली आती है। कभी कभी यह बात सवेरे के समय न होकर दिन में और किसी समय भी होती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि गर्भवाली खी की पाचन-किया बिगड़ जाती है, उसे भोजन ठीक तरह से नहीं पचता। बहुत सी छिर्यां सवेरे सवेरे गरम पानी का एक कटोरा पीकर ही इस कपड़ से कुटकारा पा जाती हैं। कुछ अवस्थाओं में ऐसा होता है कि वह गरम पानी पेट से फिर झुँह के रास्ते बाहर निकल जाता है और वह खी दोपहर को भोजन करने के बोग्य हो जाती है।

(३) स्तनों में परिवर्तन—गर्भ रहने के बाद दूसरे महीने में गर्भवती खी के स्तन या छातिर्या बढ़ी होने लगती है और उनके ऊपर की छुंडियां कुछ बड़ी और कड़ी हो जाती हैं। यदि कोई चीज़ उनसे छू जाय तो तुरन्त ही पता लग जाता है; और कभी कभी उनमें थोड़ा दर्द भी होता है।

(४) जलदो जलदा पेशाव होना—यह भी गर्भवती होने का एक और लक्षण है। गर्भ रहने के शुरू के कुछ हफ्तों से ही ऐसा होता है; और इसका कारण यह होता है कि गर्भाशय का मूद्राशय पर दबाव पड़ता है। धीरे धीरे यह बात दूर हो जाती है।

(५) चौक्ज़ी पर जी चाहना और तबीयत चलना—प्रायः ऐसा होता है कि खाने-पीने की नई, विलक्षण और अस्वाभाविक चौक्ज़ी पर मन चलता है; नये रंग-ठंडा में रहने को जी चाहता है और मन के भाव बदलते रहते हैं। ऐसा होने पर भी खी को समझ लेना चाहिए कि वह गर्भवती है।

(६) गर्भ में बच्चे की गति—यह एक बहुत महस्त्र का लक्षण है। यह प्रायः गर्भ रहने के अठारहवें सप्ताह में दिखलाई पड़ता है। इसमें माता को पहले-पहल ऐसा जान पड़ता है मानो बच्चा गर्भ के अन्दर हृधर-उधर हिलता हुलता है।

यदि इन लक्षणों में से कई लक्षण एक साथ ही दिखाई पड़ें तो समझ लेना चाहिए कि गर्भ रह गया है।

कुछ लियाँ यह आशा करती है कि डाक्टर, वैद्य या हकीम आदि केवल हमारी नाड़ी देखकर ही यह बतला देंगे कि हमें गर्भ है या नहीं। वे यह समझती हैं कि डाक्टरों आदि को नाड़ी की अवस्था से ही गर्भ का पता चल जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि गर्भ रहने पर स्त्री की नाड़ी में कुछ परिवर्तन होते हैं, पर केवल नाड़ी देखकर कभी यह नहीं बतलाया जा सकता कि इस स्त्री को गर्भ है या नहीं। जो स्त्री अपने गर्भ का निरचय करना चाहती हो, उसे या तो ध्यान से यह देखना चाहिए कि उसमें ऊपर बतलाये हुए लक्षण हैं या नहीं; और या खूब अच्छी तरह से अपनी डाक्टरी परीक्षा करनी चाहिए।

गर्भिणी माता का सबसे पहला कर्तव्य—साधारणतः
यही कहा जा सकता है कि जब मासिक बन्द हो जाय, तबीयत कुछ ख़राब या भारी जान पड़ने लगे, खाने-पीने की इच्छा बदल जाय और स्तन बढ़े हो जायें, तो स्त्री को सचेत हो जाना चाहिए। जब उसे अयने गर्भवती होने का विश्वास हो जाय, तब उसका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह जहाँ तक हो सके, अपनी तन्दुख्ती बनाये रखने का प्रयत्न करे और इसके लिए वह अपनी सारी शक्तियाँ लगा दे।

गर्भिणी माता के स्वस्थ रहने के नियम

परिस्थितियाँ—गर्भिणी स्त्री के आस-पास चारों ओर सभी बातें ऐसी होनी चाहिए जिसमें वह सदा सुखी और प्रसन्न रहे। यदि परिस्थितियाँ ऐसी न हों तो उनमें सुधार करके उन्हें ऐसा बनाना चाहिए, जिसमें वह सदा प्रसन्न रहे। इससे गर्भवती स्त्री का मन बहुत अच्छी तरह बहला रहेगा। प्रसन्नता शरीर को सबसे अधिक

पुष्ट करनेवाली चीज़ है। जिन बातों से चित दुःखी या अप्रसन्न होता हो, उन सब बातों से गर्भवती स्त्री को बहुत बचना चाहिए; क्योंकि यदि मन दुःखी और चिन्तित रहता है तो गर्भ के वच्चे पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

ताज़ी हवा — ताज़ी हवा से खूब साफ़ होता है। जहाँ तक हो सके, सदा खुली हवा में रहना और बड़े हवादार और खुले हुए कमरे में सोना गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। ताज़ी हवा से कभी किसी आदमी को किसी तरह की हानि नहीं पहुँचती। जो स्थिया साधारणतः ऐसे कमरों, घरों या गलियों में रहती हों जिनमें और भी बहुत से लोग रहते हों और जहाँ बहुत भीड़-भाड़ रहती हो, उन्हें उचित है कि वे नित्य सबेरे और सन्ध्या के समय और झट्ठु को देखते हुए जब अच्छा और उपयुक्त समय मिले, बाहर निकल-कर ऐसे स्थान में चली जाया करें जहाँ उन्हें खुली और साफ़ हवा मिल सकती हो।

व्यायाम या कृसरत — भारतीय स्थिया अच्छी तरह यह बात नहीं जानती कि नियमपूर्वक व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं। जो अमीर स्थिर्या मोटरों और गाढ़ियों पर सबार होकर हृधर-उधर धूम सकती है, वे समझती है कि हँस प्रकार धूम फिरकर हवा खा आने से ही कृसरत हो जाती है। पर यह बात नहीं है। यदि साधारणतः शरीर को तन्दुरुस्त और मज़बूत रखने के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, तो गर्भवती स्त्री के लिए गर्भ के दिनों में नियम से कृसरत करना और भी आवश्यक है। अबहुत सी स्थियों के लिए तो सबेरे और सन्ध्या के समय कुछ दूर तक टहल लेना ही बहुत होगा। जब तक डाक्टर आदि खास तौर पर मना न करें तब तक गर्भ की अवस्था में स्थियों को चराचर अपने नित्य के सब काम सदा की भाँति करने चाहिए। उन्हें न तो कभी बहुत अधिक आराम करना चाहिए,

न चुपचाप खाली बैठे रहना चाहिए और न खुली हवा का व्यायाम छोड़ना चाहिए। उन्हें काम-धन्धा छोड़कर और विलकुल सुस्त होकर कभी बैठना नहीं चाहिए; क्योंकि गर्भ के दिनों में इस तरह सुस्त होकर बैठे रहने से कई प्रकार के छोटे-मोटे रोग हो जाते हैं। जो लोग बड़े आदमी और सम्पन्न होते हैं, वे बड़े अभिमान से कहा करते हैं कि हमारे घर में गर्भवती स्त्री से कभी कोई काम-धन्धा नहीं कराया जाता। परन्तु इससे बहुत हानि होती है, क्योंकि पाचन-क्रिया बिगड़ जाती है। घर-गृहस्थी के छोटे-मोटे और हल्के काम करते रहने से बहुत अच्छी कसरत हो जाती है और स्त्री का शरीर ठीक और मन प्रसन्न रहता है। गर्भवती स्त्री बहुत जल्दी थक जाती है; इसलिए उसे सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जो कसरत या काम-धन्धा करे, उससे उसका शरीर बहुत अधिक थककर विलकुल शिथिल न हो जाय। सब प्रकार के विकट व्यायाम, जैसे दौड़ना, कूदना, छुड़-सवारी, नाचना, टेनिस या बैडमिन्टन आदि खेलना विलकुल छोड़ देने चाहिए। मतलब यह कि कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे शरीर बहुत अधिक हिले-हुए या उसे झटका लगे। न तो कभी कोई भारी काम करना चाहिए और न भारी चीज़ें उठानी चाहिए; क्योंकि इससे खून जाने लगता है और कच्चा गर्भ गिर जाता है। यदि गर्भ रहने से तीन महीने के अन्दर ही बच्चा बाहर निकल जाय, तो उसे कच्चा गर्भ शिरना कहते हैं। सीढ़ियों पर से या दूसरे बहुत ऊचे स्थानों पर से नीचे उतरने के समय बहुत सावधानी से पैर रखने चाहिए। जल्दबाज़ी करने से बहुत हानि होती है। जहाँ तक हो सके, सब प्रकार की यात्राओं आदि से बचना चाहिए। यदि सड़क बहुत साफ़ हो और भोटर या गाड़ी इतने थीरे थीरे चले कि शरीर को झटका न लगे, तो इन सवारियों पर यात्रा करने से कोई हानि नहीं होती।

स्नान—गर्भवती स्त्रियों को सदा नियम से स्नान करना चाहिए, जिसमें उनके शरीर का ऊपरी चमड़ा सदा साफ़ रहे। शरीर की

स्वचा का या ऊपरी चमड़े का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक और महत्व की बात है। इस पर पूरा पूरा ध्यान न रखने से तन्हुरुस्ती विगड़ती है। स्नान के लिए झट्ठु के अनुसार ठंडे या गरम पानी का व्यवहार करना चाहिए।

कपड़े—कपड़े अलग अलग झट्ठु के अनुसार होने चाहिए। वे हल्के, ढीले और गरम होने चाहिए। गर्भ की अवस्था में सरदी आदि से बचने के लिए जाडे के दिनों में गरम कपड़े आवश्यक होते हैं। बहुत तंग कपड़े और कमर से बचने की पेटी आदि का व्यवहार बिलकुल छोड़ देना चाहिए। शरीर पर पहनने के कपड़े इतने हीले होने चाहिए कि पहनने पर ऐसा जान पड़े कि मानो वे कन्धों पर टैंगे हुए हैं और उनके कारण पेट पर किसी तरह का दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इन दिनों ऐसे जूते पहनने चाहिए जिनकी ऐंडिया बहुत ऊँची न हों, बल्कि नीची हों।

आराम और सोना—आराम करना भी बहुत आवश्यक है। दिन में कुछ देर तक अवश्य आराम करना चाहिए, पर बहुत अधिक देर तक आराम भी न करते रहना चाहिए। जिन लिंगों के पहले दो एक बार गर्भ गिर चुके हों, उन्हें इस बात पर और भी अधिक ध्यान देना चाहिए।

मन प्रसन्न रखना—गर्भ में आये हुए बच्चे के रूप और उण स्थिर करने में मन बहुत अधिक काम करता है। साधारणतः सभी समय और विशेषतः सन्तान उत्पन्न करने के समय माता-पिता के मन की जैसी अवस्था रहती है और गर्भ की अवस्था में माता जिस प्रकार की बाते सदा सुना करती है, उनका बालक के रूप और उणों पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही उसके शरीर के रंग पर भी प्रभाव पड़ता है। कोई स्त्री तो धर्म और नीति की बहुत अच्छी अच्छी और मनुष्य को बहुत उन्नत बनानेवाली बाते सुनती है या वहे वहे

महात्माओं के जीवन-चरित आदि पढ़ती है; और कोई जी रही और चाहियात और दुराचार आदि की बातें सुनती रहती है। इन सब बातों का गर्भ और उसमे आये हुए बालक पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती जी को सदा अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए और केवल ऐसे ही आदियों के साथ रहना चाहिए जिनके स्वरूप, चाल-चलन और बात-चीत से मन प्रसन्न रहे। यूरोप की जातियों में यह एक बहुत ही अच्छी चाल है कि ब्याह के बाद पति और पती दोनों मिलकर कहीं बाहर चले जाते हैं और वहाँ या तो अच्छी अच्छी प्राकृतिक शोभाओं की सैर करते हैं और या ऐतिहासिक महत्व की जीजे और स्थान आदि देखते हैं। माता-पिता के हृदय पर इस प्रकार के दृश्यों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उत्पन्न होनेवाली सन्तान पर उस प्रभाव का बहुत अच्छा परिणाम होता है। ऐसी अवस्था में मन में उत्पन्न होनेवाले भावों से बहुत सहायता मिलती है। जब जी बराबर मनुष्य-जाति के अच्छे से अच्छे लोगों का ध्यान और विचार करती रहती है, तब वह सन्तान भी आदर्श ही उत्पन्न करती है। उसके विरुद्ध यदि उसके मन में भय या इसी तरह के और दूसरे दुर भाव उत्पन्न होते रहते हैं, तब वह सन्तान भी ऐसी ही उत्पन्न करती है जिसमें अनेक दोष और त्रुटिया होती है।

सम्भोग—गर्भ रहने पर आरम्भ के तीन महीनों में और अन्त के एक महीने में पति और पती को सम्भोग से बिलकुल बचना चाहिए। यदि आरम्भ के तीन महीनों में सम्भोग हो, तो उससे खून जाने और कच्चा गर्भ गिर जाने का भय रहता है; और यदि अन्तिम महीने में सम्भोग किया जाय, तो अंश की मिल्ली फट जाने का डर रहता है जिससे बच्चा होने के समय या उसके बाद माता के खून में झूर फैल जाता है। जिन जीयों को बराबर कच्चा गर्भ गिर जाया करता हो, उन्हें गर्भ के आरम्भिक महीनों में पुरुष के साथ सम्भोग करने से बहुत बचना चाहिए।

जननेनिद्र्याँ—जननेनिद्र्याँ को सदा बहुत साफ़ रखने का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि इस ओर ध्यान न दिया जाय, तो उसमें सुझली या जलन आदि होने लगती है जो बहुत अधिक कष्ट देती है।

दाँत—दाँतों के किसी अच्छे चिकित्सक से बातों की परीक्षा करा लेनी चाहिए। यदि मसूड़ों में मवाद दिखाई पड़े, तो सचेत हो जाना चाहिए। जब मसूड़ों में मवाद आ जाता है तब प्रसव के समय छी में रोगों को रोकने की शक्ति कम हो जाती है और उसकी तन्दुरुस्ती ग्राघः बिगड़ जाती है। गर्भ के दिनों में दाँतों पर पूरा पूरा ध्यान न देने के कारण प्रसव के बाद बहुत सी लिंगों के शरीर में ज़हर फैल जाता है जिससे वे मर जाती है।

भोजन—गर्भ की अवस्था में भोजन पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। गर्भवती छी की तन्दुरुस्ती पर भी भोजन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और गर्भ से आये हुए बालक पर भी। गर्भवती लिंगों को बहुत से रोग ग्राघः इसी लिए हो जाते हैं कि उनका भोजन ठीक और जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। गर्भ के दिनों में सब प्रकार के रोगों से बचे रहने के लिए नीचे बतलाई हुई बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और इन सूचनाओं के अनुसार चलना चाहिए।

भोजन सदा सादा, शरीर को पुष्ट करनेवाला और अच्छा होना चाहिए। मक्खन, घी, गौ के दूध, ताजे फल, तरकारी और रोटी में वे सभी चीजें रहती हैं जिनका भोजन के पदार्थों में रहना आवश्यक है। यदि छी को मांस आदि या पशुओं से मिलनेवाला भोजन ही अच्छा लगता हो, तो साधारणतः और विशेषकर ऐसी अवस्था में जब कि उसका मन चले, वह मांस, अंडे, मछली और मुग़ँ आदि खा सकती है। यदि आदत या इच्छा होने पर भी ये सब चीजें उसे

बिलकुल ही न मिले, तो उसकी तन्दुरुस्ती कुछ बिगड़ जायगी। पर गरिष्ठ मांस, सब प्रकार का पचने में भारी और वासी भोजन, गरम चपतियाँ और बहुत अधिक मसालोवाली तरकारियाँ आदि बिलकुल नहीं खानी चाहिएँ। भारतवर्ष जैसे गरम देश में यदि स्थिता मांस न खायें तो अच्छा ही है।

ये तो ढेखने में यही जान पड़ता है कि गर्भवती रुटी को कुछ अधिक भोजन की आवश्यकता होती है; क्योंकि एक तो उसे अपना शरीर पालना पड़ता है और दूसरे अपने गर्भ के बालक को भी भोजन पहुँचाना पड़ता है, पर असल में यह बात नहीं है। गर्भ के कारण भोजन की पाचन-शक्ति में कुछ ऐसा फेरफार हो जाता है जिसके कारण रुटी बहुत भारी पदार्थों को सहज में नहीं पचा सकती। उसकी पाचन-शक्ति घट जाती है, उसकी भूख अनियमित हो जाती है और खाने-पीने के सम्बन्ध में उसका मन बहुत चंचल हो जाता है। इसलिए ये ही उसे भूख लगे, त्यों ही उसे तुरन्त खाने न बैठ जाना चाहिए। इसी प्रकार जब कोई खास चीज़ खाने की उसकी इच्छा हो, तब उसे तुरन्त ही बिना समझे-बूझे वह चीज़ नहीं खा लेनी चाहिए। खाने-पीने के सम्बन्ध में बहुत विचार से काम लेना चाहिए। खाने-पीने की कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि यदि केवल बहुत अधिक इच्छा होने के ही कारण खा या पी ली जायें तो उनसे तन्दुरुस्ती बिगड़ जाती है। यदि खाने-पीने की किसी चीज़ के लिए रुटी अपनी इच्छा किसी प्रकार रोक ही न सकती हो तो उसे बहुत ही थोड़ी मात्रा में वह चीज़ खानी या पीनी चाहिए।

आवश्यकता से कम भोजन करना—यदि पूरा भोजन न किया जाय या ऐसा भोजन किया जाय जिसमें शरीर को पुष्ट करने-वाली चीजें कम हों, तो उस भोजन से शरीर का बहुत ही कम पोषण होता है। ऐसी चीज़ों के खाने या कम खाने से गर्भ में का वज्ञा भर सकता है या समय से पहले ही वह गर्भ से बाहर निकल पड़ता है।

यदि शरीर को पुष्ट करनेवाले पठार्थ ठीक तरह से न मिले और उसके साथ ही यदि शारीरिक परिश्रम भी करना पड़े तो उससे शरीर की तन्दुरुस्ती बहुत कुछ ख़राब हो सकती है और आगे चलकर बच्चे को दूध पिलाने के काम में भी बहुत कुछ ख़राबी हो सकती है। बच्चा होने के बाद जिन स्थिरों का दूध कम हो जाता या बिलकुल बन्द हो जाता है, वे प्रायः वही स्थिरा होती है जिन्हे गर्भ की अवस्था में पूरा पूरा और शरीर को पुष्ट करनेवाला भोजन नहीं मिलता।

गर्भ की अवस्था में स्थिरों को कभी उपवास, व्रत या और कोई ऐसा धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे शरीर को पुष्ट करनेवाला भोजन न मिले। इन सब बातों से माता की भी तन्दुरुस्ती बिगड़ती है और बच्चे की भी।

आवश्यकता से अधिक भोजन करना— जिस प्रकार आवश्यकता से कम भोजन करना बुरा और हानिकारक है, उसी प्रकार अधिक भोजन करना भी बुरा और हानिकारक है। आज-अल लोगों में जो बहुत सी बीमारिया आदि दिखाई पड़ती है, उनमें से अनेक ऐसी हैं जो या तो बहुत अधिक भोजन करने के कारण होती है और या बहुत अधिक पकाये हुए या बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट बनाये हुए भोजनों के कारण होती है।

यह कैसे जानना चाहिए कि भोजन ठीक नहीं है— जब भोजन ठीक तरह से न पचता हो, सिर मे दर्द रहता हो और शरीर के कपरी चमड़े से जलन या खुजली रहती हो, तब तुरन्त समझ लेना चाहिए कि जो भोजन मिलता है, वह ठीक नहीं है; उसमें कुछ दोष हैं; फिर चाहे वह भोजन किसी तरह का क्यों न हो। यदि पेशाब की डाक्टरी जाँच करने पर यह पता चले कि वह उस अवस्था में नहीं है, जिसमें साधारणत होना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि जो भोजन मिलता है, वह शरीर के अनुकूल नहीं है। यदि उसी

समय भोजन के सम्बन्ध में ठीक व्यवस्था न की जायगी तो आगे चल-
कर बढ़ी खराबियाँ हो सकती हैं। जिन लियों को सिर में चक्र आता
हो, जो मिचलाता हो, पेट पर भार जान पड़ता हो, दृष्टि में कुछ दोष
आ गया हो, आंख के सामने चीज़े तैरती हुईं-सी जान पड़ती हों तो
समझ लेना चाहिए कि भोजन ठीक और उपयुक्त नहीं है।

खाने की चीज़ें; दूध—दूध सब प्रकार से पूरा भोजन है।
इससे अणु के बढ़ने में सहायता मिलती है। गर्भ के आरम्भ के
महीनों में दूध बराबर नियम से पीना चाहिए, और यदि हो सके तो
जब तक प्रसव न हो जाय, तब तक बराबर पीते रहना चाहिए।
विशेषतः भारतवर्ष की लियों के लिए दूध पीना और भी अच्छा और
आवश्यक है, क्योंकि वे प्रायः शाकाहारी—तरकारिया खानेवाली—
होती है, मांस आदि नहीं खातीं। मैस या बकरी के दूध से गौ का दूध
कहीं अच्छा होता है। जो टीन में बन्द विलायती दूध आते हैं,
उनमें शरीर को पुष्ट करनेवाले वे गुण नहीं होते जो गौ के ताजे दूध में
होते हैं।

घी—घी या भक्षण मिलाने से खाने की चीज़े शरीर को अधिक
पुष्ट करती है, इसलिए इन चीज़ों से तनुरुस्ती अच्छी होती है। पर
घी उमी दृश्या में खाना चाहिए जब भूख खूब अच्छी तरह लगती हो।
इधर कुछ दिनों से घी में बहुत तरह की चीज़ें मिलाई जाने लगी हैं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखनेवाले अधिकारियों को इसे रोकना
चाहिए। प्रायः सभी लोग घी में मिलावट की शिकायत करते हैं, इस-
लिए अगर सरकार इस बारे में कोई कार्रवाई करे, तो सर्वसाधारण
कृतज्ञतापूर्वक उसका समर्थन करेगे।

छाड़ या भठा—छाड़ और भठा भी बहुत अच्छा और गुण-
कारी है। भारत में इसका बहुत व्यवहार होता है और यूरोप के
देशों में भी लोग इसका व्यवहार करते हैं। वहाँ बहुत से चिकित्सक

शपने रोगियों से इसका व्यवहार करते हैं। भारत-सरीखे गरम देश में, जहाँ साधारणतः सभी अतुश्रो में और विशेषतः गरमी के दिनों में पात्सन-क्रिया बहुत जल्डी विगड़ जाती है, पेट और अंतिमियों की वीमारियाँ मठे के व्यवहार से बहुत कुछ रुक सकती हैं। जो स्निया साधारणतः बराबर मठा पीती हों, वे यदि गर्भ की अवस्था में भी बराबर पीती रहें, तो उनके लिए बहुत अच्छा है।

शहद—जिन गर्भवती स्त्रियों को शहद अच्छा लगता हो, वे मजे में उसका व्यवहार कर सकती हैं। विशेषतः गर्भ की अवस्था में वह और भी पुष्टिकारक होता है।

चावल—यदि गर्भवती स्त्री को पहले भी ही बराबर चावल खाने का अभ्यास हो, तो वह चावल में भी या मांस, मछली आदि का शोरेवा मिलाकर खा सकती है; पर वह चावल खूब अच्छी तरह उघाला और पकाया हुआ होना चाहिए। वह ठंडा करके और कुछ मीठा मिलाकर भी खाया जा सकता है।

सारा-भाजी—सारा-भाजी आडि का मजे में व्यवहार किया जा सकता है। जहाँ तक हो सके, मटर छोड़ देना चाहिए; क्योंकि उमसे कब्ज़ायत होती है। अंजीर, छुहारे और सब प्रकार के ताजे फल भी लाभदायक होते हैं।

बहुत अधिक मसालेदार चीजें, मिठाइयाँ और मुरुद्वे आदि भी बहुत न खाने चाहिए^३। गर्भ की अवस्था में सब तरह की शराब आडि विलकुल छोड़ देनी चाहिए। और सूखे मांस, झुने हुए अच्छे और बहुत कड़ी या तेज़ चाय का भी कभी व्यवहार न करना चाहिए। जब प्रसवकाल पास आ जाय, तब दो या तीन बार में बहुत सा भोजन करने की आपेक्षा पांच-छः बार में थोड़ा थोड़ा भोजन करना ही अच्छा है।

गर्भवती स्त्रियों के भोजन के सम्बन्ध में ऊपर के बाल मुख्य सुरक्षा सिद्धान्त बतला दिये गये हैं। भारत जैसे विशाल महादेश में भिन्न प्रदेशों में भोजन का प्रकार आदि अलग अलग होता है। इसलिए सानेपीने की उन्हीं चीजों का व्यवहार करना चाहिए जो बहुत दिनों के अनुभव से लाभदायक और उपयोगी सिद्ध हो चुकी हो; पर उनके सम्बन्ध में भी समय और मात्रा आदि का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए।

गर्भविस्था में होनेवाली कुछ साधारण बीमारियाँ और दुर्घटनाएँ—ऊपर स्वास्थ्य और भोजन आदि के सम्बन्ध में जो नियम बतलाये गये हैं, यदि उनका ठीक तरह से पालन किया जाय, तो इस प्रकार की बहुत सी बीमारियों से गर्भवती स्त्री बच सकती है। लेकिन फिर भी कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो ही ही जाती हैं। उनमें से कुछ बीमारियों का यहा वर्णन किया जाता है; और कुछ ऐसी बातें भी बतलाई जाती हैं जिनसे उनमें कुछ आराम पहुँच सकता है। बाकी बीमारियाँ ऐसी हैं कि ज्यो ही उनके लक्षण दिखलाई पड़े, तो फिर चाहे वह बीमारी कितनी ही साधारण और क्षेत्री क्यों न हो, तुरन्त किसी अच्छे डाक्टर को बुलाकर उसकी सलाह लेनी चाहिए। और आरम्भ में ही उस बीमारी को रोक देना चाहिए, जिसमें वह बढ़न सके और नई खुराकियाँ न पैदा कर सके।

अपच या भोजन न पचना—गर्भवती स्त्री को प्रायः यह शिकायत होती देखी जाती है। प्रायः अधिकांश गर्भवती स्त्रियों को किसी रूप में यह शिकायत रहती ही है। बहुत सी अवस्थाओं में प्रायः यह देखा जाता है कि सबेरे के समय तबीयत ख़राब रहती है। ऊपर जहाँ गर्भवती होने के लक्षणों आदि का वर्णन किया गया है, वहा इसके सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही जा चुकी हैं। यह शिकायत प्रायः उन स्त्रियों में अधिक देखी जाती है जो पहली बार

गर्भवती होती है। यह भी हो सकता है कि बाद के गर्भों में यह तकलीफ न हो। प्रायः पहले मास के अन्त में या जब माहवारी खून नहीं पड़ता या होता तब यह शिकायत देखने में आती है और डेढ़ दो महीने तक बनी रहती है। गर्भ के तीसरे या चौथे महीने के बाद वह आपसे आप दूर हो जाती है। प्रायः खियों को यह शिकायत बहुत ही साधारण या हल्के रूप में होती है, पर कुछ को बहुत उम्मीद या विकट रूप में भी होती है। कुछ खिया सबेरे ज्यों ही सोकर उठती है, दो ही उनका जी मिचलाने लगता है। कुछ खियों को सबेरे जलपान या भोजन करने के बाद तबीयत ख़राब जान पड़ने लगती है और कुछ खियों को दिन में कसी एक बार मिचली आती है, बाकी दिन भर वे बहुत अच्छी तरह और आराम से रहती हैं। पर कुछ खिया ऐसी भी होती है जिनको दिन भर इससे कष्ट रहता है। वे जो कुछ खाती हैं, उससे उनके शरीर का पोषण तो होता ही नहीं, इसलिए वे दिन पर दिन दुर्बल होती जाती हैं। इस प्रकार की अवस्थाओं में तुरन्त अच्छे डाक्टर को दिखलाकर उसकी सलाह लेनी चाहिए। रहन-सहन की बहुत अच्छी, ठीक और नियमित व्यवस्था होनी चाहिए और खाने-पीने के सम्बन्ध में भी कुछ नियम और व्यवस्था होनी चाहिए। यदि यह शिकायत साधारण और हल्की हो, तो बरफ के छोटे छोटे फुकडे मुँह में रखकर चूसने चाहिए या विस्तर पर लेटकर आराम करना चाहिए या केवल दूध ही पीकर रहना चाहिए और या सोडा बाईकार्ब का व्यवहार करना चाहिए। इससे तबीयत कुछ हल्की जान पड़ने लगती। जब इन साधारण उपचारों से कोई लाभ होता हुआ न दिखलाई दे, तब गर्भवती लड़ी को चाहिए कि वह डाक्टर से अपनी परीक्षा कराकर रोग के बहुत बढ़ने के पहले ही उसका ठीक ठीक हलाज करावे।

कलेजा जलना, पेट के ऊपरी भाग में दर्द या कष्ट जान पड़ना—यह अपने का एक दूसरा रूप है जो गर्भवती खियों

को होता है। ठीक और बंधे हुए समय पर भोजन न करने और उचित तथा उपयुक्त भोजन न करने के कारण ऐसा होता है। ऐसी अवस्था में न सो बहुत अधिक मिठाइया आदि खानी चाहिए और न बहुत चाय पीनी चाहिए, और जब तक यह शिकायत बनी रहे, तब तक बराबर बहुत ही सादा भोजन करना चाहिए। कुछ अवस्थाओं में किसी ऐसी बहुत ही हल्की दवा की भी आवश्यकता हो सकती है, जिससे एक दो दस्त आ जायें। सोडा बाईकार्ब (पृक गिलास गरम जल में चाय के छोटे चम्मच के बराबर मिलाकर घोला हुआ) देने से भी कुछ अवस्थाओं में लाभ हो सकता है। यदि भोजन के साथ जहा तक कम हो सके, वहा तक कम पानी पिया जाय, तो उससे भी लाभ हो सकता है।

मसूड़े—कभी कभी गर्भवती स्त्री के मसूड़े कुछ सूज आते हैं और ज़रा सा छूने पर उनमें से खून जाने लगता है। प्रसव हो जाने के बाद तो यह बात जाती रहती है; पर जब तक यह रहती है, तब तक रोगी को इससे बहुत कष्ट होता है। जिन स्थिरों को यह शिकायत रहती है, उनकी तन्दुरुस्ती बहुत जल्दी खराब हो जाती है। उन्हें स्वास्थ्य के नियमों का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए और भोजन के सम्बन्ध में ऊपर जो सिद्धान्त बतलाये गये हैं, उनका ठीक तरह से पालन करना चाहिए। यदि डो बड़े चम्मच भर पानी में आधा ड्राम मर का टिंक्चर (Tincture of Myrrh) मिलाकर उससे कुर्ला किया जाय या मसूड़ों पर किसी डुरुश या रंगली से ही शुद्ध टिंक्चर ही लगा लिया जाय तो यह शिकायत बहुत कुछ दूर हो सकती है।

मुँह से लार जाना—इसमें गर्भवती स्त्री के मुँह से बराबर लार या पतला पानी-सा बहता रहता है। कभी कभी तो यह इतना कष्ट देता है कि रात के समय स्त्री सुख से सो ही नहीं सकती; और इस नीद न आने का उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए टैनिक एसिड ग्लीसरीन (Tannic

Acid Glycerine) के पानी से कुल्हा करना चाहिए। इसके लिए पहले पानी गरम करके ठंडा कर लेना चाहिए और चार आउन्स या आठ बड़े चम्मच भर वह पानी लेकर उसमे आधा आउन्स या एक चम्मच भर यह दबा मिलानी चाहिए।

कब्ज़— गर्भ की अवस्था मे आय: बहुत सी स्थियों को कब्ज़ की शिकायत हुआ करती है। यदि द्वितीय बराबर चलती फिरती और काम-धन्धा करती रहें, भोजन के उपरान्त खूब पानी पिया करे, ताजे फल खाया करें, और ठीक समय से पालाने जाया करें तो यह शिकायत बहुत कुछ दूर हो सकती है। गर्भ की अवस्था मे आते कभी भारी और भरी हुई नहीं रहनी चाहिए। यदि कब्ज़ यहत हो तो कभी ऐसी पेटेन्ट दबाह्या नहीं खानी चाहिए जिनके सम्बन्ध में यह पता ही नहीं चलता कि वे किन किन चीजों से बनी हैं। इस प्रकार की बहुत सी दबाह्या बहुत ही हानिकारक होती है; क्योंकि उनके सेवन से कद्दा गर्भ गिर जाने का भय रहता है। गर्भ की अवस्था मे कब्ज़ दूर करने के लिए केवल बहुत हल्की उस्तावर चीज़े खानी चाहिए। गर्भवती स्थियों का पेट साफ़ करने के लिए सनाय सबसे अच्छी चीज़ है। यदि आधे गिलास पानी मे रात के समय सनाय की दस बारह पत्तियाँ भिगो दी जायें और सबेरे वह पानी क्षानकर पी लिया जाय तो उससे बहुत अच्छी तरह काम चल सकता है। तरब पैराफिन (Liquid Paraffin) भी साधारण उस्त लाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहां यह भी बतला देना आवश्यक है कि जिस समय वायुस्थाप, पेशाव या पालाने की हाजिर जान पड़े, उस समय इन वेगों को कभी रोकना नहीं चाहिए।

दस्त आना— यदि गर्भ की अवस्था मे झी को बार बार उस्त आते हों, तो तुरन्त किसी डाक्टर को दिलखाना चाहिए; क्योंकि इससे प्रायः अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं।

खुजली—यह भी एक ऐसी कष्ट देनेवाली बीमारी है जो प्रायः गर्भ की अवस्था में होती है। यदि खुजली सारे शरीर में हो, तो समझ लेना चाहिए कि गर्भिंशी को जो भोजन दिया जाता है, वह ठीक और उपयुक्त नहीं है। ऐसी अवस्था में उसे केवल दूध देना चाहिए, खाने की ओर कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। खुजली से गर्भिंशी को इतना अधिक कष्ट और बेचैनी होती है कि उसे रात को जल्दी नीड़ ही नहीं आती; और रात के समय नींद न आने के कारण उसकी तम्बुख्स्ती बहुत बिगड़ जाती है और अन्त में उसके शरीर में बिलकुल बल ही नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था में तुरन्त डाक्टर को दिखाना चाहिए और उसका इकाज करना चाहिए।

कभी कभी ऐसा होता है कि केवल जननेन्द्रिय में ही खुजली होती है। इसका कारण उस अंग की ठीक और पूरी सफाई न रखना है। जननेन्द्रिय को सदा स्खंब साफ़ रखना चाहिए। यदि केवल इतने से ही खुजली दूर न हो, तो डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गर्भिंशी स्थिरों को यह रोग अपने डाक्टर से छिपाकर अपना कष्ट व्यर्थ बढ़ाना नहीं चाहिए।

गश या मूच्छा—कुछ गर्भवती स्थिरों को इस समय कभी कभी गश या मूच्छा भी हो जाया करती है। कुछ अवस्थाओं में तो यह मूच्छा केवल रनायु की दुर्बलता के कारण होती है और कुछ अवस्थाओं में हृदय की बीमारी के कारण। यदि रनायु की दुर्बलता के कारण बेहोशी होती हो तो नौसादर आदि सूंघे जानेवाले नमको (Smelling Salts) में से कोई एक नमक सूंघने से ही होश आ जाता है। पर यदि हृदय की बीमारी के कारण बेहोशी हो तो डाक्टर का इकाज करना चाहिए।

पेशाब की तकलीफ—यह सदा स्मरण रहना चाहिए कि गर्भ के आरम्भ के महीनों में प्रायः सभी स्थिरों को जल्दी जल्दी पेशाब

होता है। इससे गर्भवती स्त्री को डर या घबरा नहीं जाना चाहिए। पर यदि ऐसी अवस्था आ जाय कि वह अपने गुरुदे को वश में ही न रख सकती हो, अर्थात् रोकने की कुछ चेष्टा करने पर भी पेशाब आप से आप ही निकल जाता हो, तो उसे तुरन्त डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

मलेरिया या जूँड़ी बुखार—मलेरिया का गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे उसे या तो समय से पहले ही प्रसव हो जाता है या शारीरिक टिण्ट से बहुत ही दुर्बल सन्तान उत्पन्न होती है। इसके सिवा इस बुखार के कारण यों ही स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है और प्रसव के कारण तन्दुरुस्ती और भी ख़राब हो जाती है। इसके सिवा यदि वह कमज़ोर हो और उसकी तन्दुरुस्ती स्थाब हो तो प्रसव की दशा में उसे यह रोग हो जाने का ज़्यादा डर रहता है। भारत में प्रसव के बाद या उससे पहले ही बहुत सी ख़िया मर जाती है, और जो बच जाती है, उनकी तन्दुरुस्ती विलकृत चौपट हो जाती है। इसलिए यदि गर्भवती स्त्री को कभी बुखार आवे तो उसका तुरन्त हलाज कराना चाहिए। इसमें कुछ भी देर नहीं करनी चाहिए। यदि इसमें कुछ भी ला-परवाही की जायगी, तो माता और बच्चे दोनों के ही प्राण सकट में पड़ेगे।

मलेरिया के लिए कुनैन एक बहुत प्रसिद्ध दवा है, पर गर्भवती ख़िया उसका अवहार करने से डरती है, क्योंकि उससे कच्छा गर्भ गिर जाने का डर रहता है। यदि योड़ी मात्रा में कुनैन का अवहार किया जाय तो वह डर भी कम हो जाता है, परन्तु यदि इसका अवहार न किया जाय या देर से किया जाय तो पुराने मलेरिया का विप सारे शरीर में फैल जाने के कारण समय से पहले ही प्रसव हो सकता है।

क्षय या तपेदिक—यह रोग प्रायः ख़ियों को, और विशेषतः परदे में रहनेवाली ख़ियों को होता देखा गया है। यदि ख़ासी का कुछ भी लच्छण दिखाई पड़े तो गर्भवती स्त्री को तुरन्त सचेत हो जाना

चाहिए। साधारण सर्दी आदि लग जाने के कारण भी खासी हो सकती है, पर यदि उसका ठीक तरह से इलाज न किया जाय, तो वही बढ़कर ज्याय या तपेंटिक का रूप धारण कर सकती है। इसके लिए बहुत अधिक खुली हवा की आवश्यकता है। साथ ही अच्छा और पुष्टिकारक भोजन भी मिलना चाहिए, जिसने इस हुष्ट रोग का आरम्भ में ही नाश हो जाय।

पैरों और घुटनों की सूजन—गर्भावस्था के अन्त के महीनों में पैरों और घुटनों में जो हल्की सूजन हो जाती है, उसका कोई इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। पर जब पिंडलियों आदि में भी सूजन हो जाय और चलने-फिरने में कठिनता होने लगे, तब उसका इलाज होना चाहिए। साधारण अवस्थाओं में इसका इलाज भी बहुत ही सीधा सादा होता है। बहुत सी चियां तो केवल बिस्तर पर आराम करके तरल पदार्थों का और खाने में साधारण नमक का व्यवहार कुड़कर इस कष्ट से छुटकारा पा जाती है। बिस्तर पर लेट-कर आराम करना बहुत आवश्यक है; क्योंकि चलने में शरीर का बोझ पढ़ने के कारण भी कुछ सूजन हो आती है। यदि इन सीधे और साधारण उपायों से सूजन कम न हो, तब डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसका मुनामिब इलाज करना चाहिए। यदि ऐसी अवस्था में खा-परवाही की जायगी और इसकी ओर ध्यान न दिया जायगा, तो प्रसव के समय इसके कारण कुछ और भी ख़राबिया हो सकती हैं।

भ्रूणपात या कच्चा गर्भ गिरना—यदि गर्भ रहने के चार महीने के अन्दर बच्चा निकलकर नष्ट हो जाय, तो उसे भ्रूणपात या कच्चा गर्भ गिरना कहते हैं। इसके बाद यदि गर्भ रहने से अट्टाई-सवे सप्ताह के अन्दर बच्चा निकल जाय तो उसे गर्भपात कहते हैं। (अंगरेजी में इन दोनों के लिए शब्द क्रमशः अवार्शन और मिसकैरिज है।)

साधारणतः कच्छा गर्भ गिरने से शरीर और मन का स्वास्थ्य तो विगड़ता ही है, पर ग्रायः इससे और भी कई बड़ी बड़ी ख़राबियाँ हो जाती हैं और कभी कभी तो ग्राय तक निकल जाते हैं। पर कुछ स्थिर्यां ऐसी भी होती हैं जिन्हें बराबर कच्छा गर्भ गिराने की आदत ही हो जाती है।

सारे सभ्य संसार में सभी प्रकार के समाजों में कच्छा गर्भ गिराने की प्रथा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है; और आजकल भारतवर्ष की नई शिक्षा पानेवाली स्थियों में भी बहुत कुछ इसकी प्रवृत्ति दिखाई पड़ने लगी है। कच्छा गर्भ किन किन कारणों से गिरता है और उसे रोकने के क्या उपाय हैं, यह आगे बताया जाता है।

कारण—

(१) गरमी या आतशक—यदि किसी स्त्री को बार बार कच्छा गर्भ गिर जाता हो तो उसे यह सन्देह करना चाहिए कि मेरे शरीर में इस रोग का ज़हर आ गया है। जब तक यह रोग पूरी तरह से अच्छा न हो जायगा, तब तक उसे बराबर कच्छा गर्भ गिरता रहेगा। इस बीमारी की पूरी पूरी जाच कराना बहुत ही आवश्यक है, और अगर यह पता लग जाय कि यह बीमारी है, तो स्त्री और पुरुष दोनों को यह रोग दूर करने के लिए पूरा और पक्का इलाज करना चाहिए।

(२) हृदय, गुरदे, फेफड़े और जिगर आदि की बीमारियों के कारण ग्रायः कच्छा गर्भ गिर जाया करता है। जब हृन अरोग्य से किसी प्रकार का रोग होता है, तब उससे अप्रत्यक्ष रूप से कच्छा गर्भ गिर जाता है। अच्छी तरह से इलाज कराने से ही इस प्रकार कच्छा गर्भ गिरना बन्द हो सकता है। खून के साथ शरीर में जो अनेक प्रकार के विष ढौँड़ते रहते हैं, उनसे गर्भ के अन्दर ही बच्चा मर जाता और बाहर निकल जाता है।

(३) यदि गर्भवती लड़ी को किसी कारण से बुखार आता हो तो उसे उसका इलाज टालना नहीं चाहिए, बल्कि सुरक्षा ही अपना अच्छा इलाज करना चाहिए। इसमें देर करने से भी प्रायः गर्भ गिर जाता है।

(४) कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चेदानी अपने ठीक स्थान और अवस्था में नहीं होती। जब वह अपने स्थान से कुछ हट जाती है या हटी हुई होती है, तब उसके कारण भी गर्भ गिर जाता है। गर्भवती लड़ी इलाज कराके अपनी बच्चेदानी ठीक स्थान और स्थिति में ला सकती है और पूरे समय गर्भ धारण किये रह सकती है।

(५) गर्भवती लड़ी की मानसिक अवस्था के कारण भी कच्छा गर्भ गिर जाया करता है। चिन्ता, भय, दिमाग़ पर ज़ोर पढ़ने, ग्रस्त मनोवेग—जैसे अचानक बहुत डर जाने या बहुत अधिक शोक करने आदि के कारण भी यही बात होती है। यदि परिस्थिति ऐसी हो जिसमें गर्भवती खूब प्रसन्न रह सके, तो इन मनोवेगों के बुरे प्रभाव दूर के जा सकते हैं।

(६) गर्भ के आरम्भ के चार महीनों में यदि सम्भोग किया जायगा तो भी सम्भव है कि कच्छा गर्भ गिर जाय। यद्यपि हमारे यहाँ के पुराने धर्मशास्त्रों आदि में यहाँ तक कहा गया है कि जब तक गर्भ रहे, तब तक कभी सम्भोग नहीं करना चाहिए, तो भी जिन खिलों को प्रायः कच्छा गर्भ गिर जाया करता है, वे यदि गर्भ के आरम्भ के चार महीनों में ही सम्भोग न करें तो बहुत अच्छा है। यदि हमारे इस भारतीय आदर्श के अनुसार पूरी तरह से आचरण न हो सके तो भी ज़रूरी और अच्छी की बात यही है कि आरम्भ के चार महीनों में बिलकुल सम्भोग न किया जाय।

(७) जिन कामों से शरीर को भारी मटका लगता हो, जैसे कड़ी कसरत या बहुत अधिक थकावट का काम, उनको विशेषरूप से छोड़ देना चाहिए।

(८) कुछ स्थिर्यां पेसी होती है कि अगर ऊबड़ खाबड़ सड़क पर सवारी पर चले, एक सीढ़ी चूक जायें, बहुत ही थोड़ी डैंचाई पर से गिर जायें या कालीन आदि पर से फ़िसल जायें तो उनका कच्चा गर्भ गिर जाता है। ये कारण उत्तेजक तो है ही, पर फिर भी इनके द्वारा उन्हें स्थिरों का कच्चा गर्भ गिरता है जिनका गर्भाशय किसी गुसरों के प्रायः कच्चा गर्भ गिर जाया करता हो, उन्हें यह आवश्यक है कि वे अपने भीतरी अर्गों की पूरी और अच्छी जांच करावे। इस प्रकार की जांच के इतने लाभ है कि उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करना कठिन है। यह कैसे पता लगे कि कच्चा गर्भ गिरने का डर है।

यहाँ तीन पेसी मुख्य बातें बतलाई जाती हैं जिनसे गर्भवती स्त्री समझ सकती है कि कच्चा गर्भ गिरने का डर है। वे तीन बातें इस प्रकार हैं—

- (१) खून जाना।
- (२) पेट में दरद होना। और
- (३) पीठ में दरद होना।

इनमें से पहला खून या अर्थात् खून जाना सबसे अधिक महस्त्व का है। यदि किसी स्त्री को गर्भ रहे और गर्भ रहने के चार महीने के अन्दर वही उसे खून जाने लगे, तो उसे तुरन्त समझ लेना चाहिए कि स्त्रीबी आ रही है। प्रायः स्थिर्यां यह समझा करती है कि यह मासिक धर्म का ही खून है और इसलिए उसका विशेष ध्यान नहीं करती। पर इस प्रकार ध्यान न देने के कारण उन्हें हानि उठानी पड़ती है। पेसी अवस्था में सबसे अच्छी बात यह है कि स्त्री तुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहे। गर्भ के आरम्भ के महीनों में चाहे कितना ही कम खून क्यों न जाय, उसे बहुत सन्देह की दृष्टि से देखना चाहिए। और यदि इस खून के जाने के साथ ही साथ पेट के नीचे के हिस्से और पीठ में दरद भी हो तो गर्भवती स्त्री को समझ लेना चाहिए कि अब कच्चा गर्भ गिरना चाहता है।

बचने के उपाय और चिकित्सा

(१) ऐसी अवस्था में गर्भवती स्त्रियों को, और विशेषतः उन स्त्रियों को जिनका प्रायः कच्छा गर्भ गिर जाया करता है पहले से ही उससे बचने के लिए सब प्रकार के उपाय करने चाहिएँ। उन्हें साधारण टहलने फिरने की तरह के बहुत ही हल्के व्यायाम करने चाहिएँ।

(२) यदि यह इच्छा हो कि कच्छा गर्भ गिरने की जहाँ तक हो सके सम्भावना कम हो जाय, तो गर्भ के आरम्भ के चार महीनों में पुरुष के साथ सम्मोग करने से बिलकुल बचना चाहिए।

(३) यदि गर्भाशय अपने स्थान से हट या बढ़ गया हो तो किसी अच्छे और होशियार डाक्टर से भीतरी अंगों की पूरी तरह से जांच करानी चाहिए। गर्भाशय की वह ख़राबी बहुत जल्दी दूर हो जायगी और कच्छा गर्भ गिरने के अवसर बिलकुल ही न रह जायेगे।

(४) प्रायः गरमी आदि जिन रोगों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से कच्छा गर्भ गिरा करता है, उन रोगों का पता लगाने के लिए शरीर के सब अंगों की पूरी पूरी जांच कराना आवश्यक है।

(५) जिन स्त्रियों को प्रायः कच्छा गर्भ गिर जाया करता हो, उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय यह भी है कि जब वे साधारण अवस्था में मासिक धर्म से हों, तब वे अपना सारा समय प्रायः लेटे ही लेटे बिताया करें।

ज्यें ही पहले पहल खून जाता हुआ डिखलाई दे, त्योंही स्त्री को तुरन्त बिस्तर पर लेट जाना चाहिए। वह खून चाहे कितना ही कम क्यों न हो और उस समय वह उसका कितना ही कम महत्व क्यों न समझती हो, पर उसे बिस्तर पर आराम ही करना चाहिए। जब तक ऐसा न किया जायगा, तब तक गर्भपात रोकने के चाहे कितने उपाय क्यों न किये जायें, उनका कुछ भी फल न होगा। यदि हन सूचनाओं

पर पूरी तरह से ध्यान दिया जायगा, तो साधारणतः गर्भ अपने पूरे समय तक रहेगा। खियों को केवल ढो ही चार दिनों तक विस्तर पर नहीं पढ़े रहना चाहिए, बल्कि जब खून जाना विलकुल बन्द हो जाय, तब उसके बाद भी एक सप्ताह तक विस्तर पर आराम ही करना चाहिए।

कुछ खिया गर्भ गिरानेवाली दबाओं का व्यवहार करती है और कहा गर्भ गिराने के लिए अनेक विलक्षण उपाय करती हैं। ऐसी खिया मानों अपनी जान लोखिम में डालती है; और यदि वे किसी प्रकार बच भी जाती हैं, तो उन्हे प्रायः अनेक प्रकार के ऐसे रोग आदि हो जाते हैं जिनसे उनका सारा थाकूरी लीबन बहुत ही कष्ट से बीतता है। इसके सिवा यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए कानून से सजा भी हो सकती है। तात्पर्य यह कि यह परमात्मा और मनुष्य दोनों के सामने समान अपराध, बल्कि पाप है।

गर्भवती होने की अवस्था में चिकित्सा—जब किसी गर्भवती स्त्री को अपनी तबीयत कुछ ख़राब जान पड़े, तब उसे जटिल रोगों को बढ़ने से रोकने के लिए तुरन्त ही अपनी चिकित्सा करानी चाहिए। विशेषतः गर्भ रहने की अवस्था में रोगों की ओर पूरा पूरा ध्यान न ढेने से अनेक भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उसे लापरवाही करके ऐसी बातें को यों ही नहीं जाने देना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि अभी ठहरो; ज़रा देखो, क्या होता है। ज्यों ही कोई छुरा लक्षण दिखलाई पड़े, ल्यों ही जहरा तक हो सके, किसी अच्छे डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जिसमें गर्भ के दिनों में अथवा प्रसव के समय और बड़ी बड़ी ख़राबियां न पैदा हो जाएँ। प्रसव के समय शरीर पर जो ज़ोर पड़ता है और रोगों के बढ़ने का जो भय रहता है, उनके विचार से स्वास्थ्य विलकुल ठीक रखने के लिए सब प्रकार के उपाय करने चाहिए।

गर्भवती द्वियों को कभी अपने मन से दस्त लानेवाली दवाये नहीं खानी चाहिएँ और न कभी उस अवस्था में फसदः आदि लेनी चाहिएः अर्थात् कभी अपने शरीर की रगों में से खून नहीं निकलवाना चाहिए ।

वे कार्य जिनसे गर्भ का बच्चा मर तो नहीं जाता,
पर उसे हानि पहुँचती है । चरक—भारत के प्राचीन ऋषि
और चिकित्सा-शास्त्र के आचार्य चरक ने इस सम्बन्ध में कुछ बातें
बतलाई हैं, जो हम यहां पर देते हैं । भारतीय चिकित्सा-शास्त्र के
सम्बन्ध में हृनका चरक-संहिता नामक ग्रन्थ इस देश में सबसे पुराना
और प्रामाणिक माना जाता है । चाहे उनकी कुछ बातें आज-कल के
वैज्ञानिकों के मन में न बैठती हों, पर फिर भी उनके सम्बन्ध में अन्तिम
निर्णय करने से पहले उनकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए ।

(१) जो स्त्री सदा पीठ के बल लेटी रहती है, उसकी नाल अूण
की गरदन के चारों ओर लिपट जाती है ।

(२) जो स्त्री प्रायः बक्ती झक्ती या जड़ती झगड़ती रहती है,
उसकी सन्तान को भिरगी का रोग होता है ।

(३) जो स्त्री खुले स्वान में सोती है और रात के समय इधर-
उधर घूमती है, उसे पागल सन्तान उत्पन्न होती है ।

(४) जिस स्त्री को सम्भोग की बहुत अधिक कामना होती है,
उसकी सन्तान विकृत रूपवाली (भट्टी) या निलंज होती है ।

(५) जो स्त्री प्रायः दुःख या चिन्ता करती है, उसकी सन्तान डर-
पोक, दुबली पतली और अल्पायु या थोड़े दिनों तक जीनेवाली होती है ।

(१) हमारे यहां भारत में बहुत दिनों से लोग स्वास्थ्य सुधारने के
लिए फसद खुलवाते या रगों से खूब निकलवाते हैं । साधारण लोग
यह समझते हैं कि साल भर में एक बार यह निरापद किया कर
जाने से फिर साल भर शरीर अच्छा रहता है । अब भी देश के कुछ
भागों में लोग मई और जून के महीनों में यह किया किया करते हैं ।

(६) जो स्त्री दूसरों की सम्पत्ति आदि देखकर सदा हँस्या करती है, उसे ऐसी सन्तान उत्पन्न होती है जो दूसरों पर अत्याचार करनेवाली होती है या दूसरों की धन-दौलत देखकर जलती है।

(७) जिस स्त्री को चीज़े चुराने की आठत होती है, उसे ऐसी सन्तान होती है जो सब प्रकार के परिश्रमों में बहुत आलस्य करती है या जो बहुत ही दुष्ट स्वभाव की, दूसरों को हानि पहुँचानेवाली या दुरे कर्म करनेवाली होती है।

(८) जो स्त्री स्वभाव से क्रोधी होती है उसकी सन्तान क्रोधी और चिढ़चिढ़ी, अभिमानी या आडम्बर-प्रिय और दुष्ट स्वभाववाली होती है।

(९) जो स्त्री बराबर सोती रहती है, उसकी सन्तान भी सदा सोनेवाली और मूर्ख होती है और उसकी अभि बहुत मन्द होती है।

(१०) जो स्त्री शराब आदि पीती है, उसे ऐसी सन्तान होती है जिसे सदा प्यास लगी रहती है और जिसका मन बहुत ही दुर्बल होता है।

(११) जिस स्त्री को मिठाइ आदि खाने का बहुत शौक होता है उसे ऐसी सन्तान उत्पन्न होती है जिसे या तो मूत्रेन्द्रिय का रोग होता है और या बहुत मोटी होती है।

(१२) जिस स्त्री को सूअर का मांस अच्छा लगता है, उसे ऐसी सन्तान उत्पन्न होती है जिसकी आखे बहुत लाल होती है या जिसे दमा हो जाता है या जिसके बाल बहुत अधिक कड़े होते हैं।

(१३) जो स्त्री बहुत अधिक खट्टी चीज़े खाती और पीती है, उसे ऐसी सन्तान होती है जिसे चमड़े या आखों के रोग होते हैं।

(१४) जो स्त्री बहुत अधिक नमकीन पदार्थ खाती और पीती है, उसे ऐसी सन्तान होती है जिसके चेहरे पर जल्दी कुर्दिया पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं और गंभी होती है।

(१५) जो स्त्री बहुत अधिक चरपे पदार्थ खाती है, उसे ऐसी सन्तान होती है जो दुर्बल हो जाती है या जो और आगे सन्तान उत्पन्न करने के योग्य नहीं होती।

(१६) जो स्त्री बहुत कड़ए पदार्थ खाती है, उसे ऐसी सन्तान होती है जो शरीर से बहुत कमज़ोर या दुबली पतली होती है या जिसे चयनोग हो जाता है।

(१७) जो स्त्री बहुत कसैले पदार्थ खाती और पीती है, उसे ऐसी सन्तान उत्पन्न होती है जिसका मल-मूत्र रुक जाता है।

इसलिए ऊपर बतलाई हुई बातों से हर स्त्री को बहुत बचना चाहिए, जिसमें उसकी सन्तान उन सब रोगों और दोषों आदि से बची रहे जो ऊपर बतलाये गये हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन बातों से अच्छी सन्तान उत्पन्न करने की माता की शक्ति में दोष आते हैं, उन्हीं बातों से पिता की शक्ति में भी दोष आते हैं। यदि भोजन और आचार आदि उपयुक्त और ठीक न होंगे, तो उत्पन्न होनेवाली सन्तान उसी प्रकार तत्काल नष्ट हो जायगी, जिस प्रकार वह नथा लगाया हुआ पौधा नष्ट हो जाता है जिसकी जड़ ज़मीन में अच्छी तरह नहीं जमती। बहुत अधिक समय तक धूप, हवा या बरसते हुए पानी में रहना, अनुकूल न बैठनेवाला भोजन करना, नहाने आदि के सम्बन्ध में किसी नियम पर न चलना और बराबर किञ्जियत रहना आदि ऐसी बातें हैं जिनसे गर्भ का नाश होता है।

स्तनों की धुंडियों की रक्षा—साधारणतः खियां यह बात नहीं जानतीं कि बच्चे को अच्छी तरह से दूध पिलाने के पहले स्तनों की धुंडियों को तैयार कर रखना चाहिए। उन्हे यह समझ रखना चाहिए कि उन धुंडियों का बराबर एक साल तक व्यवहार होगा। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रसव का समय आने से दो तीन महीने पहले से ही खियों को अपने स्तनों की धुंडियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नई उत्पन्न होनेवाली सन्तान अपने मसूड़ों से उन धुंडियों को बहुत ज़ोर से काटती है; और यदि धुंडिया इस प्रकार के आक्रमण के लिए पहले से ही तैयार न रहे तो उनमें घाव हो जायेंगे और पीड़ा होने लगेगी। **साधारणतः** वज्रों को दूध पिलाने के

कारण खिंचें के स्तनों की घुंडियाँ बीच से फट जाती हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इससे उन्हें बहुत कष्ट होता है। प्रायः ऐसा होता है कि बच्चे को पीने के लिए उतना दूध नहीं मिलने पाता जितना मिलना चाहिए; क्योंकि जहाँ तक हो सकता है, खिर्या उस पीड़ा से बचना चाहती है, जो उन्हें बच्चे के काटने से होती है। जहाँ तक हो सकता है, वह बच्चे को दूध पिलाने से बचती है। इससे बच्चे को पूरा पूरा दूध नहीं मिलने पाता, जिससे बच्चा कमज़ोर और दुखला हो जाता है। प्रसव के बाद इस कष्ट से बचने के लिए गर्भवती खींकों के उचित है कि वह गर्भकाल में ही अपने स्तनों की घुंडियों पर उचित ध्यान दे।

घुंडियों या कुचाग्र को तैयार करना — घुंडियों को तैयार करने के दो उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि घुंडियों के ऊपर का चमड़ा कड़ा कर दिया जाय, और दूसरा उपाय यह है कि वह मुलायम कर दिया जाय। यूरोप के देशों में गर्भवती खिर्या अपने स्तन के अगले भाग पर ओ-डी-कलोन लगाकर उसे कड़ा कर लेती हैं। फिट-किरी घोले हुए पानी से भी यही बातें हो सकती हैं, और इसमें खर्च भी बहुत कम पड़ता है। यह क्रिया सन्तान उत्पन्न होने से दो या तीन महीने पहले से करनी चाहिए। थोड़ी सी अच्छी रुई या काटन, जल फिटकिरी खुले हुए पानी में हुब्बा लेनी चाहिए और उससे स्तनों की घुंडियों को तर करना चाहिए। इसके बाद उन घुंडियों को गरम पानी से धो डालना चाहिए और तब उन पर वराषर वराषर मिला हुआ ग्लीसरीन और ओ-डी-कलोन या मेथिलेटेड स्पिरिट मलानी चाहिए। इससे चमड़ा मजबूत होने लगता है और फिर दूध पिलाने के समय उनमें धाव या दरारें नहीं होने पातीं। जिन दिनों फिटकिरी मिले हुए पानी का व्यवहार किया जाता हो, उन दिनों बच्चे को दूध पिलाने से पहले और बाद दोनों समय स्तनों की घुंडियों को गरम पानी से अच्छी तरह से धो डालना चाहिए। यदि पहले से हृतने उपाय कर लेने

पर भी बच्चे के पहले पहल स्तनों को काटने से माता को कुछ पीड़ा हो, तो उसे आश्चर्य नहीं करना चाहिए; क्योंकि ज्यों ही बच्चा स्तन की धुंडी को मुँह से अच्छी तरह पकड़ लेता है, तो ही पीड़ा दूर हो जाती है। यदि प्रसव से पहले ही स्तनों के अगले भाग पर उन्हें कढ़ा करने के लिए ओड़ी क्लोन या फिटकरी का पानी लगाया जाय, तो यह क्रिया बच्चे को स्तन से दूध पिलाना आसान करने के कुछ दिनों बाद तक भी बराबर होती रहनी चाहिए।

दूसरा उपाय स्तनों की धुंडियाँ को मुलायम करना है। तेल, वेसलीन, लेनोलीन, धी, मक्खन या हेजलीन क्रीम आदि चिकने पदार्थ लगाने से स्तनों की धुंडियाँ मुलायम हो जाती हैं।

दबी हुई धुंडियाँ—जिन छियों के स्तनों की धुंडियाँ कुछ दबी हुई होती हैं, उनके लिए स्तन से दूध पिलाना बहुत कठिन और कभी कभी असम्भव तक होता है। माता को धुंडी की जड़ धीरे धीरे दबानी और बढ़ानी चाहिए, जिसमें वह अधिक से अधिक बढ़ सके। सन्तान उत्पन्न होने से पहले माता को वह देख लेना चाहिए कि धुंडियाँ बहुत छोटी तो नहीं हैं। यदि वे बहुत छोटी हो तो दिन में कई बार डॉग्लियों और ड्रॉग्लू से उनको दबा और खीचकर बढ़ाना चाहिए। इस काम में बहुत अधिक बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ही ऐसा करना चाहिए जिसमें दरद न हो। यदि किसी तरह की पीड़ा या कष्ट जान पड़े तो यही समस्तना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक ज़ोर लगाया जा रहा है। यदि धुंडियाँ छोटी या दबी हुई हो तो केवल इसी कारण माताये अपने बच्चों को दूध पिलाना न छोड़ दें। दूध पिलाने से पहले धुंडियाँ उस विशेष प्रकार के पम्प से उठाई जा सकती हैं जिससे दूध पिलाया जाता है और जिसे ब्रेस्ट-पम्प या मिल्क पम्प (Breast Pump or Milk Pump) कहते हैं। एक या दो सप्ताह के बाद वे अपनी साधारण अवस्था में आ जायेंगी और उस समय दूध पिलाने में ही आराम मिलने लगेगा।

कपड़े—उत्पन्न होनेवाले बच्चे के लिए गर्भ की अवस्था में ही कपड़े बना रखने चाहिए^{१०}। यदि पहले से ही कपड़े न बना लिये जायेंगे तो सम्भव है कि जाड़े के दिनों में बच्चे को सरदी लग जाय। केवल पहले से कपड़े तैयार न रखने के कारण ही बहुत से बच्चे जन्म लेने के एक महीने के अन्दर ही मर जाते हैं।

प्रसव की तिथि का अनुमान—साधारणतः गर्भ २८० दिन (१० चान्द्र मास) तक रहता है; पर अलग अलग स्थिरों में यह समय कुछ कम या अधिक भी होता है। यदि गर्भ के अन्दर बच्चे का पूरा पूरा विकास हो गया हो, उसके सब अंग ठीक तरह से बन गये हों तो वह ऊपर बतलाये हुए साधारण समय से कुछ पहले भी जन्म ले सकता है। इसी प्रकार जिस बच्चे का पूरा पूरा विकास न हुआ हो, अर्थात् जिसके अंग पूरी तरह से न बने हों, उसके जन्म लेने में इससे कुछ देर भी हो सकती है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि गर्भ उचित से बहुत अधिक दिनों तक बना रहे और बच्चा न हो। गर्भवती स्त्रिया प्रायः यह जानना चाहती हैं कि इसे प्रसव कब तक होगा। प्रसव की तिथि या तारीख का ठीक अनुमान करने के लिए गर्भवती स्त्री को उचित है कि जिस तारीख को वह आखिरी बार मासिक धर्म से हुई हो, उस तारीख में सात दिन और जोड़े और तब उसमें से तीन महीने घटा दे। बस यही आखिरी तारीख उसे लिख रखनी चाहिए। उसे केवल स्मरणशक्ति पर नहीं छोड़ देना चाहिए।

आखिरी बार मासिक धर्म हुआ था १५ अप्रैल को इसमें सात दिन और जोड़े तो हुआ.. २२ अप्रैल इससे तीन महीने पीछे की तारीख हुई.. २२ जनवरी

इस प्रकार प्रायः २२ जनवरी को बच्चा पैदा होगा। कुछ अवस्थाओं में तो स्त्री को ठीक इसी तारीख को बच्चा पैदा होगा; और प्रायः अवस्थाओं में इस तारीख के दस पाँच दिन के अन्दर ही

होगा। जब इस प्रकार वक्षा होने की तारीख का अनुमान कर लिया जाय, तब उचित यह है कि उससे दो तीन सप्ताह पहले ही प्रसव के सम्बन्ध की सब तैयारियाँ कर रखनी चाहिएँ।

यदि स्त्री को मासिक धर्म वरावर अनियमित रूप से कभी आगे और कभी पीछे हुआ करता हो, तब उसके सम्बन्ध में अनुमान की हुई यह तारीख उतनी ठीक नहीं होती जितनी ठीक उन स्थियों के सम्बन्ध में होती है, जिनका मासिक धर्म वरावर ठीक समय पर और नियमित रूप से हुआ करता है।

अच्छा डाक्टर या शिक्षित डाई नियुक्त करना—
जब ठीक तरह से यह पता लग जाय कि स्त्री को गर्भ है, तब उचित यह है कि कोई अच्छा डाक्टर या शिक्षित डाई मुकर्रर कर ली जाय। डाक्टर गर्भिणी स्त्री की अच्छी तरह परीक्षा करेगा और वच्चेदानी के आस पास की हड्डियों को अच्छी तरह नापेगा; और यदि उनमें कोई असाधारण बात या अन्तर दिखाई देगा तो उस दशा में अधिक अच्छा यह होगा कि प्रसव किसी अस्पताल में कराया जाय। पर यदि यह आशा हो कि प्रसव आप से आप और ठीक तरह से हो जायगा, तो फिर घर में ही प्रसव कराया जा सकता है। यदि प्रसव घर में ही होने को हो तो अपने डाक्टर या डाई से उन चीजों की एक सूची मांगनी चाहिए जिनकी प्रसव के समय आवश्यकता होती। और उस सूची की सब चीजें पहले से ही तैयार रहनी चाहिएँ। जिस समय प्रसव की पीड़ा आरम्भ हो, उस समय डाक्टर या डाई को तुरन्त बुला-कर गर्भवती के पास नियुक्त कर देना चाहिए।

प्रसव की तैयारियाँ—हमारे यहाँ प्रायः शिक्षित डाइयो से काम नहीं लिया जाता और पुराने ढंग की अशिक्षित डाइर्चा ही सब कुछ करती हैं। इसलिए पाठकों को ठीक ठीक यह बतलाना बहुत ही कठिन है कि यहाँ हर साल कितनी गर्भवती स्थियों की सूल्य होती है।

पर इनमें सन्देह नहीं कि उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। जो शिर्या प्रमव के बाद जीती बच्चे भी जाती हैं, वे भीतरी छंगों की पुरानी सूजन के कारण बहुत दिनों तक बीमार बनी रहती हैं। हस प्रकार की शिर्यों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। यदि प्रमव के भव्यन्ध की सब आवश्यक बातों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाय, तो इन प्रकार के आनावश्यक कष्टों से बहुत कुछ बचाव हो सकता है। प्रसव और उपच होनेवाले बच्चे के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हो, वे सब गर्भ के सातवें महीने तैयार हो जानी चाहिए। कोई शिक्षित दाई तो हससे भी कुछ और पहले नियुक्त कर लेनी चाहिए। प्रसव के भव्य और उमसे पहले के लिए हमने जो जो नैयारिया बतलाई हैं, वे सब बहुत ही आवश्यक हैं। उनकी ओर से कभी उडासीन नहीं रहना चाहिए।

प्रसव का कमरा— पहले से यह निश्चय कर रखना चाहिए कि प्रसव किस कमरे में कराया जायगा। गर्भ के नवे महीने से बहुत पहले ही वह कमरा भव नग्न में तैयार रहना चाहिए और प्रसव की भव तैयारियां भी पहले से ही दो जानी चाहिए। प्रमव के लिए पृक अच्छा और उपयुक्त कमरा चुनना चाहिए। यदि हो यके तो कमरा ऐसा होना चाहिए जो कहने की सभी आवश्यकताओं के लिए अनुकूल हो। घर की नालियां और मोरियां आदि बहुत साफ़ रखनी चाहिए। कमरा कुछ बड़ा होना चाहिए, उमसे अच्छी तरह हवा और रोगनी आनी चाहिए और यदि हो यके तो प्रसव में पहले उमसे सफेदी भी कग देनी चाहिए। जिन चीज़ों की कोई आवश्यकता न हो, वे सब कमरे से बाहर निकाल देनी चाहिए। छत, दीवारों और फर्श को अच्छी तरह साफ़ कर देना चाहिए और धो देना चाहिए।

गर्भवती के विस्तर के पास कुछ कुर्मियां या बैठने के लिए और चीज़ें भी आवश्य होनी चाहिए। याथ ही एक छोटा सन्दूक भी आवश्य

होना चाहिए जिसमें कपड़े और दूसरी ज़रूरी चीजें गईं और धूल से बचाकर रखी जा सकें। प्रसव के समय गर्भिणी स्त्री को जितनी चीजों की आवश्यकता हो सकती हो, वे सभी चीजें उस कमरे में पहले से तैयार रखनी चाहिएँ।

प्रसव के लिए आवश्यक चीजें—नीचे लिखी चीजें पहले से ही तैयार रखनी चाहिएँ—

(१) अस्पतालों में काम आनेवाला बहुत सा कपड़ा लिन्ट और साफ़ रहे।

(२) यदि गरीब आदमी हो और विकायती रहे का प्रबन्ध न कर सके तो गुप्त अंगों को धोने के लिए उसे पुराने कपड़े खूब अच्छी तरह धोकर और गरम पानी में उबाल कर रख लेने चाहिएँ।

(३) नाल बांधने के लिए डोरी।

(४) एक साफ़ कैंची।

(५) बाटर प्रूफ़ का ढुकड़ा या कुछ काग़ज़ या मैकिन्टोश।

(६) बहुत सा गरम पानी।

(७) बच्चे को नहलाने के लिए बरतन।

(८) साबुन की दो टिकिया।

(९) जैतून का तेल (Olive oil) दो आरम्भ।

(१०) पांच छः मुलायम तौलिए।

(११) बोरेसिक एसिड।

(१२) बांधने के लिए एक ढुकड़ा। जाड़े के दिनों में यह ढुकड़ा कलालैन का और गरमी में हल्के कपड़े का होना चाहिए।

(१३) बच्चे के कपड़े।

(१४) बच्चे के लिए रुमाल या छोटे छोटे ढुकड़े और गहिरा।

(१५) पानी गरम करने का एक बरतन या केतली।

(१६) ऐसा सामान जिससे चटपट आग सुखाई जा सके।

(१७) ऐसा बरतन जिसमें विस्तर पर केटे केटे मल त्याग किया जा सके ।

(१८) दूध पिलाने के लिए छोटा बरतन या प्याला ।

(१९) लाइसोल (Lysol) आठ आउन्स ।

(२०) अरगट का सर (Fluid Extract of Eggot)

(२१) रेफ़ी का तेल (Castor oil) दो आउन्स ।

(२२) ऊनी कपड़े का एक ऐसा ढुकड़ा जिसमें बच्चे को नहलाने से पहले लपेटा जाय ।

प्रसव के समय दिखाई पड़नेवाले लक्षण—

(१) शरीर का बहुत शिथिल और भारी हो जाना ।

(२) अंगों का बहुत भारी जान पड़ना ।

(३) कुछ खाने को जी न चाहना ।

(४) बार बार पेशाब लगना ।

(५) मूठे दरद होना ।

ये उनमें से कुछ ऐसे लक्षण हैं जो प्रसव-काल पास आने पर दिखाई पड़ते हैं ।

दृश्यों आदि के लिए सूचनाये—ऐसे अवसर पर सफाई की सबसे अधिक आवश्यकता होती है । प्रसव करनेवाली स्त्री के कल्याण और रक्त के लिए सफाई से बढ़कर आवश्यक और कोई बात नहीं है । इसलिए प्रसव के समय पास रहनेवाली स्त्री को सबसे पहले अपनी सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए । प्रसव करनेवाली स्त्री के पास जाने से पहले उसे अपने नासून कटवा लेने चाहिए । उसे साफ़ कपड़े पहनने चाहिए । हाथों और बाहों में पहनने की अँगूठियाँ, चूड़िया तथा और सब प्रकार के जैवर आदि बिलकुल उतार देने चाहिए । विस्तर के सब कपड़े बिलकुल साफ़ होने चाहिए । विस्तर पर पड़ी हुई स्त्री को कूने से पहले हाथ साबुन और पानी से अच्छी

तरह धो लेने चाहिएँ और लाइसेल लोशन में हुवा लेने चाहिएँ। यदि प्रसव के समय स्त्री को पाखाना हो जाय तो मल को हाथ नहीं लगाना चाहिए; और जो चीज़े गन्दी हो जायें, वे विलायती रहें और लोशन से साफ़ कर देनी चाहिएँ। बच्चे की नाल बांधने की डोरी और काटने की कैंची पहले गरम पानी में डालकर साफ़ कर देनी चाहिए। इन सब बातों का उपर्युक्त यह है कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो यो दिखलाई नहीं देते। ऐसे कीड़े बाहर से बच्चेदानी के अन्दर न जाने पावे।

यदि दाईं इन सब बातों का ठीक ठीक ध्यान रखेगी तो प्रसव करनेवाली स्त्री को प्रसूती बुखार होने का बहुत ही कम ढर होगा। प्रसव के समय का यह प्रसूती बुखार बहुत ही दुरा और कष्टदायक होता है। दाईं को सब बातें बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण करनी चाहिएँ और उसे सदा स्त्री को ढारस दिखाते रहना चाहिए। कभी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उसका जी छोटा हो।

बच्चा होने से पहले प्रसव करनेवाली स्त्री की कमीज़ या कुरते का आगा लपेटकर ऊपर कर देना चाहिए और उसमें एक पिन लगा देनी चाहिए। जब बच्चा हो जाय, तब एक छोटे चमच भर अरगट का सत थोड़े से पानी में मिला कर उसे पिला देना चाहिए।

प्रसव के समय खियों का उपस्थित रहना—प्रसव के समय स्त्री की देख-रेख करने के लिए एक शिक्षित दाईं नियुक्त करनी चाहिए। उस कमरे में बहुत सी खियों की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। एक तो उनके कारण हवा गन्दी होती है और दूसरे काम में अद्वचन होती है। उस समय वहीं केवल ऐसी ही खियों को उपस्थित रहना चाहिए जिन्हे स्वयं बच्चा जनने का अनुभव हो, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा हो, जो दाईं की बतलाई हुई बातों और सूचनाओं को अच्छी तरह समझ सकती हो, जो जल्दी घबरा न जाती हों, जो दूसरों से भ्रम रखनेवाली और सदा प्रसन्न रहने वाली हो; और सबसे बढ़कर आवश्यक बात यह है कि

उस अवसर पर वे अपना मन और अपना मिजाज वश में रख सकती हों ।

प्रसव की अवस्था—गर्भ में से बच्चे के उत्पन्न होने को प्रसव कहते हैं। हमारे यहा प्रसव के जो पुराने ढंग है, उनके कारण भारत में हर साल बहुत सी लिया मर जाती है। अब भारत में शिक्षित दाहयों और डाक्टरों की सहायता से प्रराव कराने की प्रथा चलनी चाहिए। अभी बहुत हाल तक यूरोप के देशों में भी लोग प्रसव के समय पुरुष डाक्टरों को प्रसव करनेवाली स्त्री के पास नहीं ले जाते थे। पर अब यह अवस्था बहुत कुछ बदल गई है। भारत-वासियों को ऐसी बातों के लिए तैयार करने में अभी बहुत कुछ परिश्रम और प्रयत्न करने की आवश्यकता होती। पर यह निश्चित है कि शीघ्र ही ऐसा समय भी आ जायगा जब सब लोग दाई या डाक्टर को नियुक्त करने के लाभ अच्छी तरह समझने लगेंगे और इस प्रकार उन बहुत सी लियों के प्राण नष्ट होने से बच जायेंगे जो हर साल उदासीनता, जा-परवाही, मूर्खता और निराधार मिथ्या विश्वासो के कारण मरती है। इस समय सर्वसाधारण की ओर से कोई विशेष प्रोत्साहन न होने के कारण शिक्षित दाहयों की संख्या बहुत कम है, इसलिए यहा हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो प्रसव के समय पास रहनेवाली लियों के लिए बहुत काम की है। यदि इन सब बातों का पूरा पूरा ध्यान रखा जायगा तो बहुत सी लियों मरने से बच जायेगी।

जब दरद जान पढ़ने लगे, तब किसी अच्छे डाक्टर या शिक्षित दाई को स्वर करा देनी चाहिए। प्रायः १५ या २० मिनट के अन्तर पर दरद जान पढ़ता है। उस समय गर्भवती स्त्री को तुरन्त ही लेट नहीं जाना चाहिए, बल्कि कोई ऐसा काम करने लगा जाना चाहिए जो उसे अच्छा लगता हो या जिसमें उसका जी लगे। दाई या उसके

पास रहनेवाली दूसरी खियो को अच्छी अच्छी बाते कहकर उसे प्रसन्न रखना चाहिए। जिस समय उसे यह जान पड़े कि बच्चा पेट में से नीचे की ओर बढ़ रहा है, तब उसे बिस्तर पर लेट जाना चाहिए। जिस समय दरद न होता हो, उस समय उसे नहीं लेटना चाहिए।

जिस कमरे में प्रसव होने को हो, उसमें सब आवश्यक चीज़े पहले से ही तैयार रहनी चाहिए^१। पानी अच्छी तरह गरम करके कुछ ठंडा कर लेना चाहिए और साफ़ तौलिए से ढँक देना चाहिए। गर्भवती झी को साड़ुन और पानी की वस्ती या एविमा (देखो परिशिष्ट) लेना चाहिए और गरम पानी से नहा कर साफ़ कपड़े पहन लेने चाहिए^२। लाइसोल लोशन बना रखना चाहिए (देखो परिशिष्ट) और बिस्तर तैयार कर रखना चाहिए। झी के गुप्त अंगों को कपर से नीचे तक कपड़े से नहीं बल्कि रुई से खूब अच्छी तरह धो देना चाहिए और तब लाइसोल लोशन से धोना चाहिए और उन्हें साफ़ रुई से ढँक देना चाहिए।

जिन खियो को पहले-पहल प्रसव होता है, उनकी यह किया ग्रामः अठारह घंटे में समाप्त होती है। इसके बाद फिर जो प्रसव होते हैं, उनमें औसत बारह घंटों का समय लगता है। पर फिर भी अलग अलग खियो में समय कुछ कम या अधिक भी लगता है। कुछ खियो का प्रसव बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ खिया ऐसी भी होती है जो कपर से देखने में तो बहुत अच्छी और बिलकुल ठीक जान पड़ती है, पर जिन्हें प्रसव में २४ घंटे से भी अधिक का समय लगता है। कुछ खियो को अधिक कष्ट होता है और कुछ को कम होता है। कुछ खिया ऐसी होती है जो इस कष्ट से बहुत ही शिथिल और निकम्भी हो जाती है। पर फिर भी ये सब बाते झी के साधारण स्वास्थ्य, शिश्चा और मनोबल आदि पर निर्भर करती हैं। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, त्यों त्यों दरद का ज़ोर और उसके रहने का समय दोनों बढ़ते जाते हैं। अगर दरद बहुत तेज़ हो तो प्रसव

बारह घंटे में ही हो जाता है; और नहीं तो उसमें अधिक समय लगता है। अन्त में यह अवस्था आ जाती है कि दरद प्रायः बराबर बना ही रहता है, बीच में ज़रा भी नहीं स्कता, और खींकी गुप्तेन्द्रिय में से बच्चे का सिर धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। इसके एक दो मिनट बाद फिर दरद होता है और बच्चा बाहर निकल आता है। इसके बाद कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे या उससे कुछ अधिक समय तक दरद नहीं रहता। फिर भग के अन्दर से मांस का एक लोगड़ा सा बाहर निकलता है जिसे आवश्यकता कहते हैं। यह नाल और जल्ही-समेत बाहर निकलता है। इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा दरद होता है। इस आवश्यकता के साथ कुछ कुछ खून भी निकलता है और तब बहुत कुछ आराम जान पड़ने लगता है।

नये उत्पन्न हुए बच्चे की रक्षा—नये उत्पन्न हुए बच्चे की रक्षा के लिए जो जो काम करने चाहिएँ, उनका वर्णन दूसरे स्थान पर किया गया है। पर इस अवसर पर पास रहनेवाली खींकी या दाढ़ी को जो जो काम करने चाहिएँ, उनमें से कुछ मुख्य मुख्य यहा बतला दिये जाते हैं।

(१) ज्यों ही बालक जन्म ले, त्यों ही दाढ़ी या पास रहनेवाली कोई दूसरी खींकी दाहिने हाथ की तर्जनी डेंगली बच्चे के मुँह के अन्दर डाल कर धीरे से हँधर उधर छुमावे, ऐसा करने से बच्चे के मुँह के अन्दर जो कुछ मैल या गन्दी चीज़ होगी, वह बाहर निकल आवेगी। ऐसा करने में कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मुँह के अन्दर डेंगली धीरे धीरे छुमाई जाय, तो उससे बच्चे को किसी प्रकार की हानि पहुँचने की सम्भावना नहीं है। ज्यों ही इस प्रकार मुँह साफ़ कर दिया जायगा, त्यों ही बच्चा रोने लगेगा। यदि इतने पर भी वह न रोने लगे, तो उसके पैर पकड़ कर इस प्रकार ऊपर उठाना चाहिए जिसमें उसका सिर नीचे की ओर हो जाय और तब

उसकी पीठ धीरे धीरे थपथपाना चाहिए। यह काम साधारण आदमी भी कर सकता है। हां यदि बनावटी ढंग से बालक का सांस चलाने की आवश्यकता हो, तो उसके लिए पहले से कुछ अनुभव और ज्ञान होने की आवश्यकता है।

(२) बच्चे की गरदन के पीछे हाथ ले जाकर यह देखना चाहिए कि नाल उसके गले के चारों ओर छड़ता से लिपटी हुई है या नहीं। यदि वह बहुत कसी हुई हो तो उसे सरका कर सिर के ऊपर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि इस प्रयत्न में सफलता न हो तो बायें हाथ की पहली दो बँगलियां नाल के नीचे से ले जाकर नाल में दो स्थानों पर गाठ लगा देनी चाहिए और तब दोनों गाठों के बीच से नाल को केंची से काट देना चाहिए।

(३) यदि नाल गरदन में न लिपटी हो तो उसे स्त्री की गुप्तेन्द्रिय से आठ अँगुल की दूरी पर उसमें गांठ लगा देनी चाहिए और दूसरी ओर बच्चे की नाभी से तीन अँगुल की दूरी पर उसमें एक और गांठ लगा देनी चाहिए; और तब उन दोनों गाठों के बीच से नाल को काट देना चाहिए। अगर खून बहने लगे तो उसे रोकने के लिए तुरन्त ही वहां एक और गांठ लगा देनी चाहिए। यदि ऐसा न किया जायगा तो अधिक खून बहने के कारण बच्चा मर जायगा।

ये सब काम कर चुकने के उपरान्त बच्चे को तो यों ही छोड़ देना चाहिए और तब प्रसूता की ओर ध्यान देना चाहिए। पर पहले बच्चे को किसी गरम कपड़े में लपेट देना चाहिए और किसी रक्षित स्थान में रख देना चाहिए। हर्वा उसकी माता के विस्तर पर नहीं रखना चाहिए।

(४) जो बोरोसिक इसिड (Boracic Acid) का घोल पहले से तैयार किया रखा है, उससे बच्चे की आस्ते धो देनी चाहिए।

आँखें—जब बच्चा गर्भ से बाहर निकल आता है, तब मांस का एक लोथड़ा गर्भ के अन्दर बचा रहता है जो बाद में बाहर निकलता है। नाला का एक सिरा तो बच्चे की नाभी में लगा हुआ होता है और दूसरा सिरा मांस के उसी टुकड़े में लगा रहता है। अलग अलग स्थियों में इस मांस के टुकड़े या आवल के बाहर निकलने का समय भिन्न भिन्न हुआ करता है। अर्थात् किसी का आवल जल्दी निकलता है और किसी का देर में। इसलिए उस आवल को बाहर निकालने में अनावश्यक रूप से जल्दी न करनी चाहिए; क्योंकि इससे माता को हानि पहुँच सकती है। शोषी देर बाद जब उसे फिर दरद होगा, तब यह आवल आपसे आप बाहर निकल आवेगा। यदि आध घण्टे तक भी आवल बाहर न निकले तो प्रसूता से खांसने के लिए कहना चाहिए और उसके पेह्ले को बाएँ हाथ से नीचे और पीछे की ओर दबाना चाहिए। यह काम पास रहनेवाली छी या दाढ़ी कर सकती है या स्वयं वह छी भी कर सकती है। यदि पास रहनेवाली छी इस तरह उसका पेह्ला दबाना चाहे, तो उसे प्रसूता को छूने के पहले अपने हाथ अच्छी तरह धो लेने चाहिएँ।

आवल गिर जाने पर जब बाहर निकल आवे, तब पास रहनेवाली छी को नीचे लिखे काम करने चाहिएँ—

(१) प्रसूता छी के शरीर पर के जो कपड़े गन्दे हो गये हों, वे निकाल कर अलग कर देने चाहिएँ।

(२) जो सादा पानी पहले से गरम किया हुआ तैयार रखा हो, उसमें रुई छुबाकर प्रसूता की गुप्तेन्द्रिय अच्छी तरह धोकर साफ़ कर देनी चाहिए और तब उसे लाइसोल लोशन (Lysol Lotion) से धोना चाहिए।

(३) इसके बाद गुप्तेन्द्रिय पर साफ़ और दबाओं से धोया हुआ तौलिया रख देना चाहिए और एक पट्टी से उसे अपने स्थान पर बांध

देना चाहिए। ऐसे तौलिये और उद्देश्य अंगरेजी उचावानों में मिल सकती है।

(४) इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि प्रसूता के विस्तर पर बहुत साफ़ चाँदनी या चादर बिछी रहे।

प्रसूता की शुश्रूषा के लिए आधुनिक हंग—यदि यह अभीष्ट हो कि प्रसूता प्रसव के बाद बिलकुल अच्छी होकर उठ खड़ी हो, तो पास रहनेवाली झींगी या दाईं को नीचे लिखी बातों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए—

(१) मुख और आङूलियति—साधारणतः देखने में झींगी की आङूलियति अच्छी होनी चाहिए और उससे किसी प्रकार की घबराहट या कष्ट नहीं मलकरना चाहिए। यदि किसी प्रकार की घबराहट या उत्तेजना दिखाई पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि प्रसूता को किसी प्रकार का कष्ट है और उस दशा में उसका इलाज होना चाहिए।

(२) शरीर का तापमान—पहले चार पांच दिन तक दिन में दो बार थरमामीटर से यह देखना चाहिए कि प्रसूता के शरीर का तापमान कितना है। प्रायः ऐसा होता है कि पहली रात को अधिक उत्तेजना के कारण तापमान १०० से १०१ डिग्री तक पहुँच जाता है। शरीर का तापमान अधिक होने का एक और कारण कब्ज़ा है। यदि २४ घण्टे के अन्दर ही तापमान अपने ढीक ठिकाने पर न आ जाय, तब समझ लेना चाहिए कि अन्दर कोई ख़राबी है; और उस दशा में तुरन्त किसी अच्छे डाक्टर को दिखलाना चाहिए। यदि ऐसा न किया जायगा तो सारे शरीर के खून में विष फैल जाने की बहुत बड़ी आशंका होगी। खाने में रखने से पहले थरमामीटर अच्छी तरह धो लेना चाहिए।

(३) लेटने का हंग—यदि प्रसव के उपरान्त झींगी सदा पीठ के बल या चित लेटी रहे, अपनी एक या दोनों ढार्गें ऊपर की ओर

खोंच रहे, उन्हें फैलावे नहीं और पेट के नीचे के भाग में दरड बरतलावे, तो समझ लेना चाहिए कि अन्दर के किसी अंग में सूजन आ गई है। उस दशा में भी तुरन्त अच्छे डाक्टर को दिखलाना चाहिए।

(४) **विश्राम**—प्रसूता के भली र्साति नीरोग होने के लिए उसका पूरी तरह से विश्राम करना बहुत ही आवश्यक है। उसे देखने के लिए उसके बहुत से सम्बन्धियों आदि को बार बार उसके पास नहीं जाना चाहिए। सिर्फ़ घर के लोगों को उसके कमरे में जाने देना चाहिए। कमरे में बहुत अधिक प्रकाश भी नहीं होना चाहिए; क्योंकि इससे भी विश्राम में बाधा पहुँचती है।

(५) **निद्रा**—निद्रा भी अच्छे स्वास्थ्य का एक लक्षण है। यदि प्रसूता को अच्छी तरह नीद न आती हो तो डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए; क्योंकि नीद न आने का कारण यह भी हो सकता है कि खून में विष फैल गया हो।

(६) **स्नाव**—प्रसव के बाद स्त्री की गुप्तेन्द्रिय से जो तरल पठार्य कुछ समय तक निकला करता है, छः दिन तक उसका रंग खाल रहता है और तब उसका रंग बढ़ाने लगता है। साधारणतः यह स्नाव उस दिन तक होता रहता है। यह स्नाव धीरे धीरे आपसे आप बन्द हो जाना चाहिए और उसमें दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। यदि वह एकाएक रुक जाय या उसमें से दुर्गंध आती हो तो तुरन्त डाक्टर से मशविरा लेना चाहिए।

(७) **पेशाव**—कुछ खियां लेटी लेटी पेशाव नहीं कर सकतीं, क्योंकि उन्हें इस प्रकार बरतन में पेशाव करने की आदत नहीं होती। ऐसी खियों को पेशाव करने के लिए उड़ाकर बैठा देना चाहिए और इसके लिए पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए; क्योंकि यदि ऐसा न किया जायगा तो फिर यन्त्र की सहायता से उनका पेशाव उतारना पड़ेगा। जब तक नितान्त आवश्यक न हो जाय, तब तक कभी इस प्रकार यन्त्र

से पेशाब न उत्तरवाना चाहिए। यदि प्रसव के बाद स्त्री को पेशाब न हो, तो हाथ से उसका पेहुँ दबाना चाहिए और पेशाब करने के लिए उसे उठाकर बैठा देना चाहिए। यदि इतने पर भी पेशाब न हो तो पेट के नीचे का भाग सेंकना चाहेए। यदि इन सब उपायों पर भी पेशाब न हो तो डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए। पेशाब न होने से मसाना या मूत्राशय पेशाब से भरा रहता है, जिससे गर्भाशय के अच्छे होने में देर लगती है और उससे जननेन्द्रिय को और अनेक प्रकार से हानि पहुँचते की सम्भावना रहती है।

(८) पाखाना—यदि पाखाना आपसे आप ठीक तरह से न होता हो तो प्रसव के तीसरे दिन प्रसूता को एक आरन्स रेडी का तेल पीना चाहिए। यदि उसे रेडी का तेल अच्छा न लगता हो तो एक बड़े चमच में रैशिल साल्ट या सोडियम पोटेशियम टार्टरेट (Rochelle Salts or Sodium Potassium tartarate) आधे गिलास गरम पानी में मिलाकर पीना चाहिए। सबेरे और कोई चीज़ खाने या पीने से पहले यहीं पीना चाहिए।

प्रसव की अवस्था में कब्ज़ियत से बहुत कष्ट होता है। यदि रात के समय एक आरन्स पानी में एक छोटे चमच भर तरल फैस्करा सैग्रेडा (Cascara Sagrada) पी लिया जाय तो उससे भी पाखाना साफ़ हो जाता है। इसकी जगह तरल पैराफिन (Liquid Paraffin) का भी व्यवहार किया जा सकता है। यदि प्रसूता को कब्ज़ियत हो तो उस बच्चे को भी कब्ज़ियत हो जाती है जिसे वह दूध पिलाती है।

(९) भोजन—पहले दो दिन प्रसूता को केवल दूध पीकर रहना चाहिए। यदि प्रसूता को दूध अच्छा न लगता हो तो उसे बीच बीच में एक प्याला चाय, कहवा या शोरबा देना चाहिए। तीसरे दिन जब एक आरन्स रेडी का तेल पीने के कारण साफ़ पाखाना हो जाय और भूख, जो साधारणतः प्रसव के बाद बन्द सी हो जाती

है, किर से खुलकर लगे, तब उसके लिए साढे और पौष्टिक भोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। पर जब तक प्रसूता स्वयं कुछ भारी भोजन के ग्राति रुचि न प्रकट करे तब तक आरम्भ के कुछ दिनों में कभी उसे ज़ुवरदस्ती भारी भोजन नहीं देना चाहिए।

नीचे लिखी सूचनाओं से बहुत कुछ काम चल सकता है—

पहले चौबीस घंटे—दूध, शोरबा या कहवा।

दूसरे दिन—फिर ऊपर लिखी चीजें।

तीसरे दिन—एक आरम्भ रेही का तेल। भोजन वही पहले दो दिनों के समान।

चौथे दिन—दूध, शोरबा, सेकी हुई पाव रोटी, तरकारी और यदि प्रसूता खाया करती हो तो अंडे भी। साधारणतः इसी टिन से खी को चे ही चीजें, खाने के लिए दी जाने लगती हैं जो वह सदा खाया करती है। फल भी खाये जा सकते हैं।

पाँचवें दिन—चौथे दिन के समान ही।

धीरे धीरे प्रसूता का अपना वही साधारण भोजन आरम्भ कर देना चाहिए जिसकी उसे सदा से आदत हो। यदि एकाएक नित्य का और भारी भोजन आरम्भ कर दिया जायगा तो उससे पाचन-शक्ति के विगड़ जाने का भय रहेगा। और पाचन-क्रिया का विगड़ना न तो स्वयं उसके पक्ष में ही ठीक है और न उसकी सन्तान के पक्ष में ही। जो खी साधारणतः अच्छी और स्वस्थ हो, वह भी यदि विस्तर पर उपचाप पड़े रहने की डशा में भी वह पठार्थ खायगी, जो वह उठने-वैठने और काम-धन्धा करने की डशा में खाया करती है तो वह बीमार हो जायगी।

प्रसव के बाद प्रसूता को निश्चितरूप से बीमार ही नहीं समझा जेना चाहिए। पर फिर भी उसके मन और शरीर को पूरे विश्राम

की आवश्यकता रहती ही है। उसके कमरे में काफ़ी हचा और रोशनी आने की भी बहुत आवश्यकता होती है।

चौथे दिन के बाद प्रसूता के शरीर का ऊपरी भाग नित्य धो दिया जाना चाहिए और हर दूसरे दिन सारा शरीर धोना चाहिए। जब-क्षाव में खून दिखलाई पड़ना बन्द हो जाय, उसके पांच दिन बाद अर्थात् प्रसव से तेरहवें दिन प्रसूता को पूरी तरह से स्नान कराना चाहिए। यदि इससे पहले स्नान किया जायगा तो उससे तन्दुरुस्ती खराब होने का डर होगा।

प्रसूता को बहुत जल्दी बिस्तर छोड़कर न उठ बैठना चाहिए। कुछ स्थिरा प्रसव के बाद जल्दी ही सब काम-धन्धा करने के लिए तैयार हो जाती है। यह बहुत हानिकारक है। प्रसव के कारण ज्यों के भीतरी अंगों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं और वे प्रायः छः सप्ताह में अपनी साधारण आवस्था में आते हैं। भारत में भी यही प्रथा प्रचलित है कि प्रसव के चालीस दिन बाद तक स्थिरा आराम करती हैं। पर यदि परिस्थिति ही ऐसी हो कि जल्दी बिस्तर छोड़कर उठना और काम-धन्धा करना पड़े तो उसे बहुत धीरे धीरे ऐसा करना चाहिए। चौथे दिन वह केवल पन्द्रह मिनट के लिए उठकर बैठ सकती है और इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ाती हुई पांचवें दिन आध घंटे, छठे दिन प्रायः यौन घंटे, सातवें दिन सबेरे-सन्ध्या आध आध घंटे, आठवें दिन भी इसी तरह और नवे तथा दसवें दिन सबेरे-सन्ध्या एक एक घंटे उठकर बैठ सकती है।

केवल बिस्तर छोड़कर उठ खड़े होने से ही प्रसूता जल्दी अच्छी नहीं हो जाती। शरीर के रग पट्ठे धीरे धीरे ही ठिकाने आवेगे। यदि जल्दी काम-धन्धा आरम्भ कर दिया जायगा तो, और विशेषतः उस आवस्था में जब कि ज्यों बीमार होगी, उसके शरीर में अन्दर ही अन्दर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जायेंगे। ऐसी आवस्था में जब

तक उसका शरीर बिलकुल ठीक न हो जाय और डाक्टर आज्ञा न दे, तब तक उसे विस्तर पर ही पढ़े रहना चाहिए ।

शरीर की आकृति ठीक रखना—शरीर की आकृति ठीक रखने और रग-पट्ठों का लचीलापन बड़ाने के लिए प्रसूता को विस्तर पर पढ़े पढ़े ही अपने हाथ पैर हिलाने चाहिए और नित्य कुछ मिनटों तक उसे उन अंगों को धुमाना और सीधा करना चाहिए । हृस्से पेट और पैरों के पट्ठे ठीक अवस्था में बने रहते हैं जिससे शरीर की शक्ति बिगड़ने नहीं पाती । यदि हो सके तो उसे नीचे लिखे प्रकार से व्यायाम करना चाहिए—

(१) विस्तर पर लेटे लेटे पहले तो दोनों बांहों की सहायता से और तब बिना उनकी सहायता के शरीर का ऊपरी भाग ऊपर उठाना चाहिए और बैठने के आसन में होने का प्रथत्व करना चाहिए । कुछ देर तक अच्छी तरह लेटे रहने के बाद यह क्रिया होनी चाहिए और दिन में कई बार होनी चाहिए ।

(२) यही क्रिया अपनी दोनों बाहों को अपनी छाती पर इधर-उधर अर्थात् दाढ़िना हाथ बाँह तरफ और बायीं हाथ दाढ़िनी तरफ रखकर और फिर बाहों को आगे की ओर फैलाकर करनी चाहिए ।

(३) प्रसूता अपने दोनों धुटनों को मिलाकर रखे और दाँह से उन दोनों को आपस में अलग करने के लिए कहे । जब दाँह उन धुटनों को अलग करने के लिए ज़ोर लगावे, तब वह उसके विरुद्ध धुटनों को सटाये रखने के लिए ज़ोर करे ।

(४) इसके सिवा प्रसूता को अपना पेट सूब ज़ोर से फुलाना चाहिए और फिर सूब सिकोड़ना चाहिए और इस प्रकार पेट के अन्दर के पट्ठों का व्यायाम करना चाहिए ।

ये सभी व्यायाम बहुत ही धीरे धीरे और सचेत होकर करने चाहिए । पेट और रानों की मालिश का भी बहुत अच्छा फल होता

है। यदि उस पर चारों ओर से अच्छी तरह एक पट्टी वाध ली जाया करे तो यह भी बहुत अच्छा है।

अनितम सूचनाये—छोटी अवस्था के बच्चों की मृत्यु की संख्या घटाने के प्रश्न पर पाश्चात्य देशों के निवासी बहुत ही गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। इस उद्देश्य के सिद्धि के लिए वे लोग गर्भावस्था के समय खियों की देख-रेख पर दिन पर दिन अधिक ध्यान देने लगे हैं। इधर हाल में उन कारणों का पता लगाया गया है जिनसे गर्भपात हो जाता है या मरा हुआ बच्चा उत्पन्न होता है; और इन दोनों बातों को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी निकाले गये हैं। उन उपायों का फल आशा से कहीं बढ़कर हुआ है। सबसे पहली बात तो यह हुई है कि छोटे बच्चों की मृत्यु की संख्या बहुत घट गई है। और दूसरी बात यह हुई है कि आज से बीस वरस पहले जितने असमय गर्भपात होते थे और जितने मरे हुए बच्चे उत्पन्न होते थे, उनकी अपेक्षा अब बहुत कम होने लगे हैं। शिशु के कल्याण और गर्भिणी रुक्षी के स्वास्थ्य में अब भी बहुत धना सम्बन्ध है और गर्भिणी रुक्षी का अच्छा स्वास्थ्य गर्भावस्था में उसकी अच्छी देख-रेख पर निर्भर करता है। यदि गर्भ की अवस्था में स्वास्थ्य बराबर अच्छा बना रहे तो असमय गर्भपात, मरे हुए बच्चों के जन्मने और बिना पूरी तरह से बढ़े हुए बच्चों के उत्पन्न होने के अवसर बहुत कम हो सकते हैं।

पाश्चात्य देशों में जब मरे हुए बच्चे उत्पन्न होते हैं, तब उनकी सूचना स्वास्थ्य-विभाग के अधिकारियों को दी जाती है और वे उनका लेखा और विवरण तैयार करते हैं। भारत में भी योड़ा सा व्यय करके म्युनिसिपेलिटीयां यह काम बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं; और इस प्रकार हर साल इसके लेखे तैयार हो सकते हैं और उन पर भवी भाति विचार किया जा सकता है। भारत की खियों में जितने असमय गर्भपात होते हैं, उन सबका लेखा तैयार करना सहज काम नहीं है; परं किर भी उनकी संख्या कम नहीं होती। ये सब और इसी

प्रकार की और दूसरी बातें राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्व की हैं और इस योग्य हैं कि सरकार और प्रान्तीय अधिकारी इस पर बहुत तत्परता के साथ विचार करे। यह बात माननी पड़ेगी कि इधर कुछ वर्षों में प्रान्तीय सरकारों और भारत-सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न किये हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण आदि में शिशु-सप्ताह मनाये जाने लगे हैं। परन्तु ये ही प्रयत्न यथेष्ट नहीं हैं। इस प्रकार की सरकार की सहायता के सिवा यदि सब लोग आपस में मिलकर उस ढंग की संस्थाएँ स्थापित करें जिस ढंग की संस्थाएँ हैंजैड में माताओं और बच्चों के कल्याण के लिए (British National League for Maternity and Child Welfare) हैं, तो उनसे भारत की स्थियों का बहुत भला होगा; क्योंकि भारत की स्थियों को यह जानने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि गर्भ के दिनों में किस प्रकार सचेत रहना चाहिए, बच्चों का लालन-पालन किस प्रकार करना चाहिए और उन्हे किस प्रकार खिलाना-पिलाना चाहिए। इस प्रकार की संस्थाएँ सब जगह एक साथ ही नहीं स्थापित की जा सकतीं। इस-लिए अधिक उत्तम यही है कि भारत की स्थियों को ज्यों ही यह पता चले कि वे गर्भवती हैं, त्यो ही उन्हे उचित है कि वे किसी अच्छे डाक्टर की देख-रेख में रहने लगे। उनके लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है, और यदि वे इस रास्ते पर चलने लगें तो फिर उन्हें और किसी बात की आवश्यकता न रह जाय। इधर कुछ दिनों से कुछ समझार स्थिया इस दुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग पर चलने लगी है और डाक्टरों के परामर्श और अनुभवपूर्ण ज्ञान का महत्व समझने लगी है। पर उनकी संख्या बहुत ही कम है और स्थियों के रोगों तथा छोटे बच्चों की मृत्यु की अधिकता का यह हाल है कि उनका ध्यान करके रोएँ खड़े हो जाते हैं।

गर्भवती स्त्री को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ का आरम्भ ही अच्छा न होगा। उसका भविष्य भी कभी अच्छा

नहीं हो सकता। इसलिए ज्यों ही उसका स्वास्थ्य ज़रा भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे, यो ही उसे तुरन्त डाक्टर को दिखलाना चाहिए। उसे सदा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में प्रसव के समय बहुत सी स्त्रियाँ मर जाती हैं और जो स्त्रियाँ मरने से किसी प्रकार बच भी जाती है, वे प्रसव के बाद बहुत दिनों तक बहुत बीमार रहती है। इसलिए गर्भिणी स्त्री को गर्भ के दिनों में अपने आपको तन्दुरुस्त बनाये रखने के लिए कोई बात उठा नहीं रखनी चाहिए; और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसमें वह अच्छी तरह प्रसव करके फिर तन्दुरुस्त बनी रहे।

तीसरा प्रकरण

जन्म के समय से बालक की रक्षा

माता के प्रति—इस प्रकरण में यह बतलाया जायगा कि जन्म के समय से बालक की रक्षा आदि किस प्रकार की जानी चाहिए। उस समय तुम्हे तो बहुत ही कम काम करना पड़ेगा। इस प्रकरण में जितनी बातें बतलाईं गईं हैं, वे सब दाईं आदि के ही करने की हैं। पर साथ ही तुम्हे भी इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इनका सम्बन्ध स्वयं तुम्हारी सन्तान से है। यदि तुम्हे इन सब बातों का पूरा पूरा ज्ञान होगा, तो तुम यह बात अच्छी तरह समझ सकेगी कि अच्छी शिक्षित दाईं और अशिक्षित दाईं में कितना अन्तर होता है। यदि तुम देखो कि जो दाईं तुम्हारे पास रहती हैं, वह इस प्रकरण में बतलाईं हुई बातों के अनुसार काम नहीं करती, तो तुम उसे हटा दो और दूसरी अच्छी दाईं नियुक्त करो। तुम्हें ऐसी होशियार दाईं मिलनी चाहिए जो अपना काम खूब अच्छी तरह जानती हो। यह तो ज्यव-हार की बात है। वह जो कुछ काम करेगी, उसके लिए तुम्हें कुछ धन देना पड़ेगा। फिर उसकी भूल या अज्ञान के कारण तुम या तुम्हारा बच्चा क्यों सकट में पड़े। ऐसी बातों में तुम अपने पुराने तंग विचारों और भावों को छोड़ दो और समझदारी से काम लो। इसके बढ़ते में स्वयं तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और तुम्हारे बच्चे की भी रक्षा होगी।

नाभि को ढोरी से बाँधना—ज्यो ही बच्चा उत्पन्न हो, ल्यो ही दाईं को उचित है कि बच्चे की नाभि की नाल बाँध दे। नाभि की

जड़ से तीन औंगुल की दूरी पर निशान करके वहाँ डोरी से बाँध दे : फिर उस गांठ से कुछ दूर पर छी की गुसेन्ड्रिय से प्रायः आठ औंगुल की दूरी पर एक दूसरी गांठ लगा दे और तब दोनों गांठों के बीच से नाल को किसी तेज़ चाकू से उसकी धार ऊपर की ओर करके चा किसी कैंची से काट दे । चाकू या कैंची को पहले से ही गरम पानी में डवाल लेना चाहिए । यदि चाकू या कैंची गन्दी और मैली होगी तो कई रोगों के विष फैलने का डर रहेगा । इस प्रकार के रोग हल्के और साधारण भी हो सकते हैं; पर कभी कभी इतने भीयश भी होते हैं कि उनके कारण बच्चे की जान पर आ बनती है, इसलिए इस काम में सदा बहुत साधारणी रखनी चाहिए ।

बच्चे को कपड़े में लपेटना—जब नाभि की डोरी बँध जाय तब बच्चे को किमी गरम कपड़े में, और विशेषतः जाड़े के दिनों में तो अवश्य ही, लपेटकर रख देना चाहिए । गर्भ के अन्दर बच्चा खूब गरम रहता है और बाहर की हवा गर्भ की भीतरी गरमी के मुकाबले में बहुत उण्डी होती है । यदि इस बात का व्यान न रखा जायगा तो बहुत सम्भव है कि बच्चे को सरदी लग जाय । कपड़ा इस तरह लपेटा जाना चाहिए जिसमें बच्चे के मुँह के पास उसके सांस लेने के लिए काफ़ी जगह बची या खुली रहे । इसके बाद ढाई को चाहिए कि वह बच्चे को पलंगढ़ी पर लिटा दे और तब दूसरे कामों में लगे ।

छोटे बच्चे की आँखें—यदि बच्चे की आँखों में किमी तरह का कीचड़ या मैल आदि लगी हो तो वह साफ़ रूई के दुकड़े से पॉछड़ दी जानी चाहिए । थोड़ा सा बोरेसिक एसिड (Boracic Acid), उतना ही जितना एक पैसे पर आ जाय, गरम किये हुए पानी के एक प्याले में धोल दिया जाय, और तब साफ़ रूई की सहायता से इसी धोल से उसकी आँखें अच्छी तरह धोकर साफ़ कर दी जायें । यदि आँखों में कुछ सूजन हो तो तुरन्त डाक्टर को बुलाना चाहिए; ज्योकि बच्चे के

जन्म लेते ही आँखों में जो सूजन होती है, वह प्रायः उसकी इटि के लिए हानिकारक होती है। इस महत्व की बात का ध्यान न रखने के कारण कुछ बच्चे अनधे हो जाते हैं। नये जन्मे हुए बच्चों की आँखों को प्रकाश की चमक से भी बचाना चाहिए।

नाक—यदि नाक में कोई चिकना पदार्थ लगा हो तो उसे भी साफ कर देना चाहिए।

कान—यदि कान में किसी तरह की मैल जमी हो तो वह भी पानी साखनेवाली रुद्ध गरम पानी में भिगोकर उससे साफ कर दी जाय। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज़ बच्चे के कान के अन्दर न चली जाय।

चिकना पदार्थ दूर करना—बच्चे के शरीर पर जहा कहीं कोई चिकना पदार्थ लगा हो, डाई को उचित है कि वह सब साफ रुद्ध की सहायता से पोछ दे और उसके सारे शरीर पर जैतून के तेल की मालिश कर दे।

बच्चे का पहला स्नान—जाई के दिनों में बच्चे को पहले पहल किमी गरम कमरे में नहलाना चाहिए। धूतु के अनुसार बच्चे को या तो गुनगुने पानी से या गरम पानी से स्नान कराना चाहिए।

बच्चा डाई की गोद में लेटा रहना चाहिए और उसे साढ़ुन मलकर अच्छी तरह नहलाना और साफ करना चाहिए। थगल, रानों के बीच और इसी प्रकार के दूसरे स्थानों को खुब ध्यान से साफ करना चाहिए और तब उसे गरम पानी से स्नान कराना चाहिए। साढ़ुन बच्चे की आँखों में न जाने पावे, नहीं सो उसे बहुत कष होगा। जाई के दिनों में बच्चे को अँगीठी आटि के सामने रखकर स्नान कराना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किमी तरफ से ठण्डी हवा का मोका न आने पावे। उसके

पहले स्नान में दो तीन मिनट से अधिक समय न लगना चाहिए; और स्नान के लिए पानी खुर्च करने से किफायत नहीं करनी चाहिए।

स्नान करने के कारण बच्चे के शरीर में जो पानी लग गया हो, वह शरीर पर कोई मुख्यायम तौलिया धीरे धीरे रखकर सुखा देना चाहिए। तौलिए से उसका शरीर कभी ज़ोर से रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नये जन्मे हुए बच्चे का शरीर बहुत ही कोमल होता है। शरीर पर का सारा जल अच्छी तरह और बहुत जल्दी जल्दी सुखाना चाहिए।

स्नान कराने के बाद बच्चे का शरीर बहुत अच्छी तरह देख लेना चाहिए और यह देख लेना चाहिए कि उसके किसी अग में कोई असाधारण बात तो नहीं है। दाईं को अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि शरीर में कहीं कोई ख़राबी या चोट आदि का निशान तो नहीं है। यदि मल या मूत्र त्याग करने के भाग बन्द हों, तो तुरन्त डाक्टर को जुलबाकर दिखलाना चाहिए। यदि इस बात में गृफलत की जायगी तो बच्चे की जान जाने का भय होगा।

नाभि की नाल—स्नान के बाद सबसे अधिक ध्यान देने की चीज़ नाभि की नाल है। उसे अच्छी तरह साफ़ करके उस पर पाउडर छिपक देना चाहिए। पाउडर ज़िंक आक्साइड (Zinc Oxide), स्टार्च (Starch) और बोरेसिक एसिड (Boracic Acid) तीनों एक एक आवन्स मिले हुए हो। यह पाउडर पहले से ही खूब अच्छी तरह तीनों चीजें मिलाकर तैयार करके चौड़े मुँह की बोतल या शीशी में रखा रहना चाहिए।

बोरेसिक लिण्ट का तीन इंच चौड़ा और चार इंच लम्बा एक ढुकड़ा लेकर उसके बीच में एक छेद करना चाहिए; और उस छेद के बीच में से नाल निकाल ली जाय। अब उस लिण्ट पर कई छोटे चमच भरकर

वह पाड़उर डाल दिना जाय और तब वह लिए इस प्रकार लपेट लिया जाय जिस प्रकार दबा बेचनेवाले लोग दबा की पुष्टिया लपेटते हैं। ऐसा करने से पाड़उर नाल के साथ बराबर लगता रहेगा। इस क्रिया से नाल बहुत जलदी सूख जाती है। नियमित भारत में जो बहुत से बच्चे जन्म लेते ही भर जाते हैं, उनमें से बहुतों के भरने का कारण यही होता है कि नाल की जैनी व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी नहीं होती। या तो नाल काटने के समय लोग सचेत नहीं रहते और या नाल के कटकर गिरन से यहले अथवा नाभि के अच्छे होने से पहले कुछ असाधारणी की जाती है। ये सब बातें उन्हीं पुराने ढंग की दाइयों के अज्ञान के कारण होती हैं जो बच्चा जनाने का काम करती हैं और जिनका नाल को पकड़ने और काटने आदि का ढंग बहुत ही गंदा होता है। नाल की ठीक ठीक रचा करने के लिए प्रायः चौथाई इंच मोटा, दो इंच लम्बा, और दो इंच चौड़ा साफ़ गाज़ (Sterile Gauze), का एक टुकड़ा लेना चाहिए और उसे नाभि के कपर रखकर पेट पर इस प्रकार पट्टी बाघ दी जानी चाहिए जिसमें वह अपने स्थान से इधर-उधर न झटे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की नाभि के रास्ते से आते बाहर निकल आती है। यदि इस प्रकार गाज़ रखकर पट्टी बाघ दी जायगी तो नाभि में से अंतों के बाहर निकलने का भय न रहेगा। यह गही और पट्टी आरम्भ में बराबर एक महीने तक बँधी रहनी चाहिए।

पट्टी—यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि साधारण अवस्थाओं में पेट पर जो पट्टी बांधी जाती है, वह छोटे बच्चों के पेट पर बांधने के लिए ठीक नहीं होती। वह प्रायः कपर या नीचे लिसक जाती है, नाभि खुल्ज जाती है और उस पर की गही हट जाती है। प्रायः मल-मूत्र से भी वह खुराब हो जाती है। इस बात को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि पट्टी उस ढंग से बांधी जाय जो ढंग इस चित्र में दिखलाया गया है। यदि इन सूचनाओं का ठीक तरह से

पालन किया जायगा तो नामि बहुत जलदी अच्छी हो जायगी और उसका धाव भर जायगा ।

यदि नाल मे से खून बहता हो तो नाल को फिर से अच्छी तरह बांध देना चाहिए । जहाँ पहले गांठ दी गई हो, उसके पास ही एक और गांठ दे देनी चाहिए । इससे खून अवश्य ही रुक जायगा ।

नाल को शरीर से अलग करना—बच्चे के जन्म लेने से पांच सात दिन के अन्दर ही साधारणतः नाल उसके शरीर से अलग हो जाती है । पर कभी कभी वह दस या पन्द्रह दिन तक भी उसके साथ ही लगी रहती है । नमी और सीड़ आदि के कारण ही नाल अधिक दिनों तक शरीर के साथ लगी रहती है । यदि नाल को पानी से बचाया जाय तो वह जलदी सूख जायगी और साधारणतः पांचवे दिन कटकर अलग हो जायगी । नाल पर सदा पाउडर छिड़कते रहना और बोरोसिक लिण्ट या साफ़ रुई मे लपेटना (जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है) बहुत ही खाभदायक होता है । नाल को सूखा रखना बहुत ही आवश्यक है । यदि नाल का ठीक ठीक ध्यान न रखा जाय तो अनेक प्रकार के भीषण रोगों की सम्भावना रहती है । इसके लिए बहुत तेज़ कीटाणुनाशक (Antiseptic) औषधों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण नाल के अलग होने से बहुत देर लगती है ।

यदि एक सप्ताह तक भी नाल अलग न हो तो घबराने या चिन्ता करने की कोई बात नहीं है । अपनी ठीक अवस्था मे पहुँचकर वह आपसे आप गिर जायगी । उसे खीचने या और किसी प्रकार अलग करने के कारण बच्चे को बहुत कष्ट होता है और कभी कभी तो उसके प्राणों पर आ बनती है । इस किया को आपसे आप होने देना चाहिए । यदि नाल के बाहर निकल आने पर भी नामि से कुछ धाव सा बाकी रह जाय, तो बराबर सबेरे और सन्ध्या लिण्ट पर थोड़ी सी बोरोसिक की मरहम (Boracic Ointment) रखकर नामि पर लगा

देनी चाहिए, और जब तक नाभि का घाव विलकुल अच्छा न हो जाय, तब तक ऐसा करते रहना चाहिए। जब तक नाल शरीर से विलकुल अलग न हो जाय, तब तक वच्चे को पूरा स्नान नहीं कराना चाहिए।

यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि वच्चे के जन्म लेने के उपरान्त उसके शरीर के साथ नाल ही एक ऐसी चीज़ रहती है जिसके द्वारा शरीर में सबसे अधिक विपों और रोगों आदि के फैलने का भय रहता है; और जब नाल गिरकर अलग हो जाती है, तब नाभि पर का घाव मानों इस प्रकार के रोगों और विपों आदि के शरीर में प्रविष्ट होने के लिए दूसरा द्वार बन जाता है। इसलिए नाल और नाभि के सम्बन्ध में सबसे अधिक सफाई का ध्यान रखना चाहिए; और जिन द्रवाओं में नमी या चिकनाहट हो, वे कभी नाभि या नाल पर नहीं लगानी चाहिएँ। नाल या नाभि को छूने से पहले हाथ बहुत अच्छी तरह सफाई कर लेने चाहिएँ।

सफाई—प्रसूता और वच्चे दोनों के गन्डे कपड़े और सब प्रकार की गन्डी चीजें जर्हा तक जल्डी हो सके, हटा देनी चाहिएँ। यह विषय इतने महत्व का है कि यदि इसकी व्येषा की जाय तो इससे वच्चे के स्वास्थ्य और जीवन को बहुत बड़ी हानि पहुँच सकती है। क्षेत्र और गन्डे घरों में गरमी के दिनों में और विशेषतः ऐसे स्थानों में जर्हा भूल या गन्डी हवा रहती है अथवा प्रकाश ठीक तरह से नहीं पहुँचता, इस प्रकार की हानि पहुँचने की और भी अधिक सम्भावना रहती है। ताजी हवा से कभी सरदी नहीं लगती, न जुकाम होता है। उससे तो जीवन और स्वास्थ्य आता है और ग्राण्ड-ग्रांडि बढ़ती है।

स्लमाल—वच्चों की कमर में उनके पेशाव या पाखाने आदि के लिए जो स्लमाल बांधे जाते हैं, वे ज्यों ही गन्डे हों त्यों ही तुरन्त बदल दिये जाने चाहिएँ। ग्रायः लोग ऐसा करते हैं कि जब वच्चा ढो ढो और तीन तीन बार पाखाना या पेशाव कर जुकता है, तब उसका

रूमाल बदलते हैं। यह बहुत ही बुरी बात है। इससे बच्चे के शरीर में सूजन या पीड़ा होने लगती है और उसे बहुत कष्ट पहुँचता है। इसलिए सदा साफ़ और सूखे रूमाल हर समय तैयार रखने चाहिए।

बच्चे के लिए आवश्यक चीजों की टोकरी—एहले से ही एक अच्छी टोकरी तैयार रखनी चाहिए जिसमें बच्चे की नित्य प्रति की सभी आवश्यक छोटी छोटी चीजें रखी रहा करें। इसमें साखुन, सेफ्टी पिन, सुई, तागा, कुन्द नोकवाली कैंची, पट्टी, पाउडर, दवाओं से लाफ़ की हुई रुई, कुछ छोटे रूमाल और दूसरी सभी आवश्यक चीजें रहनी चाहिए। अगर सब सामान से दुरुस्त इस प्रकार की एक टोकरी पहले से ही तैयार कर रखी जाय तो समय की बहुत कुछ बचत और कठिनाइयों से बचाव हो जाता है।

चौथा प्रकारण

बच्चों को दूध पिलाना

माता के प्रति—यह प्रकरण सबसे अधिक महत्व का है। इसे बहुत ही व्यान से पढ़ना चाहिए। और इसमें जो छोटी से छोटी बातें कही गई हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यह मानों बच्चे के स्वास्थ्य, बल और सुन्दरता की कुंजी है। इस प्रकरण में जो बातें बतलाई गई हैं, यदि तुम उनके अनुसार ढीक तरह से चलोगी, तो तुम्हारा बच्चा कभी बीमार न पड़ेगा। और यदि संयोग से वह कभी बीमार पड़े भी जाय तो उसकी बीमारी डिनरी साधारण और हल्की झोरी कि तुम्हें उसके लिए कुछ अधिक चिन्ता न करनी पड़ेगी। इसके मिला यह प्रकरण अच्छी तरह पढ़ने से तुम्हें बहुत भी मेरी बातें मालूम हो जायेंगी जिनके कारण तुम मेरी बहुत भी भूलों से बच जायेंगी जो भूलें साधारणतः बहुत भी स्थिरी किया करती हैं; और तुम उन अनेक कठ्ठों और कठिनताओं से भी बच जायेंगी जो इन भूलों के कारण साधारण दूध पिलानेवाली माताओं और उनके बच्चों को भोगनी पड़ती हैं।

छातियों से दूध पिलाना—बच्चे को दूध पिलाने का सबसे अच्छा ढंग यह है कि उसे छातियों से दूध पिलाया जाय। यह प्रकृति का निया हुआ भोजन है और नये जन्मे हुए बच्चे के लिए सबसे अधिक पचनेवाला और बल बढ़ानेवाला तथा उसका पोषण करनेवाला है। संसार का और कोई भोजन इसकी वरावरी नहीं कर सकता। जन्म लेने से पहले बच्चे का पोषण माला के खून से होता है और उसके जन्म के

समय प्रहृति उसकी माना की छातियों से दूध के रूप में उसके लिए भोजन तैयार करती है। बच्चे के पोषण के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वे सभी चीजें इस दूध ने होती हैं; और साथ ही यह उसकी पाचनशक्ति के भी बहुत ही अनुकूल होता है। इसलिए यदि माता का स्वास्थ्य ठीक हो तो उसे प्रायः एक बरस तक बच्चे को अपनी छातियों से ही दूध पिलाना चाहिए। कम से कम कुछ सप्ताहों तक तो उसे अवश्य ही अपनी छातियों से दूध पिलाने का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चा कदाचित् और किसी प्रकार का भोजन पका ही नहीं सकता। बहुत से बच्चे जन्म लेने के कुछ ही सप्ताहों के अन्दर केवल इसी लिए मर जाते हैं कि इसी बीच में उन्हें अस्वाभाविक भोजन देकर उनकी पाचनशक्ति ख़राब कर दी जाती है। यदि कम से कम आरम्भ के दो या तीन महीनों तक भी बच्चे को छातियों से दूध पिलाया जाय, तो वह जीवन के नार्ग पर बहुत अच्छी तरह से चल पड़ता है। जो लड़के बहुत ही दुखले पतके और नाज़क हो, या जो ऐसे माता-पिता से उत्पन्न हो जिन्हे गरमी हुई हो, छातियों से दूध पिलाने से उनके जीने की सम्भावना बहुत कुछ बढ़ जाती है। इन सब कारणों से बच्चे को छातियों से दूध पिलाने का जितना अधिक महसूव है, उसका पूरी तरह से वर्णन हो ही नहीं सकता। बच्चे के जन्म लेने के कुछ सप्ताहों के अन्दर ही उसे और किसी प्रकार का भोजन देना बिलकुल अस्वाभाविक और प्रहृति-विस्फ़ू है, और जब तक बीच में कोई बहुत बड़ा कारण या कठिनता न आ जाय, तब तक उसे कभी दूसरा भोजन नहीं देना चाहिए।

जिन बच्चों को बहुत ही छोटी अवस्था या आरम्भ में छातियों का दूध नहीं मिलता, वे प्रायः मर जाते हैं; और उनमें से जो बच्चे किसी प्रकार बच भी रहते हैं, उनकी पाचनशक्ति बिलकुल ख़राब हो जाती है। और इस प्रकार जब एक बार उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तब वे सहज में और बहुत सी वीमारियों के शिकार हो जाते हैं।

का रूप और गुण धारण कर लेता है। छातियों में दूध आने का ठीक और निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता। अलग अलग खियों में यह समय अलग अलग होता है; पर साधारणतः प्रसव के बाद दो से पाँच दिन से उनमें दूध आ जाता है।

जन्म होने के बाद बच्चे का शरीर अच्छी तरह साफ़ करके उसे नहलाकर और कपड़े से लपेटकर उसे मा के पास ही विस्तर पर लिटा देना चाहिए। जन्म होने के समय बच्चे के शरीर पर बहुत कुछ ज़ोर और दबाव पहुँचता है, इसलिए उस समय उसे और सब बातों से बढ़कर विश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए उस समय उसे दूध नहीं पिलाना चाहिए। वह जितना सो सके, उसे उतना सोने देना चाहिए। अधिकांश अवस्थाओं में बच्चे को छः से बारह घण्टे तक किसी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ अगर वह चिल्लाने लगे और बेचैन हो, तो इससे पहले ही उसे दूध पिलाना आरम्भ कर देना चाहिए।

जन्म के दिन से बच्चे का नियमित पालन—
माता को सबसे अधिक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूध पिलाने में बहुत बैर्ध की आवश्यकता होती है। कुछ खियों में दूध पिलाने की किया बहुत ही सहज और साधारण होती है। पर कुछ खियों में दूध का प्रवाह ठीक तरह से स्थापित होने या दूध उतरने में बहुत सी कठिनाइया होती हैं। पर यदि माता धीरज रखे तो उसे बहुत अच्छी तरह से सफलता हो सकती है।

जन्म के दिन दूध पिलाना—सबसे पहले छातियों को सूब अच्छी तरह धोकर और साफ़ करके सुखा लेना चाहिए। जब तक बच्चे को जन्म लिये छः से बारह घण्टे तक न बीत जायें, तब तक उसके मुँह में स्तन नहीं देना चाहिए। छातियों में से जो दूध सबसे पहले निकलता है, उसमें कुछ रेचक गुण होता है जिसके कारण बच्चे की आंतों

पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। यदि जन्म लेने के समय ये चौर्धीय छंटों के अन्दर बच्चे को पालना न हो तो वे प्रकृते उम्रके पर रेही का नेत्र, विकिंग दम्पत्ते सी अच्छा यह है कि प्रकृते उम्रके पर जैनून का नेत्र योंहे से गम पानी में मिलाकर दिया जाय। हमें बच्चे के पेट की बढ़ गान्धी बाहर लिकिन जाएगी तो गहरे रेही रुंगे रंग की होनी है और जो पठले वश छंटों के अन्दर लिलना चाही है। रेही के नेत्र में जैनून का नेत्र अच्छा होता है; क्योंकि रेही का नेत्र आंतों को बांध देना या अन्दर कर देना है; पर जैनून के नेत्र में यह बात नहीं होती।

इसके बाद बाहर छंटों में जो बान अवर्त छः छः छंटों पर बच्चे को दूब पिलाना चाहिए। पहले चौर्धीय छंटों में बच्चे का छानियों का चूमना या न चूमना दम्पत्ती दूब पानी की डूच्छा पर लिभर करना है। यदि छानियों में दूब होगा और बच्चे को आवश्यकता होगी, तो उह नी नेगा; नहीं तो छोड़ देगा। यह विषय है कि दम उम्रके पर बहुत ज़ोर में उम्रने पर भी बहुत ही थोड़ा दूब लिलना है। उम्र समय हृष्ट बाल का ज्ञान बढ़ना चाहिए कि यदि छानियों में दूब न हो और हृष्टलिपु उक्त कुछ भी न रो ज्के, तो भी हृष्टने बच्चे के बाहर नहीं पहुँचती; और बहुत ज़ोर लगाकर उम्रने पर भी पहले चौर्धीय छंटों में बच्चे को प्रायः कुछ भी दूब नहीं पिलता। बहुत मी छिर्ग इन आंतों के नहीं जाननी और पान-पड़ोय की छिर्गों द्वारा हृष्टों के क्षमने पर बच्चे को नहीं को गोड़ा दूब पिला देनी हैं। पर उम्रके में पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उम्र समय भी का दूब दिया जाना है, तो उम्रमें प्रायः बच्चे की पाचन-प्राक्ति विगड़ जानी है जिसे ठोक अन्ना आंतों की बहुत कठिन हो जाता है। बच्चे को उम्र लेने के समय में छः और बाहर छंटों के आंत में क्षमने प्रकृत बाहर दूब पिलाना चाहिए; और किर उम्रके बाहर बाहर छंटों के अन्दर कुछ छः छंटों पर उम्र दो बाहर दूब पिलाना चाहिए।

दूसरे और तीसरे दिन दूध पिलाना—दूसरे और तीसरे दिन बच्चे का दूध पीना उसकी हच्छा और प्रवृत्ति पर और साथ ही मां की छातियों में दूध होने और न होने पर निर्भर करता है। दूसरे दिन बराबर चार घंटों पर बच्चे के मुँह में छातीदेनी चाहिए और तीसरे दिन दो दो घंटों पर। पर वह उसी दशा में होना चाहिए जब छातियों से दूध का प्रवाह ठीक तरह से होने लग गया हो। पहले चौबीस घंटों में बच्चे को जो थोड़ा बहुत दूध मिल जाता है, उसी से वह बहुत सन्तुष्ट हो जाता है; इसलिए दूसरे और तीसरे दिन भी उसे चूसने से जो थोड़ा बहुत दूध मिल जाता है, उसी से वह पूरी तरह में सन्तुष्ट हो जाता है।

जो खियां पहले-पहल बच्चा जनती है, उनकी छातियों में प्रायः पहले दो तीन दिन तक कुछ भी दूध नहीं होता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कहीं पाचवे या छठे दिन जाकर दूध ठीक तरह से उतरने लगता है। इसके लिए कभी कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। चिन्ता करने से तो दूध का प्रवाह रुकेगा या उसने और भी देर होगी।

छातियों से दूध का ठीक ठीक उतारने के लिए माता को चाहिए कि वह दो दो घंटे के बाद बच्चे के मुँह में छाती दे। इस प्रकार से बच्चे के चूसने से ही दूध का ठीक ठीक प्रवाह आरम्भ हो जायगा। जिस समय बच्चा खुपचाप और शान्त रहता है, उस समय भी कुछ खियां बच्चे को भूखा समझ कर उसके मुँह में पानी मिला हुआ थोड़ा सा गौ का दूध डाल देती हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा दूध न पीना चाहता हो, उसे यदि जबरदस्ती कुछ दूध पिला दिया जायगा, तो फिर वह उस शौक से छातियों को न चूसेगा, जिस शौक से वह भूखा होने की दशा में चूसा करता है। इसके सिवा छातियों में से दूध उतारने के लिए उन पर जो ज़ोर पहुँचने की आवश्यकता होती है, वह ज़ोर भी न पहुँचेगा जिससे दूध उतरने में और भी देर होगी। कुछ अवस्थाओं में तो जेवल हसी कारण दूध उतरने में

इर होनी है। वच्चे को दूध न पिलाने का प्रयत्न करना या घोड़ा सा रिलाक्स जन्मदी घोड़ा देना उसे माता के उस दूध से बंचित करना है जिसका न्याय आर को हृदय ले ही नहीं सकता। माताओं को यह नी न्यरण रखना चाहिए कि यदि आरन्म में दो तीन दिन तक वच्चे को काफ़ी दूध न मिले, तो भी उसे कोई हानि नहीं पहुँचती। छानियों से दूध दिनान्मे के लिए लगातार कोशिश करने रखना चाहिए आर दो दो बटे पर उसके सुँह ने छाती देनी चाहिए। ठीक नगह से आर पूरा पूरा दूध उत्ताने के लिए बहुत कुछ बैर्य, अव्यवस्थाय आर नमकदारी की आवश्यकता होती है।

यदि हतना यव कुछ होने पर भी वच्चे का शरीर ठीक तरह से न चलना हो आर वह बैर्यने दिलाहे देता है, तो उसे घोड़ा या टवाला हुआ पानी डंडा करके देना चाहिए; आर उसमें घोड़ी सी चीनी भी मिला देनी चाहिए जिसमें वह उसे जल्दी से पी ले। यह पानी बैंद बैंद कंके नहीं देना चाहिए। चार चार बंदों पर चार से पांच छोटे चमच भर पेन्ना पानी बहुत काफ़ी होता। पानी से ही वच्चे का पेट पूर्ण तरह से नहीं भर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें फिर वच्चे को छानी चूसने की इच्छा न रह जायगी। इन बाँच में बगवर बैर्य आर अव्यवस्थाय पूर्वक वच्चे को दूध पिलाने रहना चाहिए या ठीक नमय पर उसके सुँह में छाती देने रहना चाहिए। इन प्रकार चिना किसी विशेष कठिनता के पांचवें या छठे दिन तक गां का दूध पिलाना ठाला जा सकता है। आर पांचवें या छठे दिन अविकांश क्लिंगों की छानियों में रहना दूध उत्तर लगता है जो छोटे वच्चे की आवश्यकता के लिए बहुत होता है।

यदि वच्चा बैर्यन हो आर नीडा पानी देने से भी चुप न होता है, तब गां के दूध में पानी मिलाकर दो चार छोटे चमच भर दे देना चाहिए। हृष्ट से अविक मात्रा ने कभी दूध आर पानी नहीं देना चाहिए ज्योंकि उस अवस्था में वच्चे की पावन-शक्ति के शक्ति विहङ्ग जाने का डर रहता है।

जो बच्चा स्वस्थ होगा, वह पेट भर जाने पर आप ही छाती छोड़ देगा। साधारणतः बच्चे को पांच से दस मिनट तक पूरी तरह से पेट भरने में लगता है; पर कुछ बच्चे पन्द्रह से बीस मिनट तक भी दूध पीते रहते हैं। इससे अधिक समय तक बच्चे के मुँह में छाती रहने देना ठीक नहीं है। यदि बच्चा आध घंटे तक दूध पीता रहे अथवा दूध पीता पीता छाती पर ही सो जाय तो समझ लेना चाहिए कि कोई ख़राबी ज़रूर है। या तो वह हुर्बल है और या छातियों से अधिक दूध ही नहीं है। केवल बहुत ही कमज़ोर बच्चे जो दूध चूसने में जल्दी थक जाते हैं, बीस मिनट से अधिक समय तक छाती पर रहने दिये जाते हैं। जो बच्चे दूध पीने में बहुत सुस्त हो, उन्हे इधर-उधर थोड़ा हिला हुलाकर और दूध पीने में ग्रवृत्त किया जा सकता है, और जो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी दूध पीते हों, उनकी मातापापों को चाहिए कि छाती की घुँड़ी की जड़ को झेंगुठे और तर्जनी रँगली से पकड़े रहे, जिसमें दूध आवश्यकता के अनुसार ठीक तरह से उतरे, आवश्यकता से अधिक न उतरे।

दूध पिलाने के बीच में अन्तर—सब बच्चे एक ही से नहीं होते, इसलिए इस बात का कोई ठीक और निश्चित नियम नहीं बतलाया जा सकता कि बच्चों को कितनी कितनी देर के बाद दूध पिलाना चाहिए। कुछ बच्चों को दो दो घंटों और कुछ को तीन या चार घंटों पर दूध पिलाने की आवश्यकता होती है। ग्रन्येक बच्चे को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार दूध पिलाना चाहिए। पर जहाँ तक हो सके, इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि चार चार घंटे के अन्तर पर बच्चे को दूध पिलाना पड़े; क्योंकि इससे बच्चे का भी स्वास्थ ठीक रहता है और उसकी माता का भी। इस बात की शिक्षा जितनी जल्दी हो सके, आरम्भ कर दी जानी चाहिए।

अधिकांश बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले दिन से लेकर पहले वर्ष के अन्त तक चार चार घंटे पर दूध पिलाने से ही अच्छी तरह बढ़

सकेगे। जब दूध पिजाने का समय आवे, तब बच्चे को सदा जगा देना चाहिए और उसे दूध पिजाना चाहिए।

अधिक अन्तरों से लाभ—यदि बच्चे को समय के अधिक या बड़े अन्तर पर अर्थात् अधिक देर करके दूध पिजाया जायगा, तो उसे न तो पेट में ढर्ड होगा और न बेचैनी होगी। इससे माँ और बच्चे दोनों को आराम मिलेगा।

छोटे अन्तर—जब चार चार घंटे के अन्तर पर दूध पिजाने का फल यह देखने में आवे कि बच्चा ठीक तरह से नहीं रहता और नहीं बढ़ता, तब यह चार घंटे का अन्तर घटाकर कम कर देना चाहिए। यदि कभी बीच में इस प्रकार अन्तर घटाने की आवश्यकता आ पड़े तो भी उसके बाद ज्यो ही वह अनावश्यक ज्ञान पड़े, तो ही फिर वही चार चार घंटे पर दूध पिजाना आरम्भ कर देना चाहिए।

एक या दोनों छातियों से दूध पिलाना—पहले सप्ताह में जब छातियों में दूध पूरी तरह से न उत्तरता हो, माता के उचित है कि वह बच्चे को दोनों छातियों से दूध पिलावे। पर जब अच्छी तरह से दूध उत्तरने लगे, तब यही उचित है कि एक बार एक छाती से दूध पिजाया जाय और दूसरी बार दूसरी छाती से। अर्थात् बारी बारी से हर एक छाती से दूध पिजाया जाय। कुछ स्थिर बच्चे को जब जिस छाती से भी चाहता है, दूध पिला देती है। इससे दोनों छातियों थोड़ी थोड़ी ख़ाली हो जाती है, पर पूरी तरह से एक भी छाती ख़ाली नहीं होने पाती; और दोनों छातियों यदि ख़ाली होती हैं तो केवल उसी दशा में जब कि दूध कम उत्तरता है। पर ऐसा करना बड़ी भारी भूल है। जिस समय दूध जितना चाहिए, उतना उत्तरता हो, उस समय ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले सप्ताह के अन्त में बलबान् बच्चों के मुँह में एक बार केवल एक ही छाती देनी चाहिए और दूसरी बार दूसरी छाती। पर यदि दूध

यथेष्ट मात्रा मे न उतरता हो, तो दुर्बल, जलदी थक जानेवालो और ठीक समय से पहले जन्म लेनेवाले बच्चों को एक ही समय मे दोनों छातियो से दूध पिलाना चाहिए।

यदि छातिया दूध से भरी हों और पाचनशक्ति की किसी ख़ुराकी के कारण बच्चा छाती मे का सारा दूध पीने से असमर्थ हो तो माता को अपनी छाती या तो पम्प की सहायता से और या हाथ से दबाकर ख़ाली कर देनी चाहिए और उससे का दूध बाहर निकाल देना चाहिए। पम्प से दूध बाहर निकालने की अपेक्षा हाथ से निकालना अधिक उत्तम है। इसके सिवा छातियो के दूध से भर जाने के कारण जो कष्ट होता है, वह छाती पर पही बांध लेने से या खूब कसी हुई शॉरिया या कुरता पहन लेने से भी दूर हो जाता है। इस उपाय से असमय में ही दूध बन्द हो जाने का भी भय नहो रह जाता; और छातियो के दूध से भर जाने के कारण जो कष्ट होता है, उससे भी रक्खा हो जाती है।

जब छातियो मे दूध उतरने लगता है, तब वे कढ़ी हो जाती हैं और उनमें कुछ तनाव होता है, जिससे कुछ कष्ट जान पड़ता है। साधारणतः कुछ हल्की सी हरारत भी हो जाती है जिसे “दूध का बुखार” कहते हैं। दूध पिलानेवाली माता के इसकी कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए; क्योंकि ज्यो ज्यो दूध अधिक उत्तरता है, त्यो त्यो वह कष्ट और बुखार आपसे आप दूर होता जाता है। और दूध अधिक उतारने का उपाय यही है कि बच्चे को बराबर छातियो से दूध पिलाया जाय।

छातियों से दूध पिलाने की भूलें

(१) बच्चे को दूध पिलाने का ठीक ढंग — यह भी एक कला है और बहुत ही कम ज्ञियां यह कला जानती हैं। बच्चे को दूध पिलाते समय माता को सदा इस बात का ज्ञान रखना चाहिए कि

उसके दूध पीने में किसी प्रकार की वाधा न पड़े और यह बात तभी हो सकती है जब बच्चे की नाक इस प्रकार खुली रहे जिसमें उसे सास लेने में कोई कठिनता न हो। बच्चे को दूध पिलाने के समय ग्राम्य होता यह है कि उसकी नाक छाती में लगफर इस प्रकार दब जाती है कि वह अपने नथनों से ठीक तरह से सास नहीं ले सकता। उसके मुँह में छाती की धुंडी रहती है; इसलिए वह मुँह के रास्ते भी सास नहीं ले सकता। बच्चा योद्धी देर तक दूध पीता है और तब सास लेने के लिए रुक जाता है। इस प्रकार वह बिना पूरी तरह से पेट भरे या छातियों को दूध से खाली किये ही थोड़ी देर में थक जाता है। यह ढंग बहुत ही दोपूर्ण है; क्योंकि इससे बच्चा या तो थोड़ी ही देर में बहुत सा दूध पी लेता है जिससे बाद में अवश्य ही कैंकरने लगता है; और या वह इतना कम दूध पीता है कि वह उसके पोषण के लिए पूरा नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन के आरम्भ से ही उसका विकास अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है और वह दुर्बल होने लगता है। इसलिए माताश्रों को उचित है कि वे बच्चे को ठीक तरह से दूध पिलाने की कला बहुत ही ध्यानपूर्वक सीखें। माता को सदा बैठकर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। शुटना कुछ ऊपर उठाकर उस पर वार्या हाथ टेक देना चाहिए और उसी वार्ये हाथ से बच्चे का सिर पकड़ रखना चाहिए। डाहिने हाथ से छाती पकड़ रखनी चाहिए और इस प्रकार पकड़नी चाहिए कि जिसमें अँगूठा उसके ऊपरी तल पर रहे। इस प्रकार अँगूठा रखने से छाती बच्चे के मुँह से कुछ दूर रहती है जिसमें बच्चे की नाक सास लेने के लिए खुली रहती है। इस प्रकार माता अपने बच्चे को बिना रोक-नोक दूध पिला सकती है और बच्चा भी बहुत आराम से छाती को दूध से खाली कर देगा।

(२) चिन्ता—कुछ खिया छाती से दूध पिलाने से सफलता ग्रास करने के लिए बहुत चिन्तित रहती है। पर यह चिन्ता ही उनकी छातियों से दूध ठीक तरह से उतरने नहीं देती; वहिक चिन्ता

के कारण तो प्रायः दूध का उतरना बिलकुल बन्द ही हो जाता है। चिन्ता करने के कारण ही माता की छाती का दूध कम होता है; और माता उसका कारण तो जानती ही नहीं। वह समझती है कि मेरी छातियों में दूध ही नहीं होता या इतना कम होता है कि उससे बच्चे का सन्तोष ही नहीं होता; इसलिए वह बच्चे को ऊपरी दूध पिलाने लगती है। दूध पिलाने से छातियों को जो स्वाभाविक ज़ोर पहुँचता है, अब वह ज़ोर पहुँचना बन्द हो जाता है। ठीक तरह से छातियों में दूध आने और उतरने के लिए बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। यदि आरम्भ के कुछ दिनों में दूध बिलकुल ही न पिलाया जाय या दूध पिलाने का बहुत ही थेहड़ा प्रयत्न किया जाय, तो उससे केवल बच्चे के लिए ही जोखिम नहीं होती, बल्कि दूध के ठीक तरह से उतरने में भी बाधा पहुँचती है। यदि किसी कारण से दूध पीने या पिलाने में कोई त्रुटि हो, जैसे बच्चा ही कमज़ोर हो या माता का स्वास्थ ही ख़राब हो, तो दूध के बे-वफ़़ ही रुक जाने का डर रहता है। चाहे दूध पिलाना कम होने के कारण हो और चाहे और किसी कारण से हो, जब एक बार दूध बन्द हो जाता है, तब वह फिर किसी प्रकार जारी नहीं होता। दूध पिलानेवाली माता को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

(३) छातियों का पूरी तरह से खाली न होना—
छातियों में दूध ठीक तरह से बनता और उतरता रहे, इसके लिए यह बात बहुत ही आवश्यक है कि छातियां सदा नियमित रूप से दूध से खाली होती रहा करें और पूरी तरह से खाली होती रहा करें; क्योंकि छाती का काम ठीक तरह से होने के लिए यह बात बहुत ही आवश्यक है। साधारणतः खियां यह भारी भूल करती हैं कि जब बच्चा रोने-चिल्लाने लगता है, तब वे तुरन्त उसके मुँह में छाती दे देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे को थोड़े थोड़े समय पर दूध पिलाया जायगा, तो उतनी देर में उसे इतनी भूल ही नहीं लगेगी कि

वह पूरी तरह से छाती को दूध से खाली कर सके। इसका फल यह होता है कि थोड़े ही समय में कुछ स्नियों की छातियों में से दूध उतरना विलक्ष्ण बन्द हो जाता है। यदि दूध पिलाने में कसर की जायगी तो छातियों को इतना काफ़ी ज़ोर ही न पहुँचेगा कि वे ठीक तरह से अपना काम कर सकें। यदि बच्चे के बीमार होने के कारण माता दूध पिलाकर अपनी छातियों को खाली न कर सकती हो, तो उसे उचित है कि वह अपने हाथों से ही दबाकर उसमें का दूध निचोड़-कर बाहर निकाल दे। यदि इसमें उसे कुछ कट होता हो तो वह पम्प की सहायता से छातियों का दूध बाहर निकाल सकती है।

(४) **आवश्यकता से अधिक दूध पिलाना**—जब बच्चे के हर बार रोने-चिल्साने पर उसके मुँह में छाती लगाई जाती है, तब उसका फल यह होता है कि बच्चे का पेट बहुत भर जाता है। जब बच्चे को जल्दी जल्दी दूध पिलाया जाता है, तब उसके पेट में पचा हुआ और बिना पचा हुआ दोनों दूध एक में मिल जाते हैं और दूध अधिक भी हो जाता है। इसलिए बच्चा फालतू दूध को कैं करके बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार कैं करके वह मानों अपनी रक्ता करता है। आरम्भ के महीनों में तो श्रायः यह बात नहीं देखने में आती, पर बाद के महीनों में अर्थात् जब वह पाच महीने का हो जाता है, उसके बाद यह बात अक्सर देखने में आती है। माता इस लक्षण पर तो ध्यान देती ही नहीं और उसे बराबर दूध पिलाती चलती है, जिससे उसे दस्त आने लगते हैं। जहां पहले बच्चा दिन-नात में दो या तीन बार पाखाना फिरता था, वहाँ अब वह चार पाच या इससे भी अधिक बार पाखाना फिरने लगता है।

यदि इतने पर भी माता बच्चे को बराबर पहले की ही तरह दूध पिलाये चलती है, तब वह तीसरे प्राकृतिक रूप से अपना बचाव करने लगता है; और वह रूप उसकी भूक का कम हो जाना है। अब यह होता है कि जब माता बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, तब वह नहीं

पीता। फल यह होता है कि कृ और दस्त होने तथा भूख कम लगने के कारण वह दिन पर दिन कमज़ोर और हुबला पतला होता जाता है।

उन बच्चों में यह अवस्था और भी अधिक देखने में आती है जिन्हे अपनी माता का दूध नहीं मिलता, बल्कि दूध पिलानेवाली दाहयों का दूध मिलता है; क्योंकि दूध पिलानेवाली दाहयों की छातियां ग्रायः बढ़ी और दूध से भरी हुई होती हैं। दूध पिलानेवाली दाईं की छाती से बच्चा बहुत जलदी जलदी दूध पीता है और वह अपने अंगूठे और तर्जनी से छाती को पकड़कर दूध ठीक तरह से नहीं उतारती, बल्कि आपसे आप जितना अधिक उतरता है, उतना उतरने देती है; और बच्चा जितनी जलदी जलदी दूध पी सकता है, उतनी जलदी जलदी उसे पीने देती है।

(५) जो बच्चे अपनी माता के साथ उसी के बिस्तर पर सोते हैं, उन्हे ग्रायः रात के समय भी बीच बीच से दूध पीने को मिल जाता है और इससे भी उनका पेट आवश्यकता से अधिक भर जाता है। पेसे बच्चों को अलग पलंगड़ी पर लेटाना ही ठीक है और उन्हें केवल निश्चित समय पर ही दूध पिलाना चाहिए। इसमें माता को एक दो दिन कुछ कठिनता हो सकती है; पर उसके बाद बच्चे को आराम से सोने की आदत पढ़ जायगी और फिर वह रात को सोने के समय अन्तिम बार दूध पी लेने पर रात को माता को तंग न करेगा।

पेट अधिक भर जाने का इलाज— कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक पेट भरने के लक्षण आपसे आप दब जाते हैं; पर केवल इस बात के आसरे कभी न रहना चाहिए कि ये लक्षण आपसे आप दब ही जायेंगे। ज्यो ही यह देखने में आवे कि दूध पिलाने के थोड़ी ही देर बाद बच्चा दूध फेक देता या कैर देता है, अथवा उसे बार बार दस्त आते हैं, तो ही माता या दूध पिलानेवाली दाईं को यह समझ लेना चाहिए कि बच्चे के लिए दूध बहुत अधिक हो गया है

और बच्चे को नियमित रूप से दूध पिलाना चाहिए। ऐसी अवस्था में बच्चे को दिन में चार बार धंटे बाढ़ और रात को पांच पाच या छः छः धंटे बाढ़ दूध पिलाना चाहिए। अगर इस वीच में बच्चे को कोई वेचैनी हैती दिखाई दे तो उसे दो चार छोटे चमच भर उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी देना चाहिए। अनजान में अधिक दूध पिलाने के कारण जो ख़राबी होती है, वहुत अवस्थाओं में वह इतने से ही टीक हो जाती है। यदि इस और टीक ध्यान न दिया जायगा तो बच्चे की शक्ति वहुत कम हो जायगी और उसे दूसरे अनेक प्रकार के रोग होने का भय रहेगा।

मतलब यह कि बच्चे को सदा नियमित समय पर दूध पिलाना चाहिए। यदि छातियों में से दूध वहुत अधिक उत्तरता हो तो बच्चे को जल्दी जल्दी और वहुत सा दूध नहीं पीने देना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी और बड़े बड़े घूँट पीने के कारण बच्चे के पेट में बालू भर जाती है और दर्द होने लगता है जिससे वह चीखने चिल्लाने लगता है। ऐसी अवस्था में डॉगलियों से दबाकर दूध का ग्राहण कर कर देना चाहिए जिसमें बच्चा जल्दी जल्दी दूध पीकर अपना पेट आवश्यकता से अधिक न भर ले। जब ऊपर कहे हुए लच्छण दब जायें, तब फिर उसे छाती से टीक तरह से दूध पिलाना आरम्भ कर देना चाहिए; पर साथ ही माता को ध्यान से यह भी देखते रहना चाहिए कि कहाँ वे लच्छण फिर तो नहीं उभड़ आते हैं।

छाती के दूध का कम होना—प्रायः ऐसी अवस्था वहुत ही कम होती है। निरी अज्ञानता के कारण ही माताये प्रायः यह समझ दैठती है कि मेरी छातियों में बच्चे की आवश्यकता भर के लिए दूध नहीं है। इसलिए वे या तो अपने दूध के साथ साथ उसे ऊपरी दूध देने लगती हैं और या छातियों से दूध पिलाना विलक्षण बन्द ही कर देती हैं। बच्चे के लिए यह बात वहुत ही हाविकारक होती है।

(१) यह पता लगाना कि बच्चे को कम दूध मिलता है—जिस बच्चे को छाती से पूरा दूध नहीं मिलता, वह तौल में नहीं बढ़ता; और यदि बढ़ता भी है तो अपेक्षाकृत बहुत कम बढ़ता है।

(२) उसकी तवचा के नीचे चरबी काफ़ी नहीं होती जिससे वह दुखला पतला दिखलाई पड़ता है। वह स्वस्थ बच्चों की तरह मोटा ताजा नहीं होता।

(३) उसे दिन भर में अधिक से अधिक दो बार पाख़ाना होता है और पाख़ाने का रंग भी जैसा होना चाहिए (सुनहरा पीला) वैसा नहीं होता।

(४) उसे पेशाब अपेक्षाकृत कम उत्तरता है और रूमाल या चिथड़े पर उसका धब्बा पड़ता है।

(५) उसे छाती से दूध पिलाने का समय आवश्यकता से बहुत बढ़ जाता है। ऐसे बच्चे प्रायः अधिक समय तक छातियों से लगे रहते हैं और बराबर बीच बीच में दूध पीते रहते हैं। वे बहुत बेचैन भी नहीं होते और दूध पीने के बाद बीच के समय में रोते चिल्लाते भी नहीं। वे शारीरिक शक्ति कम होने के कारण बहुत अधिक सोते हैं और प्रायः दूध पिलाने के लिए उन्हें जगाना पड़ता है।

(६) वे इतने बेदम होते हैं कि जान पड़ता है कि ठीक समय से पहले ही पैदा हुए हैं। ये सब बातें बच्चे को अधिक भूख लगाने के कारण ही होती हैं। उसका कभी पेट नहीं भरता और वह बराबर थोड़ी थोड़ी देर में दूध पीना चाहता है। वह बहुत ही थोड़ी देर तक दूध पीता है और तब उसे छोड़कर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। यदि ऊपर से देखने में छातिर्या बढ़ी और भारी जान पड़ें, तो इतने से ही यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उनसे दूध काफ़ी है। कभी कभी

यह भी देखने मे आता है कि छोटी छातियों मे तो बच्चे की आवश्यकता के लिए काफ़ी दूध होता है और बड़ी या भारी छातियों में बहुत ही कम दूध होता है। आवश्यकता इस बात का पता लगाने की होती है कि उतना दूध पीने से बच्चे का शरीर ठीक तरह से बढ़ता है या नहीं। यदि दूध पीते रहने से बच्चा तौल मे बराबर बढ़ता हो तो कभी यह नहीं कहा जा सकता कि छातियों मे दूध कम है। पर यदि बच्चा दूध पीने का प्रयत्न करने पर भी तौल मे न बढ़ता हो तो समझ लेना चाहिए कि माता के दूध मे बच्चे का पूरा पूरा पोषण करने की शक्ति नहीं है।

(१) दूध क्यों काफ़ी नहीं रहता—कुछ शियों की छातियाँ पहले तो ठीक तरह से काम करती रहती हैं, पर किसी कारण से आगे चल कर उनमे पूरा दूध बल्पन्न करने की शक्ति नहीं रह जाती। पर यह बात प्रायः बहुत ही कम देखने मे आती है और इसके एक नहीं विक्षिक अंक कारण होते हैं। तौल में बच्चा ज्यों का त्यों बना रहता है, बढ़ता नहीं है; और उसमे ऐसे क्षम्भण दिखाईं पड़ते हैं जिनसे सूचित होता है कि उसका पूरा पूरा पोषण नहीं हो रहा है।

(२) बच्चों के दूध पिलाने के लिए जो दाहर्याँ रखी जाती है, वे प्रायः बहुत दूर के स्थानों से चलकर आती है और जीवन की परिस्थितियों के बदलने और नये स्थान मे आ पड़ने के कारण कुछ समय के लिए उनका दूध कम हो जाता है, पर यह कभी थोड़े ही समय तक रहती है और उसके बाद फिर दूध ठिकाने आ जाता है।

(३) अच्छे घरों की जो शियाँ अपने बच्चों को आप ही दूध पिलाती हैं, वे प्रायः नाजुक और कमज़ोर होती हैं। पहले तो उनकी छातियों मे बहुत दूध रहता है, पर थोड़े दिनों बाद अचानक और ठीक-समय से पहले ही उनका दूध बिलकुल बन्द हो जाता है।

इत्ताज—बच्चे और उसकी माँ दोनों की डाकटरी परीक्षा करानी चाहिए; और जब यह पता चल जाय कि माता की छाती में बच्चे के पोषण के लिए काफ़ी दूध नहीं होता, तब उसके दूध की मात्रा बढ़ाने का उपाय करना चाहिए। और इस बीच में या तो दूध पिलानेवाली दाढ़ी रख लेनी चाहिए और या माँ के दूध के साथ ही साथ उसे ऊपरी दूध देना भी आरम्भ कर देना चाहिए।

कभी कभी ऐसा होता है कि छाती में औसत दूध रहने पर भी बच्चे का शरीर ठीक तरह से नहीं बढ़ता। इसमें माँ के दूध का कोई दोष नहीं होता, बल्कि इसका कारण यह होता है कि या तो बच्चा पूरी तरह से सो नहीं सकता या उसे काफ़ी गरमाहट या पूरी ताज़ा हवा नहीं मिलती या इसी प्रकार का और कोई कारण होता है।

छाती से दूध पिलाने में कठिनाइयाँ—अधिकांश खियों को छाती से दूध पिलाने में सफलता हो ही जाती है; पर फिर भी बीच में कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे छातियों से दूध पिलाना कष्टदायक और चिन्ताजनक हो जाता है। दूध पिलाने के काम में सफलता प्राप्त करने में माताओं के सामने जो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, वे साधारणतः इस प्रकार हैं—

(१) स्वयं माता के सम्बन्ध की कठिनाइयाँ—
हो सकता है कि उसकी छातियाँ छोटी हैं और पूरी तरह से उभरी न हो। ऐसा होता तो बहुत कम है, पर फिर भी कुछ खियों में होता अवश्य है। छातियों का पूरी तरह से विकास नहीं होने पाता और वे छोटी ही रह जाती हैं। उनमें से दूध बिलकुल ही नहीं उत्तरता। ऐसी अवस्था में बच्चे को दूध पिलाने के लिए दाढ़ी रखना आवश्यक हो जाता है।

(२) जिन खियों को कोई भारी रोग रहता है और खूब ज़ोर से झुक्खार आता है, उनकी छातियों के दूध की मात्रा भी बहुत घट जाती है। ऐसी अवस्था में यहीं अच्छा होता कि कुछ समय के लिए बच्चे को

माता का दूध न पिलाया जाय । जिस स्थी को बहुत तेज़ झुकार आता हो, फिर चाहे वह किसी कारण से क्यों न हो, उसका दूध बच्चे को पिलाना ठीक नहीं है । ऐसी बीमारियों की अवस्थाओं में दूध की मात्रा और गुण दोनों में बहुत अन्तर पड़ जाता है; इसलिए माताओं को बचित है कि ऐसी अवस्था में वे अपने बच्चे को गौ का दूध पिलाया करें ।

(३) प्रसूता की छातियों में ठीक तरह से दूध बच्चा पैदा होने के पांचवें या छठे दिन उत्तरने लगता है; इसलिए जो स्थी पहले पहल प्रसव करे, उसकी छातियों में दूध की कमी का ठीक ठीक निश्चय प्रसव के दूसरे सप्ताह ही हो सकता है । इससे पहले ही बच्चे का दूध पिलाना छोड़ देना ठीक नहीं है । प्रसव के कम से कम आठवें दिन तक बच्चे को दूध पिलाने का बराबर और बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए । यदि ठीक तरह से इस बात का प्रयत्न किया जायगा तो अधिकांश अवस्थाओं में छातियों में दूध उत्तरने लगेगा ।

(४) कुछ स्थियों की छातियों की बुँदी की बनावट ही ठीक नहीं होती । मजबूत पर्य की सहायता से उन्हें बाहर निकालना या आगे बढ़ाना चाहिए । यदि उनमें दरारे या घाव हो गये हो तो उनका हलाज करना चाहिए । इस प्रकार की दरारें या घाव साधारणतः आखो से नहीं दिखाई देते; पर जब स्थी बच्चे को दूध पिलाने लगती है, तब उनके कारण उसे दर्द होता है ।

(५) जब छातियों में सूजन हो जाती है, तब भी वे छातियां इस योग्य नहीं रह जातीं कि बच्चा उनसे दूध पी सके । बच्चे को ठीक तरह से दूध पिलाने में सफलता होने से पहले उस सूजन का हलाज होना चाहिए । जब सूजन दूर हो जाय, तब दूध पिलाना आरम्भ करना चाहिए ।

(६) यदि स्थी को स्नायु-सम्बन्धी दुर्बलता हो, तब भी बच्चे को पूरा पूरा दूध नहीं मिलता । बच्चे को जितनी बार दूध पिलाना चाहिए,

वह उतनी बार नहीं पिला सकती। ऐसी दशा में बच्चे को बार बार दूध पिलाना चाहिए और छातियों को पम्प भी करना चाहिए।

(७) कुछ खियों को केवल स्नायु-सम्बन्धी दुर्बलता ही नहीं होती, बल्कि उनका स्वभाव भी खराब होता है। जब ऐसी खियों बच्चे को दूध पिलाती हैं, तब छातियों में दर्द होने की शिकायत करती हैं। ऐसी खियों की छातियों पर दिन में तीन चार बार रुद्द के फाहे से मेथिलेटेड स्पिरिट या फिटकिरी मिला हुआ पानी लगाना चाहिए। इससे छातियाँ कड़ी हो जायेंगी और बच्चे के दूध पीने के समय ज्ञी को दर्द न होगा। पर दूध पिलाने से पहले छातियों को साबुन और पानी से खूब अच्छी तरह धो लेना चाहिए और सुखा लेना चाहिए; और दूध पिलाने के बाद भी यही क्रिया करनी चाहिए।

(८) मानसिक दुःख और चिन्ता से भी छातियों में दूध कम होता है। पर यह अवस्था स्थायी नहीं होती; और ज्यों ही चिन्ता या दुःख कम होता है, त्यों ही फिर काफ़ी दूध उत्तरने लगता है। ऐसी दशा में ज्ञी की चिन्ता दूर करनी चाहिए और उसे प्रसन्न रखना चाहिए।

(९) बच्चे के सम्बन्ध की कठिनाइयाँ—यदि बच्चे की शारीरिक रचना में किसी प्रकार का दोष होता है, जैसे बच्चे के होठों या तालू की बनावट में किसी प्रकार का दोष होना, तो उससे भी छातियों में कम दूध उत्तरता है। ऐसी दशा में बच्चे के उस अंग का आपरेशन करना चाहिए।

(१०) यदि बच्चे के जुकाम हो गया हो तो उसे दूध पिलाने में बहुत कष्ट होता है। ऐसे बच्चे को दूध पिलाने से पहले उसकी नाक में से कफ़ आदि बहुत अच्छी तरह निकालकर साफ़ कर देना चाहिए। यदि इस कठिनता के कारण बच्चा पूरी तरह से दूध न पी सके, तो माता को उचित है कि वह पम्प की सहायता से अपनी छातियों का दूध निकाल ले और तब चमच की सहायता से बच्चे को वह दूध पिलाकर उसकी कमी पूरी करे।

(३) जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, वे पहले तो सूख अच्छी तरह दूध पीते हैं, पर जलदी ही थक जाने के कारण छाती छोड़ देते हैं। ऐसी दशा में बच्चे को कई बार करके दूध पिलाना चाहिए।

(४) जो बच्चे अच्छे खासे मज़बूत और तन्दुरुस्त होते हैं, उनके मुँह में जब छाती दो जाती है, तब आरम्भ में ही वे कुछ खादा शौक से दूध नहीं पीते। ऐसे बच्चों को कुछ अधिक अन्तर पर दूध पिलाना चाहिए।

(५) दूध पीने में भद्रापन—कभी कभी यह तो जान पड़ता है कि बच्चा भूखा है, पर फिर भी वह भद्रापन से बार बार धुंडी मुँह में लेता है और हर बार धुंडी उसके मुँह से निकल जाती है। इस पर वह कुँभलाता है और बराबर रोता रहता है जिससे उसका भूखा होना सिद्ध होता है। ऐसे बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर पर दूध पिलाना चाहिए; और साथ ही पम्प से दूध निकालकर चमच से भी पिलाना चाहिए, नहीं तो वह भूखा रहने के कारण जलदी ही दुर्बल हो जायगा।

(६) दूध पीने के लिए तैयार न होना—कुछ बच्चे आरम्भ से ही दूध नहीं पीता चाहते। वे ग्रायः छाती को पीछे हटा देते हैं। ऐसे बच्चों को अधिक अन्तर पर दूध पिलाना चाहिए और इस बीच में पम्प की सहायता से छातियों से दूध निकालते रहना चाहिए।

छातियों में दूध कम होने पर क्या करना चाहिए—ऐसी कोई दवा नहीं है जो छातियों का दूध बड़ा सके। ऐसी बहुत सी दवाओं के विज्ञापन देखने में आते हैं, जिनके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इनसे छातियों में दूध आने लगता या बढ़ जाता है। पर यह सब धोखेबाज़ी है। दूध कम होने की दशा में नीचे लिखे कार्य करने चाहिए। इनका आश्चर्यजनक फल दिसाई पड़ेगा।

(७) यदि दो एक दिन तक जुपचाप बिस्तर पर पड़े पड़े आराम किया जाय तो ग्रायः बहुत अच्छी तरह दूध उत्तरने लगेगा। ग्रायः पूरी

तरह से विश्राम न करने के कारण ही दूध उतरने में रुकावट होती है। माता को बिना ज़रूरत शरीर से इयादा मेहनत नहीं करनी चाहिए और बच्चे को छातियों से दूध पिलाने के सिवा दिन में दो तीन बार चम्मच से ऊपरी दूध भी पिलाना चाहिए।

(२) नित्य के भोजन में दूध की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। दिन में तीन बार माल्ट एक्सट्रैक्ट (Malt Extract) पीना चाहिए और रात को सोते समय कैस्करा पिल (Cascara Pill) खा लेनी चाहिए। इससे भी छातियों से बहुत जल्दी दूध उतर आता है और उसकी मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है।

(३) हर बार दूध पिलाने के समय छातियों को दूध से अच्छी तरह खाली कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी अधिक दूध उतरने लगेगा। यदि छातियों का सारा दूध बाहर न निकलेगा और उसका कुछ अंश उनते बचा रह जायगा, तो भी दूध कम पैदा होगा। छातियों में दूध बढ़ाने का यह बहुत ही प्राकृतिक उपाय है। दिनमें सात आठ बार दूध पिलाने से छातियां दूध से बिलकुल खाली हो जाती हैं। इसके सिवा यदि दिन में चार छः बार पन्थ की सहायता से छातियों का सारा दूध निकाल दिया जाय तो भी बहुत अच्छा फल हो सकता है।

(४) यदि माता बहुत अधिक मात्रा में या अधिक भारी भोजन करती हो तो उसे काफ़ी कसरत भी करनी चाहिए; नहीं सो दूध की मात्रा घट जायगी।

(५) खूब पानी पीने और फल खाने से भी दूध बढ़ता है।

(६) दूध को कम होने से रोकने के लिए जर्हा तक हो सके, माता को सब प्रकार की चिन्तायें आदि छोड़ देनी चाहिए।

मासिक धर्म और दूध पिलाना—प्राणः प्रश्न होता है कि यदि माता को मासिक साव होने लगे, वह रजस्वला होने लगे, तो उस दशा में उसे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं ?

पहली बात तो यह है कि जब तक माता बच्चे को दूध पिलाती रहती है, तब तक प्रायः वह मासिक धर्म से होती ही नहीं। पर फिर भी कुछ स्थिर्यां अवश्य ऐसी होती है जो प्रसव के एक महीने बाद से ही और बच्चे को दूध पिलाने की दशा में ही रजस्वला हो जाती है और उसके बाद बराबर होती रहती है। कुछ स्थिर्यां ऐसी होती हैं जिन्हे प्रसव के तीन, चार या पाँच महीने बाद भी खून जाने लगता है, पर अधिकांश स्थिर्यां ऐसी ही होती है जो बच्चे को दूध पिलाने के दिनों में कभी रजस्वला नहीं होतीं। प्रायः मासिक स्राव का बच्चे पर कोई लुरा प्रभाव नहीं पड़ता; और हस्तिए कोई कारण नहीं है कि रजःस्राव के दिनों में उसका दूध लुड़ा दिया जाय। पर यदि उन दिनों दूध पिलाने के कारण बच्चा थेचैन या कष्ट में दिसाई पढ़े, उसके पेट में दर्द हो या उसे दस्त आने लगे और आगे भी जब जब माता रजस्वला हो और बच्चे को दूध पिलाने पर उसमें उक्त स्राव दिसाई पढ़े, तब यह समझ लेना चाहिए कि हस समय का दूध बच्चे के लिए अनुकूल और ठीक नहीं होता। ऐसी दशा में सबसे अच्छी बात यह है कि रजःस्राव के दिनों में बच्चे को माता का दूध न देकर गो आदि का ऊपरी दूध दिया जाय और हाथ से दबाकर या पम्प की सहायता से छातियों में का दूध बाहर निकाल दिया जाय।

गर्भवस्था और बच्चे को दूध पिलाना—यदि बच्चे को दूध पिलाने के दिनों में माता फिर से गर्भवती हो जाय तो यह बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे को दूध पिलाना बिलकुल बन्द कर दिया जाय। जो बच्चे गर्भवती माता का दूध पीते हैं, उनके शरीर का पोषण प्रायः ठीक तरह से नहीं होता और उन्हें पाखाने के सम्बन्ध की बीमारियां होने का डर रहता है। इसके सिवा गर्भवती स्त्री को इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि वह अपना सारा बल अपने गर्भ के पालन में लगावे। ऐसी दशा में यदि वह अपने बच्चे

को दूध भी पिलाती रहेगी, तो उसके शरीर पर बहुत ज़ेर पड़ेगा और वह दुर्बल हो जायगी ।

(१) दूध पिलाने में असमर्थता—कुछ खियां ऐसी भी होती हैं जो आपने किसी बच्चे को दूध पिला ही नहीं सकतीं । यदि कोई खी पुक बच्चे को दूध न पिला सके, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि बाद में होनेवाले और बच्चों को भी वह दूध न पिला सकेगी । जो खी आरम्भ में होनेवाले बच्चों को सफलतापूर्वक दूध न पिला सकी हो, वह भी बाद में होनेवाले किसी बच्चे को महीनों सफलतापूर्वक दूध पिला सकती है ।

(२) कुछ धनवान् खियां केवल इसी लिए आपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती कि वे दूध पिलानेवाली दाई नियुक्त कर सकती हैं और वे दूध पिलाने का कष्ट नहीं उठाना चाहतीं । जब खी बच्चे को दूध पिलाना ही न चाहती हो और इस कष्टदायक काम से बचना चाहती हो, तो इससे भी दूध पिलाने की शक्ति जाती रहती है—दूध बन्द हो जाता है । वे केवल स्वार्थ के कारण आपना कर्तव्य क्षेत्र देती हैं । यह मानों प्रश्नाति के विरुद्ध पाप था अपराध करना है ।

(३) बच्चे को दूध पिलाना खी-जाति का सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसी में उनकी सबसे बड़ी महत्ता है । कोई भी समझदार खी ऐसे कर्तव्य से कभी सुँह न करेगी । कुछ खियां आपने आपको बहुत दुर्बल समझती हैं और सोचती हैं कि यदि हम आपने बच्चे को दूध पिलाएँगी तो और भी अधिक दुर्बल हो जायेंगी । पर इस भय का कोई आधार नहीं है । यह भय व्यर्थ है । ऐसी खियों के यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि वे आपने बच्चे को दूध पिलावेंगी तो उनका शरीर और भी अच्छा रहेगा । यदि अच्छी तरह से भूख लगती हो और यथेष्ट पोषक भोजन मिलता हो तो दूध पिलाने से शरीर में होनेवाली कभी आपसे आप पूरी हो जाती है और स्वास्थ्य पर कोई दुरा प्रभाव नहीं पड़ता । बल्कि इससे स्वास्थ्य और भी अच्छा हो जाता है और

पीठ का दर्द, सिर का भारी रहना या दुर्बलता आदि रोग आपसे आप दूर हो जाते हैं।

(४) कुछ स्थिर्या के बल इसी लिए अपने बच्चे को दूध नहीं पिलातीं कि वे आप आराम-तब्दील होती हैं या चार स्थिरों के सामने बच्चे को दूध पिलाना बुरा समझती हैं।

(५) कुछ स्थिर्या यही नहीं जानतीं कि बच्चे के शारीरिक कल्याण और रक्षा के लिए उसे आप दूध पिलाना कितना आवश्यक है; और इसलिए वे उसे दूध नहीं पिलाती। वे यह समझ लेती हैं कि बच्चे को ऊपरी दूध पिला देना ही थोड़ा होता है। पर वे यह नहीं जानतीं कि अपने इस भूठे विश्वास के कारण वे बच्चे को कितनी जोखिम में डालती हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाना स्वयं माता के लिए भी बहुत लाभदायक है। इससे गर्भाशय के ठिकाने आने और स्वस्थ होने में बहुत सहायता मिलती है और आगे उस अग को कोई हानि नहीं पहुँचने पाती।

(६) कुछ स्थिरों को बहुत स्नान्युशों की दुर्बलता होती है और इसी लिए वे बच्चे को दूध नहीं पिलातीं।

जो ज्ञो देखते में बहुत नाजुक और कमज़ोर जान पड़ती हो, वह भी बच्चे को सफलतापूर्वक दूध पिलाने में बहुत समर्थ हो सकती है। इस बात का निर्णय तो उसके साधारण स्वास्थ से ही हो सकता है। ऐसी स्थिरों को यह स्मरण रखना चाहिए कि जिन बच्चों को ऊपरी दूध पिलाया जाता है, उनकी अपेक्षा वे बच्चे अधिक मज़बूत होते हैं जो अपनी माता का दूध पीते हैं। गौ आदि का दूध पीनेवाले बच्चों की अपेक्षा माता का दूध पीनेवाले बच्चे रोगों आदि का सामना करने में बहुत अधिक समर्थ होते हैं। ज्ञाती से दूध पिलाना ही प्राकृतिक ढंग है; और दूध पिलाना स्वयं खी के लिए लाभदायक होता है।

(७) माता को किस दशा में दूध नहीं पिलाना चाहिए—जिस खी का स्वास्थ अच्छा न हो, उसे अपने बच्चे को दूध

नहीं पिलाना चाहिए; या यदि दूध पिलाने से उसका स्वास्थ्य विगड़ता हो, तो भी उसे दूध नहीं पिलाना चाहिए। पर इस विषय का अन्तिम निर्णय डाक्टर के द्वारा होना चाहिए। स्वयं उस स्त्री को ही ऐसा निर्णय नहीं कर लेना चाहिए।

(२) यदि पुराने मलेशिया ज्वर के कारण स्त्री बहुत दुर्बल और अशक्त हो गई हो तो उसे अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए।

(३) क्षय-रोग—यदि स्त्री को क्षय-रोग हो या उसके होने के लक्षण दिखाई पड़ते हों तो उसे दूध नहीं पिलाना चाहिए। यदि वह दूध पिलावेगी तो उसका रोग बढ़ जायगा; और न हुआ होगा तो उसके जल्दी हो जाने का डर रहेगा। क्षय-रोग से पीड़ित स्त्री में इतना बल ही नहीं होता कि वह बच्चे को दूध पिला सके। साथ ही यह भी भय रहता है कि उस रोग के कीटाणु स्वयं बच्चे के शरीर में भी घर न कर ले।

(४) पागलपन—यदि दूध पिलानेवाली माता के चंदा में किसी को पागलपन का रोग रहा हो, तो उसे भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए; क्योंकि उसके दूध पिलाने से बच्चे के मस्तिष्क में भी खुराकी आने का डर रहता है।

(५) मिरगी—जिन स्त्रियों को मिरगी का दौरा होता हो, उन्हें भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए।

(६) छातियों में सूजन—यदि माता की छातियों में सूजन हो या धुंडियों में धाव हो गये हों या छाती में और किसी प्रकार का रोग हो तो भी उसे साधारणतः बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए।

(७) शीघ्र आवेश में आ जानेवाला स्वभाव—जो स्त्रियां ज़रा सी बात पर सहज में ही बहुत आवेश में आ जाती हों, उन्हें भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जल्दी क्रोध आ जाने व्रत आदि करने के कारण होनेवाली बेचैनी, मानसिक, चिन्ता,

दुःख और रोज़़ की संभटों आदि के कारण भी दूध में इस प्रकार के विकार हो जाते हैं कि फिर वह बच्चे के पीने और उसका पोषण करने के योग्य नहीं रह जाता।

(द) बहुत दिनों की बीमारियों, पुराने खुलारों या बहुत तेज़ खुलारों में भी बच्चे को दूध पिलाना बिलकुल छोड़ देना चाहिए।

प्रायः जुकाम, साधारण प्रकार के और थोड़े दिनों तक रहनेवाले इन्फ्लूएन्ज़ा आदि छोटी मोटी बीमारियों का दूध पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता जो देखने में आ सके। अधिक से अधिक यही होता है कि दूध की मात्रा कम हो जाती है।

दूध पिलाने के दिनों में स्वयं माता का स्वास्थ्य—दूध पिलाने के दिनों में माता को स्वयं अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन दिनों उसकी बहुत अधिक शक्ति खँच होती है। उसे सदा ऐसे ढंग से रहना चाहिए और ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें उसका स्वास्थ्य बिगड़ने न पावे। जिस चीज़ से माता की पाचनशक्ति ख़राब होती है, उसका उसकी छातियों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बच्चे की पाचन-शक्ति भी बिगड़ जाती है।

साफ़ हवा और सूरज की धूप का भी बहुत अधिक महत्व है। यदि वह सबेरे के समय दो तीन घंटे और सन्-ध्या के समय एक घंटे बाहर खुली हवा में नित ठहला करे, तो इतने से ही उसका स्वास्थ्य बहुत ठीक दशा में रह सकता है। उसे कभी किसी दशा में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वह बहुत थक जाय या उसका शरीर शिथिल हो जाय। यदि मौसिम अच्छा हो तो जहाँ तक हो सके, उसे अपना अधिक समय घर के बाहर खुली हवा में ही बिताना चाहिए। उसे केवल उतना ही काम करना चाहिए जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। उसका जीवन-दिवाह करने का ढंग और स्थियों से कुछ भी भिन्न नहीं होना चाहिए। साथ ही इन दिनों में उसे सुस्त और निकम्मी भी नहीं रहना चाहिए।

दूध पिलानेवाली माता का भोजन—ठीक तरह से स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए अच्छा और पोषक भोजन भी उतना ही आवश्यक है जितनी आवश्यक ताज़ी हवा और धूप है। बच्चेवाली की को सदा, और विशेषतः दूध पिलाने की अवस्था में, अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसी पर स्वयं उसका और उसके बच्चे का स्वास्थ्य निर्भर करता है।

उसे सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि छातियों से से दूध के निकलने के साथ ही साथ दिन पर दिन उसका शरीर चीण होता है; और उस कमी को पूरा करने के लिए अच्छे और पोषक भोजन की आवश्यकता होती है। उसे अच्छे और स्वादिष्ट पदार्थ खाने चाहिए और खाने की चीज़ों को प्रायः बदलते रहना चाहिए, जिसमें एक ही तरह की चीज़ें खाने से उसकी तबीयत डूँकता न जाय। वह और दिनों में जिस तरह की चीज़ें खाती हो, उसी तरह की चीज़ें उसे इन दिनों भी खानी चाहिए; पर उसमें तरल पदार्थ भी होने चाहिए और ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो हल्के हो और सहज में पच सकते हों।

मिला जुला भोजन सबसे अच्छा है। हल्की और जल्दी पचनेवाली तरकारियों और फलों के सेवन से, उसे बराबर साफ़ पाखाना होता रहेगा। पर ये चीज़े भी थोड़ी ही मात्रा में खानी चाहिए। टोमैटो और प्याज़ खाने से उसके दूध पीनेवाले बच्चे के पेट में दरद हो सकता है। प्रसव के कुछ महीने बाद आगे चलकर ये चीज़ें खाई जा सकती हैं; पर उस समय भी ध्यानपूर्वक यह देखते रहना चाहिए कि इन चीज़ों का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। आलू, लोबिया, मटर, मूली और शलजम के खाने से माता और बच्चे दोनों के पेट में वायु का विकार हो सकता है। यदि ये सब चीज़े खानी ही पड़ें तो बहुत कम और कभी कभी खानी चाहिए। बहुत अधिक चाय या कहवा पीना भी अच्छा नहीं है। कोको पीने से कोई हानि नहीं है। बहुत अधिक मसालेदार या मीठी चीज़े छोड़ देनी चाहिए। गांठोंभी

फूलगोभी और आलू कुछ माताओं को अनुकूल पढ़ते हैं; पर उन्हें भी ये सब चीज़ें बहुत कम मात्रा में खानी चाहिएँ।

अधिक मात्रा में पौष्टिक तरल पदार्थ पीने से भूख कम हो जाती है और उनका कोई लाभ नहीं होता। भोजन पचाने के लिए जो बीयर (Beer) या जौ की शराब पी, जाती है, उसका शरीर पर बलटा या दुरा प्रभाव पड़ता है। दूध पिलानेवाली माता के लिए सब प्रकार की शराबें अनावश्यक और हानिकारक होती हैं।

बहुत अधिक पेट भरकर खा लेने से भी कुछ अधिक दूध नहीं उत्तरता। तरल पौष्टिक पदार्थों और हल्के भोजन का सेवन किया जा सकता है। नीबू, खट्टी नारङ्गिया और इस प्रकार के और दूसरे खट्टे फल चिक्कुल न खाने चाहिएँ। बहुत अधिक मसालेदार भोजन, मिर्च और सिरका आदि भी छोड़ देना चाहिए; क्योंकि इनसे गुरुदों पर बहुत अधिक ज़ोर पड़ता है।

कठिन्यत——यदि कठिन्यत हो तो भोजन में सुधार करना चाहिए। खूब पानी पीना चाहिए, फल खाने चाहिएँ और कसरत करनी चाहिए। भोजन नियमित रूप से और वरावर अन्तर पर करना चाहिए। अच्छी तरह पकाई हुई हरी तरकारियाँ इस अवस्था में अधिक लाभदायक होती हैं। नियंत्रिती हवा में ठहलना भी बहुत अच्छा है। इसके लिए फल भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें पाखाना लाने का गुण होता है।

दूध पिलानेवाली लिंगों का अपने मन को वश में ग्रहना——दूध पिलानेवाली माता को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मानसिक अवस्था का उसके दूध की मात्रा पर ही नहीं बल्कि उसके गुण पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। साधारणतः लिंगों समझती हैं कि भोजन का ही दूध पर ग्राहन पड़ता है; इसलिए वे केवल भोजन पर ही ध्यान देती हैं। वे ऐसी चीज़ें नहीं खातीं जिनके सम्बन्ध में यह माना जाता है कि इनसे दूध

पीनेवाले बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पर साथ ही उन्हें यह भी समझ रखना चाहिए कि उनकी मानसिक अवस्था का भी उनके दूध पर अपेक्षाकृत और भी अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए जहाँ तक हो सके, उन्हें अपने मन को वश में रखना चाहिए और किसी प्रकार की बेचैनी नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। उदाहरण के लिए दुःख, ख्लेश, चिन्ता, भोग की चाह और बहुत अधिक सम्भोग या ज्ञोभ और थकावट आदि से भी दूध उतरना बिलकुल बन्द हो जाता है। यदि दूध न भी रुके तो भी जिन चीजों से वह बनता है उनमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिससे बच्चा बीमार पड़ सकता है। यदि बच्चे का स्वास्थ्य साधारणतः ठीक रहता हो और बीच में अचानक वह किसी कारण से बीमार हो जाय, तो माता को इस बात का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह बीमारी कहाँ मेरी बिगड़ी हुई मानसिक अवस्था का फल तो नहीं है। खूब आराम करने और सोने, खुली हवा में रहने और थोड़ी बहुत कसरत करने से वह अनावश्यक चिन्ताओं से बहुत कुछ बच्ची रह सकती है। सादा, नियमित और प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना इतना अधिक आवश्यक और ज्ञानदायक है कि उसका पूरा पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता। बिना इन सब बातों के बच्चे को सफलतापूर्वक दूध पिलाने की आशा करना ही व्यर्थ है। मन एक बहुत बलवान् तत्त्व है; इसलिए सदा प्रसन्न रहने और सब प्रकार की मानसिक चिन्ता तथा बेचैनी से बचने में कभी कोई बात उठा नहीं रखनी चाहिए।

पाँचवाँ प्रकारण

दूध पिलानेवाली दाई

माता के प्रति—पिछ्के प्रकरण में यह बतलाया जा चुका है कि छातियों से दूध पिलाने का कितना महस्त है। उससे तुम्हे यह पता चल गया होगा कि दूध पिलाने में जो जो भूलें होती हैं, उनसे किस प्रकार बचना चाहिए और अपने बच्चे को स्वयं दूध पिलाने के लिए तैयार होने पर भी तुम्हारे मार्ग में जो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, उनसे किस प्रकार बचना चाहिए। यदि हृतने पर भी किसी कारण से तुम्हे सफलता न हो, तब तुम्हें दूध पिलानेवाली एक अच्छी दाई रखने का चटपट प्रबन्ध करना चाहिए। स्वयं दूध पिलाने के बाद यदि और कोई अच्छे से अच्छा उपाय हो सकता है, तो वह यही है। तुम्हे चट-पट अपने बच्चे को गौ आदि का ऊपरी दूध पिलाना नहीं आरम्भ कर देना चाहिए। उसका समय तब आवेगा, जब तुमको कोई अच्छी दाई नियुक्त करने में सफलता नहीं होगी। दूध पिलानेवाली दाई नियुक्त करने से पहले ड्योरे की उन सुख्य सुख्य बातों को अच्छी तरह समझ को लिन पर इस प्रकरण में विचार किया गया है; क्योंकि बच्चे के भावी कल्याण के लिए अच्छी दाई चुनना बहुत अधिक आवश्यक है।

दूध पिलानेवाली दाई नियुक्त करना—यदि माता की सूख्य अथवा लीमारी के कारण किसी नवजात बच्चे को उसकी माता का दूध न मिला सकता हो, तो घर में दूध पिलानेवाली दाई नियुक्त करने की एक समस्या खड़ी हो जाती है; और कई कारणों से इस-

न्समस्था पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सभी बच्चों के लिए और विशेषतः कमज़ोर और नाजुक बच्चों के लिए एक उपयुक्त दूध पिलानेवाली दाई जितनी अच्छी हो सकती है, उतनी अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। किसी प्रकार का उपरी दूध पिलाना या बनावटी ढङ्ग से दूध पिलाना उससे आधा भी अच्छा और उपयुक्त नहीं हो सकता। ऐसे बच्चों के लिए जितनी जल्दी दूध पिलानेवाली दाई नियुक्त कर ली जाय, उतना ही अच्छा है। इसमें देर करना घातक हो सकता है। दूध पिलानेवाली अच्छी दाईया बहुत ही कम मिलती है; इसलिए किसी अच्छी और उपयुक्त दाई का मिल जाना सहज बात नहीं है।

साधारण शारीरिक स्वास्थ्य—दूध पिलानेवाली दाई सूख हृष्ट पुष्ट और सब प्रकार के रोगों से मुक्त होनी चाहिए। दूध पिलाने के समय तो वह स्वस्थ होनी ही चाहिए, पर साथ ही शुरू से भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। दाई के साधारण शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि के सम्बन्ध में पूरा सन्तोष हो जाने पर माता को विशेष रूप से और अच्छी तरह यह देख लेना चाहिए कि उसे उपेतिक और गरमी अर्थात् आतशक इन दोनों में से कोई बीमारी तो नहीं है।

स्वच्छता—दूध पिलानेवाली दाई में सफाई का होना बहुत ही ज़रूरी है। पर यदि उसमें पूरी सफाई न हो, तो भी उसे नियुक्त करने-वाले को विशेष निराश न होना चाहिए; क्योंकि बाद में जब उसे समझाया जायगा और साफ़ रहने पर ज़ोर दिया जायगा, तो उसका नान्दगी का दोप सहज में दूर हो जायगा।

दाई की परीक्षा—दूध पिलानेवाली दाई को नियुक्त करने से पहले एक अच्छे डाक्टर से उसकी परीक्षा करा लेना बहुत अच्छा है। कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनकी पहचान डाक्टर ही कर सकते हैं। पर यदि किसी अवसर पर ऐसा अच्छा डाक्टर न मिल

सकता हो, तो बच्चे की माता को नीचे लिखी बाते बहुत व्यानपूर्वक देख लेनी चाहिए ।

क्षय-रोग—रोग की आरम्भिक अवस्था में इसका पता चलना कठिन होता है । परं फिर भी माता को उचित है कि वह दाई से उसके पिछले स्वास्थ के सम्बन्ध में सब बाते अच्छी तरह पूछ ले । उसे यह समझ लेना चाहिए कि कभी दाई को खासी या बुखार तो नहीं हुआ है या बीमारी के दिनों में उसके शरीर का बज़न तो नहीं घटा है । उसकी गरदन विशेषरूप से देख लेनी चाहिए; और यदि उसमें बड़ी हुई गिलिटर्ड दिखाई पड़े तो उसे तुरन्त जबाब दे देना चाहिए ।

गरमी या आतशक—यह पता लगाना बहुत कठिन होता है कि दूध पिलानेवाली दाई को यह रोग है या नहीं । इसलिए ऐसी अवस्था में सबसे अच्छी बात यह है कि उस दाई के बच्चे की अच्छी तरह परीक्षा कर ली जाय । इस रोग के लक्षण स्वयं उस दाई की अपेक्षा उसके बच्चे में सहज में दिखाई पड़ सकते हैं । यदि दाई में इस रोग का कोई लक्षण न दिखाई पड़े या ऐसे लक्षण दिखाई पड़ें, जिनसे केवल सन्देह हो सकता हो, तो उसके बच्चे में, यदि उसकी माता को यह रोग हुआ तो, उसके लक्षण अवश्य ही दिखाई पड़े । इस विषय में सबसे अच्छी बात यह है कि उसे किसी अच्छे डाक्टर को दिखाकर अपना सन्तोष कर लिया जाय । यदि यह निश्चय हो जाय कि इस दाई को कभी गरमी हुई थी, तो फिर वह बच्चे को दूध पिलाने के थोग्य नहीं रहती । बच्चा किसी ऐसी दाई को दूध पिलाने के लिए नहीं देना चाहिए जिसे कभी गरमी हुई हो । साथ ही जिस बच्चे में गरमी के रोग का कुछ अंश हो, वह बच्चा भी किसी स्वस्थ दाई को दूध पिलाने के लिए नहीं देना चाहिए । जान छूकर ऐसा करना नैतिक दृष्टि से बड़ा भारी अपराध है ।

दाई की छातियों की परीक्षा—साधारणतः किसी दाई को अपनी छातियों या उनमें से निकलानेवाले दूध की परीक्षा कराने में

कोई आपत्ति नहीं होती। दाई की छातियों का बड़ा आकार देखकर ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उनके बड़े होने का मुख्य कारण केवल चरबी भी हो सकती है; पर हमारा मुख्य उद्देश्य तो यह देखना है कि उसकी छातियों में यथेष्ट दूध उत्तरता है या नहीं।

सबसे अच्छी बात यह है कि दाई के बच्चे की परीक्षा करा ली जाय; और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह देख लिया जाय कि वह बच्चे को दूध पिलाने के लिए कहाँ तक उपयुक्त है। यदि उसके बच्चे का ठीक तरह से पोषण हुआ हो और अपनी अवस्था के अनुसार उसके शरीर का ठीक ठीक विकास हुआ हो, तो यह मान लेना चाहिए कि जो बच्चा उसे दूध पिलाने के लिए दिया जायगा, उसका भी ठीक तरह से पोषण होगा। इस काम में धोखे से बचना चाहिए; क्योंकि कुछ दाइर्याँ अपने बच्चे की जगह किसी दूसरी दाई का बच्चा लाकर दिखला दिया करती है।

मान लो कि तुमने बच्चे को दूध पिलाने के लिए दाई नियत कर ली। अब तुम यह बात किस तरह जानोगी कि उसका दूध! तुम्हारे बच्चे के लिए अनुकूल होता है या नहीं? जब बच्चा उसका दूध पीता रहे, तब तुम्हें बच्चे पर पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छी तरह दूध पीता हो और उस दूध से सन्तुष्ट होता हो तो समझ लेना चाहिए कि उसकी छातियों में यथेष्ट दूध है। यदि बच्चे को बार बार दूध पीने की आवश्यकता पड़ती हो, उसे दूध पीने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता हो, बीच बीच में दूध पीना छोड़कर वह ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगे, तो यही समझना पड़ेगा कि सम्भवतः दाई की छातियों में आवश्यकता से कम दूध है।

माता-पिता और दाई में मतभेद या भ्रम उत्पन्न होना—
प्रायः ऐसे अनेक अवसर आया करते हैं जब कि दाई का दूध पीते रहने पर भी बच्चा जितना तन्दुरुस्त रहना और बढ़ना चाहिए, उतना स्वस्थ

नहीं रहता या उतना नहीं बढ़ता। उस समय माता-पिता के मन में कुछ अम या और ही प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और वे बच्चे के स्वस्थ न रहने का सारा दोष बेचारी दाई के सिर मढ़ते हैं। यदि माता-पिता उस अवसर पर मन को शान्त करके विचार करें तो उनमें और दाई में किसी प्रकार का मतभेद या अमपूर्ण विचार उत्पन्न होने के बहुत ही कम अवसर आवेंगे। जिस समय दाई नियुक्त की जाती है, उस समय तो उसकी छातियों में बहुत काफ़ी दूध रहता है। पर बीच में ही बच्चे की तबीयत किसी और कारण से ख़राब हो जाती है; और माता-पिता ऐसी अवस्था को सहन नहीं कर सकते। हमें इस अवस्था पर ज़रा और अच्छी तरह विचार करना चाहिए।

मतभेद या भ्रम उत्पन्न होने का पहला कारण और उसे दूर करने का उपाय—ग्राम: ऐसा होता है कि जो बच्चा दूध पिलाने के लिए दाई को सौंपा जाता है, वह बीमार-सा और कमज़ोर हुआ करता है और वह ऐसा होता है जिसे थोड़े ही पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसा बच्चा छातियों को अच्छी तरह दूध से ख़ाली करने के योग्य नहीं होता; और छातियों में अच्छी तरह दूध उत्पन्न करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि छातिया बराबर दूध से ख़ाली होती रहा करे। छातियों के पूरी तरह से ख़ाली न होने के कारण उनके अन्दर की गिरिटर्डा अपना ठीक ठीक काम नहीं करतीं, जिससे छातियों में दूध उत्पन्न बन्द हो जाता है। उस समय यह कहकर दाई छुड़ा दी जाती है कि तुम्हारी छातियों में दूध तो है ही नहीं। यदि ऐसे अवसर पर डाक्टर को दिलाकर उसका परामर्श लिया जाय तो करी ऐसी बात न हो।

जब बच्चा कमज़ोर या बीमार हो, तब दाई से कह देना चाहिए कि वह स्वयं अपने बच्चे को भी दूध पिलाया करे। जब उस बीमार और कमज़ोर बच्चे के साथ दाई का स्वस्थ बच्चा भी दूध पीने लगेगा,

तब साधारणतः छाती की गिलियों में दूध बनना बन्द नहीं होगा और न दूध उतरना ही बन्द होगा। इस उपाय से छातियाँ दूध से अच्छी तरह खाली होती रहेंगी और दूध के बराबर उतरने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी।

यदि बच्चा इतना अधिक कमज़ोर हो कि छातियों में से दूध बिलकुल चूस ही न सकता हो तब दाई को चाहिए कि प्रथम की सहायता से अपनी छातियों में से दूध निकाल कर बोतल चमच या ड्रॉपर (Dropper) आदि की सहायता से बच्चे को दूध पिलाया करे।

भ्रम उत्पन्न होने का दूसरा कारण और उसका उपाय—प्रायः दाईर्यां दूध पिलाने के नियम आदि नहीं जानती। बच्चे को अपनी अवस्था के विचार से जितने दूध की आवश्यकता होती है, वह प्रायः उससे अधिक दूध पी जाया करता है। इसके सिवा वह जब जब रोता है, तब तब उसे दूध पिलाया जाता है; इस कारण भी वह आवश्यकता से अधिक दूध पी लेता है। कुछ दिनों तक इसी प्रकार चलता रहता है और तब बच्चा या तो कै करने लगता है या उसे दस्त आने लगते हैं; अर्थात् उसमें अपच के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बस इतने से मातानपिता तुरन्त यही समझ लेते हैं कि इस दाई का दूध बच्चे के अनुकूल नहीं होता; इसलिए वे उसे छुड़ा देते हैं। इसका उपाय यही है कि दाई को यह बात अच्छी तरह समझा दी जाय कि वह बच्चे को ठीक और नियमित समय पर ही दूध पिलाया करे।

अवस्था के सम्बन्ध में भ्रम—साधारणतः लोग यही समझते हैं कि दाई का बच्चा भी उतनी ही अवस्था का होना चाहिए जितनी अवस्था का वह बच्चा है जिसे दूध पिलाने के लिए वह नियुक्त की जाती है। पर यह कोई क्षरूरी बात नहीं है। अवस्था के कारण कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं पढ़ता। इसके सिवा यदि इस

नियम का पूरा पूरा पालन किया जाय तो अच्छी दाईं नियुक्त करना एक प्रकार से असम्भव ही हो जायगा। क्योंकि दूध पिलानेवाली दाइयों बहुत ही शोड़ी मिलती हैं। इसके विपरीत जो द्वी किसी बच्चे को कई महीने तक दूध पिला चुकी होती है, वह दूध पिलाने की कला को अच्छी तरह जानती है; और यदि ऐसी दाईं में कोई दूसरी ख़राबी न हो तो उसका दूध पीकर बच्चा खूब अच्छी तरह बढ़ सकता है।

दाईं के सम्बन्ध में चरक के विचार—चरक ने लिखा है—“दूध पिलानेवाली दाईं कम अवस्था की या युवती, स्वभाव से नन्हा, सब प्रकार के रोगों से मुक्त और ऐसी होनी चाहिए कि उसका कोई अंग भंग न हो। उसमें नीचे लिखे दुरुण या दुर्घटन भी न होने चाहिए—शिकार, जूझा, दिन के समय सोना, दूसरों की लिन्दा करना, मादक द्रव्यों का सेवन, नाचने^१ गाने या बाजे बजाने का शौक, व्यर्थ इधर-उधर घूमना, चुगली खाना, उड़ंडता, द्वेष और ईर्ष्या। वह उसी देश में उत्पन्न हुई हो, नीच या ऊँच्छ स्वभाव की न हो, स्वयं उसके बच्चे हृष्ट-गृष्ट और जीवित हों, लड़कों की (लड़कियों की नहीं) माता हो, उसके स्तनों में दूध अधिक होता हो, वह कभी लापरवाही न करती हो, जो अनुचित या अनुपयुक्त स्थान अथवा समय पर लेट या सोना जाती हो, गन्दे स्थानों में कभी न सोती हो, अपनी से छोटी श्रेणियों के पुरुषों और स्त्रियों के साथ न मिलती-जुलती हो, सेवा करने में तप्पर हो, मन और शरीर से पवित्र हो, प्रस्त्रे अपवित्र पदार्थ से सदा दूर रहती हो, जिसके स्तन बड़े बड़े हों और उनमें यज्ञदूध होता हो।”

^१ यहाँ इस सम्बन्ध में यह बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि चरक ने नृत्य या नाचने के सम्बन्ध में यहाँ जो आपत्ति की है, वह नृत्य-सम्बन्धी पूर्वी विचार या धारणा के अनुसार है, जो परिचमी खोगों के नृत्य-सम्बन्धी विचार या धारणा से एक सीमा तक मिल है।

“स्तनों की अवस्था—स्तन न तो बहुत जँचे होने चाहिएँ और न बहुत लम्बे, न बहुत पतले या सूखे हुए होने चाहिएँ और न बहुत मोटे या फूले हुए। उनमें की घुंडियाँ भी उनके आकार के अनुसार ही हो और ऐसी हों जिन्हे बच्चा सहज से चूस सके।”

“दूध की अधिकता—दूध का रंग, स्वाद, गन्ध और स्पर्श भी प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए। जिस समय वह ठंडा और ताज़ा हो, उस समय वह पानी में पूरी तरह से छुल जाना चाहिए। यदि न छुले तो समझना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार के रोग का प्रभाव या अंश है। जो दूध साधारण पानी से भारी होता है और इसी लिए जो पानी में छुलता नहीं बल्कि उसके नीचे बैठ जाता है अथवा जिसमें किसी विशेष प्रकार की गन्ध आती हो, फार बढ़ती हो या जिसका रंग मैला, नीला, पीला या तरबे का सा हो, वह दूध अच्छा और ठीक नहीं होता। दूध की ये दूषित अवस्थायें प्रायः इसी कारण होती हैं कि दूध पिलानेवाली दाई का भोजन ठीक और अच्छा नहीं होता। यदि बच्चा ठीक तरह से पनपता और बढ़ता न हो तो दाई के भोजन में तुरन्त सुधार करना चाहिए।”

खुराक दूधवाली दाई के खान-पान के सम्बन्ध में सूचनायें—यदि दाई के खाने पीने की चीज़ों में जौ, गेहूँ, चावल, मूँग और मांस का अंश अधिक हो और उसे अधिक दूध पिलाया जाय तो उसकी छातियों का दूध गुण और मात्रा दोनों के विचार से बहुत अच्छा हो जायगा।

छठा प्रकारण

दूध कुड़ाना

माता के प्रति—इस प्रकरण में यह बतलाया जायगा कि वच्चे का दूध कुड़ाने का ठीक और उपयुक्त समय कौन सा है। कुछ मातायें तो समय से बहुत पहले ही वच्चे को छाती से दूध पिलाना बन्द कर देती हैं; और कुछ मातायें आवश्यकता से बहुत अधिक समय तक दूध पिलाती रहती हैं। सातार और वच्चे दोनों के स्वास्थ्य के विचार से इन दोनों ही चरम भीमाओं का त्याग करना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकरण में जो नियम बतलाये गये हैं, वहि वे अच्छी तरह समझ लिये जायेंगे तो तुम उन अनेक साधारण भूलों से भी वच्चे सकेगी जो ग्रायः दूध कुड़ाने के सम्बन्ध में कुछ खिर्यां किया करती हैं।

विषय का परिचय—बहुत सी माताओं को सदा इस बात की बहुत बड़ी चिन्ता लगी रहती है कि वच्चे का छातियों से दूध पीना कब छूटेगा। इस सम्बन्ध में अनावश्यक चिन्ता करना कभी ठीक नहीं हो सकता। यदि दूध कुड़ाने के सम्बन्ध के नियमों का ठीक तरह से पालन किया जायगा, तो मातायें सहज में उन कठिनाहृयों से पार पा जायेंगी जो साधारणतः और मातायें अनुभव किया करती हैं।

साधारणतः भारत में वच्चों को एक साल तक और थूरोप के देशों से नौ महीने तक छातियों से दूध पिलाया जाता है। ग्रायः ऐसा भी होता है कि नौ महीने से पहले ही वच्चे का दूध कुड़ा दिया जाता है;

और इसके विपरीत कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को दो बल्कि तीन बरस तक भी छाती से दूध पिलाया जाता है। पर ये दोनों ही चरम सीमाएँ ठीक नहीं हैं। बच्चे को यह प्राकृतिक भोजन तब तक मिलना चाहिए जब तक इससे उसका ठीक तरह से पोषण होता हुआ दिखाई दे और वह बढ़ता रहे। पर किर भी साधारणतः किसी बच्चे को एक बरस से अधिक छातियों का दूध नहीं पिलाना चाहिए; क्योंकि बच्चे के भोजन के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, वे पदार्थ एक बरस के बाद माता के दूध से नहीं रह जाते।

दूध छुड़ाने के सम्बन्ध में सबसे अधिक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता और बच्चे दोनों का ही स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य और महत्व की दूसरी बात यह है कि दूध अचानक या एकदम से नहीं छुड़ाया जाना चाहिए। यदि अचानक या एकदम से दूध छुड़ा दिया जायगा, तो उससे माता और बच्चे दोनों को हानि पहुँचेगी। यदि माता के स्तनों की स्वाभाविक किण्या अचानक बन्द हो जायगी, तो उसे अवश्य बहुत कष्ट होगा।

अधिक समय तक दूध पिलाने का माता के स्वास्थ्य पर प्रभाव—यदि आवश्यकता से बहुत अधिक समय तक बच्चे को छातियों से दूध पिलाया जायगा तो माता के स्वास्थ्य को अवश्य हानि पहुँचेगी। इस प्रकार दूध पिलानेवाली माता असमय में और जल्दी ही बड़ी उम्र की या बड़ी जान पड़ने लगेगी और उसका सौभद्र्य समय से बहुत पहले ही जाता रहेगा। पर निश्चित समय तक दूध पिलाने में ये सब बाते नहीं होंगी। बहुत अधिक समय तक दूध पिलाते रहने के कारण माता की बहुत अधिक शक्ति व्यय होती है और उसी के फलस्वरूप ये सब बाते होती हैं। इस सम्बन्ध में माताओं के लिए दूसरी बड़ी कठिनता यह होती है कि वे जितने ही अधिक समय तक बच्चे को दूध पिलाती चलती है, उतना ही वे बच्चे का दूध छुड़ाने से डरती हैं। उन्हें मन में यह शंका होने लगती है कि

यदि बच्चे को अपरी दूध पिलाया जायगा, तो वह अच्छी तरह नहीं रह सकेगा और शायद बीमार पड़ जायगा। उनका यह विचार जितना ही दड़ होता जाता है, उनके लिए बच्चे का दूध छुड़ाना भी नहीं जितना ही कठिन होता जाता है।

जो बच्चे आवश्यकता से बहुत अधिक समय तक माता का दूध पीते रहते हैं, वे साधारणतः देखने में स्वस्थ नहीं जान पड़ते और उनका रझ पीला पड़ जाता है। और यदि माता ठीक समय से पहले ही उन्हें अपना दूध पिलाना बन्द कर देती है, तो अपरी दूध आदि के कारण जितनी जोखिमें या ख़राबिर्या होती है, उन सबका उनके सम्बन्ध में भय बना रहता है।

(१) दूध किन अवस्थाओं में छुड़ाना चाहिए—

यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा न जान पड़े अथवा वह स्वयं देखती हो कि भेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो उसे किसी अच्छे डाक्टर को दिखलाना चाहिए; और यदि डाक्टर की सम्मति हो तो उस समय छातियों में यथेष्ट दूध रहने पर भी उसे बच्चे को दूध पिलाना समय से पहले ही बन्द कर देना चाहिए।

(२) यदि बच्चा अपने दोतों से माता की छातियों की बुद्धियों को काटता हो तो समझ लेना चाहिए कि उसका दूध छुड़ाने का समय आ गया है।

(३) यदि माता को कोई भीषण रोग जैसे न्यूमोनिया आदि हो, तो वसे तुरन्त बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देना चाहिए।

(४) यदि माता को शय-रोग हो जाय तो भी तुरन्त बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देना चाहिए।

(५) यदि दूध पिलाने की दशा में माता फिर से गर्भवती हो जाय, तो अतु आदि का बिना कोई विचार किये तुरन्त बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देना चाहिए।

(६) यदि हर बार दूध पिलाने के समय दोनों छातियों से दूध पिलाने और थोड़ो थोड़ी ढेर के बाद दूध पिलाने पर भी बच्चा तौल में न बढ़े तो उसे दूध पिलाना छोड़ देना चाहिए।

(१) दूध किन अवस्थाओं में नहीं छुड़ाना चाहिए—
गरमी के दिनों में बच्चे का दूध नहीं छुड़ाना चाहिए। ग्रीष्म के महीनों में जो गरमी पढ़ती है, उसका बच्चे की पाचन-शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है; इससे यह डर रहता है कि कहीं उसे दस्त न आने लगे। जब तक कुछ ठंडक न पड़ने लगे, तब तक उसे दूध पिलाते चलना ही अच्छा है। लेकिन यदि माता का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो जाय, तो दूध पिलाना तुरन्त बन्द कर देना चाहिए।

(२) यदि बच्चा किसी बीमारी से तुरन्त ही अच्छा हुआ हो तो उस समय उसका दूध नहीं छुड़ाना चाहिए। हाँ जब वह फिर से स्वस्थ और बलिष्ठ हो जाय, तब उसे दूध पिलाना बन्द कर देना चाहिए।

(३) जिस समय बच्चे को दर्ता निकल रहे हो, उस समय उसे दूध पिलाना नहीं बन्द करना चाहिए। दर्ता निकलने का समय अच्छी तरह बीत जाने देना चाहिए। दर्ता निकलने के समय बच्चे का स्वास्थ्य कुछ ख़राब हो जाता है। यदि उस समय अचानक उसे छातियों से दूध पिलाना बन्द कर दिया जायगा और ऊपरी दूध पिलाना आरम्भ किया जायगा, तो उसके बहुत अधिक बीमार हो जाने का डर रहेगा।

(४) यदि दूध पिलानेवाली माता मासिक धर्म से होने लगे, तब यह प्रदन उत्पन्न होता है कि वह बच्चे को अपना दूध पिलावे या न पिलावे। साधारणतः ऐसी माताओं के दूध पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता; और मासिक धर्म आरम्भ हो जाने के कारण माता के दूध से बच्चे को कोई हानि नहीं पहुँचती। परन्तु यदि उस समय

दूध पीने पर भी बच्चा तौल में न थड़े या बीच बीच में उसके पेट में दरद हुआ करे, वह रोया करे या उसे भोजन ठीक तरह से न पचे और आंख पड़ने लगे, और जब जब खी मासिक धर्म से हो, तब तब बच्चे में ये ही बातें दिखाईं पहें, तब केवल मासिक धर्म के दिनों में ही बच्चे को गौ का या ऊपरी दूध पिलाया जाय; और ज्यों ही मासिक धर्म बन्द हो जाय, तो ही उसे फिर दूध पिलाना आरम्भ कर देना चाहिए।

छातियों का दूध छुड़ाना और कृत्रिम रूप से भोजन देना—बच्चे का दूध अचानक नहीं छुड़ाना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे छुड़ाना चाहिए। इससे इस बीच के समय में माता और बच्चे दोनों की ही बहुत से कष्टों और चिन्ताओं से रक्षा होगी। छातियों से दूध पिलाने के साथ ही साथ बीच बीच में उसे बराबर कृत्रिम भोजन या ऊपरी दूध आदि भी देते रहना चाहिए। पर यदि यह देखने में आवे कि बच्चा ठीक तरह से नहीं बढ़ रहा है, तो उसे फिर केवल अपना ही दूध पिलाना आरम्भ कर देना चाहिए।

बच्चे का दूध किस तरह छुड़ाना चाहिए—बच्चे का छातियों से दूध पीना छुड़ाने के लिए माता को चाहिए कि वह अपनी छातियों में कुनीन या इसी प्रकार की और कोई कढ़वी चीज़ लगा ले। इसी बीच में उसे इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि छातियों में और दूध पैटा ही न हो और उनमें से दूध निकले ही नहीं। इसके लिए उसे छातियों पर कसकर एक पट्टी बांध लेनी चाहिए और मुलायम हाथों से दबाकर छातियों में से दूध निकाल देना चाहिए। दो तीन दिन में यह सारी कठिनता आपसे आप दूर हो जायगी। यदि इन सब उपायों से भी काम न चले तो फिर पम्प की सहायता से छातियों में से दूध निकाल देना चाहिए।

मिले-जुले भोजन—मिले-जुले भोजन का मतलब यह है कि माता बच्चे को अपना दूध पिलाने के साथ ही साथ थोड़ा सा ऊपरी

दूध भी पिलाया करे। ऊपरी दूध गौ या बकरी का भी हो सकता है, और वह दूध भी हो सकता है जो डिढ़बों में बन्द होकर विलायत से आता और बाजारों में बिकता है। इस प्रकार मिला-जुला दूध देने की आवश्यकता उस समय होती है, जब माता की छातियों में बच्चे की आवश्यकता भर को दूध नहीं उत्पन्न होता। इससे माता के शरीर पर ज़ोर पड़ना कम हो जाता है। ग्रामः इस उपाय से बहुत अच्छी सफलता होती है; क्योंकि इससे छातियों को कुछ विश्राम मिलता है और उनमें अधिक दूध उत्पन्न होने का अवसर मिलता है, और इस प्रकार अधिक समय तक छातियों में से दूध उत्पन्न रहता रहता है। बच्चा अवस्था में जितना ही कम होता है, उसके लिए दूध की एक एक बूँद उतनी ही अधिक लाभदायक होती है; और बच्चे के जीवन के आरम्भिक सप्ताहों में यह सिद्धान्त सबसे अधिक महत्व का होता है। इस प्रकार बहुत सी माताये दूध पिलाने के योग्य हो जाती है और अपने दूध पिलाने की शक्ति या सामर्थ्य पर उन्हें विश्वास हो जाता है। पर केवल माता का दूध पीनेवाले बच्चों की अपेक्षा इस प्रकार का मिश्रित दूध पीनेवाले बच्चे ग्रामः अधिक बीमार पढ़ते हैं। ऐसी अवस्था में बच्चे का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए उन्हें ऊपरी दूध देना बिलकुल बन्द कर देना चाहिए। बीमारी की अवस्था में पाचन-शक्ति यो ही कुछ हुब्बल हो जाती है; इसलिए उन दिनों उनका सबसे अच्छा पोषण केवल माता के दूध से ही हो सकता है। जब उनका रोग अच्छा हो जाय और वे भली भाँति स्वस्थ हो जायें, तब उन्हे फिर मिला जुला दूध देना आरम्भ किया जा सकता है।

सातवाँ प्रकारण

कृत्रिम रूप से भोजन देना

माता के प्रति----बनावटी ढङ्ग से दूध पिलाने के सम्बन्ध का
यह प्रकारण बहुत महत्व का है और तुम्हे इस पर विशेष ध्यान देना
चाहिए। बच्चे को कृत्रिम रूप से दूध पिलाना कोई साधारण काम
नहीं है। यह स्वयं एक कला है और यह तभी आ सकती है जब इसके
सम्बन्ध में बतलाई हुई सभी डिप्रोतेवार बातों का बहुत ध्यानपूर्वक
अध्ययन किया जाय। कृत्रिम रूप से दूध पिलाने में सफलता प्राप्त
करने के लिए बहुत होशियारी की ज़रूरत है। यदि होशियारी से काम
न लिया जायगा तो बच्चे के लिए इसका बहुत ही बुरा फल होने का
ऊर रहेगा।

प्रायः: बनावटी ढङ्ग से दूध पिलाने में अनेक प्रकार की भूलें हुआं
करती हैं। यदि तुमसे कुछ भूले हो भी जायें तो भी तुम्हें हताश नहीं
होना चाहिए। जहाँ तक हो सके, बहुत ही होशियारी और समझदारी
के साथ हाथ से दूध पिलाने के सम्बन्ध की सभी बातों का अभ्यास
करो। यदि तुम्हारा बच्चा कमज़ोर या बीमार हो तो तुम्हारे लिए यह
और भी आवश्यक है कि तुम दूध पिलाने के सम्बन्ध की सभी बातों
पर और भी होशियारी के साथ ध्यान दो और विशेषतः स्वच्छता,
नियमितता आदि के नियमों का पूरा पूरा पालन करो, किसी काम से
अति न करो, सदा मन्यम मार्ग का अवलम्बन करो और सब बातों पर
बहुत ही होशियारी के साथ पूरा पूरा ध्यान दो। साथ ही तुम्हे बहुत
अधिक धैर्य भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आरम्भ से जो फल दिखाई
पड़ेंगे, वे सन्तोषजनक नहीं होंगे। जल्दी से कोई एक भोजन कुड़ाकर

दूसरा भोजन नहीं आरम्भ कर देना चाहिए। तुम्हें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि बच्चे को पूरा पूरा अवसर दिया जायगा, तो वह नये भोजन को पचाने की अपनी शक्ति का पेसा परिवर्त्य देरा कि तुम्हें देखकर आश्चर्य होगा। पर इसके लिए उसे समय देकर धीरे धीरे अभ्यास कराने की आवश्यकता होगी।

आरम्भिक सूचनाये—कृत्रिम रूप से भोजन देने का मतलब यह है कि बच्चे के आरम्भिक पालन पोषण के समय उसे माता के दूध की जगह कोई और भोजन दिया जाया करे। इसमें सन्देह नहीं कि छोटे बच्चे के लिए माता का दूध एक आदर्श भोजन है और उसके अभाव में दूसरा सबसे अच्छा भोजन दाइंग का दूध है। पर यदि किसी कारण से ये दोनों ही दूध न मिल सकते हों, तो फिर बच्चे की जान पचाने का केवल एक यही उपाय रह जाता है कि उसे कृत्रिम रूप से भोजन दिया जाय।

यह कृत्रिम रूप से भोजन देना था तो बच्चे के जन्म के थोड़े ही समय के बाद और या उसे कुछ दिनों तक छातियों का दूध पिलाने के उपरान्त आरम्भ किया जा सकता है। यदि जन्म लेने के बाद तुरन्त ही बच्चे को ऊपरी दूध पर रखा जाय, तो बहुत बड़ी कठिनता उपस्थित होती है। हाँ यदि बच्चा पांच छः महीने तक छातियों से दूध पी चुका हो तो यह काम अपेक्षाकृत कुछ सहज हो जाता है। और यदि बच्चे से माँ का दूध धीरे धीरे छुड़ाया जाय तो फिर यह काम और भी सहज हो जाता है। पर यदि अचानक छातियों का दूध छुड़ाकर कृत्रिम रूप से दूध पिलाना आरम्भ किया जाय तो उसमें बहुत बड़ी जोखिम होती है। यदि बच्चे को केवल कृत्रिम भोजन पर ही रखना पड़े, तो उसमें बहुत अधिक हाशियारी, धैर्य और क्रियात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक वर्ष से कम अवस्था के जितने बच्चे मरते हैं, उनमें से अधिकांश की मृत्यु का कारण यही होता है कि उन्हें बनावटी ढंग से दूध पिलाकर रखने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसे बच्चों की मृत्यु बनावटी ढंग से

टिये जानेवाले दूध के कारण होती है और दूध देने की दुरी रीतियों के ही कारण अधिक होती है। ठीक तरह से दूध पिलाने के लिए सच्छ्रुता, नियमितता और मन्त्रम भार्ग के ग्रहण करने की आवश्यकता तो होती ही है, पर साथ ही उसमें परिणामों पर अच्छी तरह ध्यान देने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। उसमें देखने की मुख्य बात यह होती है कि बच्चा तौल में घट रहा है या बढ़ रहा है। यदि बच्चा ठीक तरह से न बढ़ता हो तो दूध पिलाने के ढंग में ठीक तरह से सुधार करना चाहिए। बनावटी ढंग से दूध पिलाने का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि बच्चा जीता रहे, बल्कि यह उद्देश्य है कि बच्चे को जितना बढ़ना और विकसित होना चाहिए, वह उतना ही बड़े और फूले। यदि जीवन के आरम्भिक महीनों में ही बच्चे के स्वास्थ्य की नींव अच्छी तरह न पड़ेगी, तो आगे चलकर माता-पिता को उसके सम्बन्ध में सदा बहुत बड़ी चिन्ता बनी रहेगी। इसलिए आरम्भिक महीनों में जब बच्चे को कृत्रिम रूप से दूध दिया जाता हो, तब इस बात का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि उसकी तौल और अंग आदि ठीक तरह से बढ़ रहे हैं या नहीं; और उसका ठीक विकास हो रहा है या नहीं।

सब बच्चों का ठीक ठीक विकास—बढ़ना-फूलना—एक ही तरह से दूध पिलाने से अश्वा एक ही प्रकार के भोजन से नहीं होता। किसी का विकास किसी तरह के भोजन से होता है और किसी का किसी तरह के भोजन से। इसलिए माता या डाई को अच्छी तरह यह देखते रहना चाहिए कि जो भोजन दिया जाता है, उससे बच्चे को किसी ग्रकार की हानि तो नहीं पहुँचती। उसे यह भी देखना चाहिए कि बच्चा कितनी बार पाखाना फिरता है, कितनी बार कैरता है आदि। ज्यों ही कोई असाधारण बात दिखलाई पड़े, त्यों ही उसमें सुधार करने का ठीक ठीक उपाय करना चाहिए।

यदि नीचे लिखे लक्षण दिखलाई पड़े, तो समझना चाहिए कि हाथ से दूध पिलाने में सफलता हो रही है—

(१) आरम्भ के छः महीनों से बच्चे का जैसा चाहिए, वैसा विकास होता रहे और वह तौश में प्रतिसंसाह चार या पाँच आठन्स बढ़ता रहे, और अपने बचपन के बाकी समय में वह प्रतिसंसाह तीन आठन्स बढ़ता रहे।

(२) उसमें अपच का कोई लक्षण न दिखलाई पड़े।

(३) दूध पीने के अन्तिम दिनों में उसे भोजन अच्छी तरह पचता रहे।

कुत्रिम रूप से दूध पिलाने का ढंग—इस प्रकार दूध पिलाने का ढंग अधिकतर बच्चे की अवस्था और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इन्ही दोनो बातों के अनुसार यह निश्चय किया जाता है कि बच्चे को कब और कितना दूध दिया जाया करे। परन्तु दूध पिलानेवाला व्यक्ति जितनी ही समझदारी से सब बातों पर ध्यान रखेगा, उसे उतनी ही अधिक सफलता होगी; और जितना ही कम ध्यान रखेगा, उतनी ही कम सफलता होगी। पर फिर भी यदि नीचे लिखी सूचनाओं का पालन किया जायगा तो अवश्य ही बहुत कुछ सफलता होगी।

(१) दो महीने की अवस्था तक दिन-रात में आठ बार दूध दिया जाय।

(२) तीसरे महीने में यह ध्यान रखा जाय कि जहाँ तक हो सके, चार चार घंटे बाद दूध दिया जाय।

(३) बच्चे के स्वास्थ्य और पाचन-शक्ति के अनुसार उसके पीने के दूध से कम या अधिक पानी मिलाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई ही निश्चित नियम नहीं बताया जा सकता। ग्रत्येक बच्चे की अवस्था का अलग अलग ध्यान रखना चाहिए और उसकी खास खास अवस्थाओं के अनुसार ही काम होना चाहिए। इस

सम्बन्ध में सबसे अच्छा और विश्वास के लायक रास्ता दिखानेवाला बच्चे का स्वास्थ्य ही है।

(५) प्रायः कठिनाइर्या इसी लिए उपस्थित होती है कि बच्चे के लिए भोजन ठीक तरह से नहीं तैयार किया जाता। इसलिए इस सम्बन्ध में जो जो बातें बतलाई जायें, उन सबका पूरा पूरा पालन होना चाहिए।

(६) स्त्री के दूध में तो किसी प्रकार के कीड़े आदि नहीं होते पर अधिकांश गौओं के दूध में कीड़े आदि बहुत अधिकता से होते हैं; इसलिए वह दूध पिलाने से पहले खूब अच्छी तरह उबाल लेना चाहिए।

(७) हर बार दूध पिलाने से पहले गरम कर लिया जाना चाहिए। यदि दूध पिलाने के लिए बोतल का न्यूवहार किया जाता हो तो पिलाने से पहले दूध-समेत वह बोतल गरम पानी में रख देनी चाहिए जिसमें उसके अन्दर का दूध गरम हो जाय।

(८) यदि बोतल में बच्चे के पीने से कुछ दूध बचा रह जाय, तो वह दूध देवारा पिलाने के लिए नहीं रख छोड़ना चाहिए।

(९) यदि बच्चे को दस्त आने लगे तो दूध पिलाना तुरन्त बन्द कर देना चाहिए और उसे थोड़ा सा रेडी का तेल देना चाहिए। इसी बीच में उसे थोड़ा सा उबालकर ठंडा किया हुआ पानी या अल्ब्यूमिन वाटर (Albumin Water) दिया जाना चाहिए। (अल्ब्यूमिन वाटर के लिए देखो परिशिष्ट।)

कुत्रिम रूप से दूध पिलाने की सम्भावित हानियाँ—
कुत्रिम रूप से दूध पिलाने के कारण जो जो हानिया हो सकती है, उनका माताओं के सदा ध्यान रखना चाहिए। यदि वे बीमारियाँ आदि पहचान न ली जायें और ठीक समय पर उन्हे दूर करने का प्रयत्न न किया तो वे घातक सिद्ध हो सकती हैं; या कम से कम थोड़े या अधिक समय के लिए उनसे बालक के स्वास्थ्य को हानि पहुँच सकती है।

(१) दूध का बुरा प्रभाव—ऐसी अवस्था में बच्चा अच्छा दूध भी नहीं पचा सकता, उसका विकास रुक जाता है और वह देखने में बिलकुल मरियलन्सा जान पड़ता है और पेट न भरने के कारण चराबर रोता रहता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि बच्चे को ऐसा ख़राब भोजन दिया जाता है जिसे वह पचा नहीं सकता अयवा जिससे उसका ठीक ठीक पोषण नहीं होता। बच्चे के शरीर के बढ़ते हुए मांसतन्तु या रेशो की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती और भोजन अपना बुरा प्रभाव आरम्भ कर देता है। ऐसे बच्चे प्रायः अपनी डॉगली या अँगूठा चूसा करते हैं। हमारे देश में इस प्रकार के भोजन के बुरे प्रभाव प्रायः देखने में आया करते हैं। अनजान माता-पिता उन्हे भूत-प्रेत या आसेब आदि का प्रभाव समझते हैं या इसी प्रकार के और सूखे विश्वासों में पढ़कर अनेक प्रकार के टोने टोटके या फाड़-फूँक आदि करते करते रहते हैं। इनका परिणाम प्रायः बहुत ही घातक हुआ करता है।

(२) रक्तविकार या खून की खराबी (Scurvy)—
कृत्रिम रूप से दूध पिलाने में दूसरा ढर बच्चे को रक्तविकार होने का रहता है। जिस बच्चे का खून खराब हो जाता है, उसका रक्त पीला पड़ जाता है, वह बहुत दुर्बल हो जाता है और उसके हाथ पैर आदि को छूते हुए भी ढर लगता है। यदि उसे ज़रा सा भी उठाया बैठाया जाय, तो वह रोने लगता है और प्रायः उसके हाथ-पैर सूज जाते हैं। इस अवस्था को दूर करने या इसे पहले से ही रोकने के लिए बच्चे को कृत्रिम रूप से दूध पिलाने के साथ ही साथ अँगूर या संतरे का थोड़ा थोड़ा रस भी देना चाहिए।

(३) रिकेट (Rickets)—यह एक तीसरी अवस्था है जिसमें बच्चा पीला और बेचैन दिखाहै देता है और रात के समय उसके सिर पर पसीना होता है। साथ ही उसे खासी और जुकाम भी होता रहता है, उसके दात निकलने में देर होती है, वह चलना-फिरना नहीं चाहता

और उसकी हड्डियों में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। यह रोग प्रायः यूरोप में अधिक होता है और हमारे देश में कम होता है। हमारे देश में इसके कम होने का कारण कदाचित् यही है कि यर्हा धूप बहुत होती है। यह दोष और कारणों से कम उत्पन्न होता है और ज्यादा करके इसी कारण होता है कि बच्चे को कृत्रिम रूप से जे दूध पिलाया जाता है, वह ठीक ढङ्ग से नहीं पिलाया जाता—दूषित ढङ्ग से पिलाया जाता है।

विटामिन (Vitamines)—डाक्टर याम्सन कहते हैं—“बरबर बढ़ते रहनेवाले क्षेत्रे बच्चे को भोजन में जवान आदमियों की अपेक्षा पोषक द्रव्यों (विटामिन) की बहुत अधिक आवश्यकता हुआ करती है। यदि बच्चे के भोजन में विटामिन का अंश कम हो, तो उसे अधिक हानि पहुँचती है। यदि उसके भोजन में विटामिन थोट्ट मात्रा में न हों, तो उसी समय अवश्य कुछ आगे चलकर बच्चे की बाढ़ बिलकुल रुक जाती है और रोगों का सामना करने की उसकी प्राकृतिक शक्ति अपेक्षाकृत बहुत घट जाती है। ये काल्पन चटपट नहीं दिखलाई पड़ते, क्योंकि ऐसा जान पड़ता है कि आवश्यकता के समय काम में जाने के लिए शरीर अपने मांसतनुओं या रेशों में विटामिनों का कुछ अंश एकत्र कर रखता है और उन विटामिनों के समाप्त होने से कुछ समय लगता है।

भिन्न भिन्न विटामिनों के न रहने से शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यदि और दृष्टियों से भोजन में साधारण पोषक द्रव्य हों, तो भी इन विटामिनों के अभाव के कारण शरीर की स्वास्थ्याविक बाढ़ रुक जाती है और समय पाकर उसकी सृत्यु हो जाती है। इससे रक्तविकार (Scurvy) या रिकेट्स (Rickets) आदि जो रोग होते हैं, वे अभावजन्य रोग (Deficiency Diseases) कहलाते हैं।

यदि खाद्य पदार्थों को साधारण से बहुत अधिक गरमी पहुँचाई जाय, उनमें जार आदि का योग दिया जाय, उन्हे कुछ समय तक डिल्फो

आदि मे बन्द रखा जाय या उनके साथ हर्सी-प्रकार की कुछ और क्रियाएँ की जायें तो उन खाद्य पदार्थों के मूल पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजारों से डिब्बों मे बन्द जो जमा हुआ दूध मिलता है, वह पहले गौ आदि के दूध को उड़ाकर और तब उसमे अनेक प्रकार के परिवर्तन और सुधार करने के बाद जमाया जाता है। हर्सी प्रकार चूर्ण आदि के रूप मे जो दूध मिलता है, वह भी या तो धीमी या तेज़ आच पर उड़ाकर महीन चूर्ण के रूप मे लाया जाता है। इन सभी दशाओं से उनमे के बे विटैमिन नष्ट हो जाते हैं जो बच्चे की ठीक ठीक वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं; और इसी लिए ऐसे दूध देने से बच्चों को रक्तविकार (Scurvy) या रिकेट्स (Rickets) आदि रोग हो जाते हैं।

जब बच्चे को गौ का ताजा दूध पिलाया जायगा, तब उसमे विटैमिनों के कम होने का उतना भय नहीं रहेगा। पर जब जब जमाये हुए या चूर्ण रूप मे लाये हुए दूध का व्यवहार किया जायगा, तब उससे बच्चे के बीमार होने का अवश्य ही भय रहेगा। यह विषय बहुत ही महत्व का है और समस्त संसार के बालकों के स्वास्थ्य का इससे बहुत अधिक सम्बन्ध है। हमारे यहाँ भारत मे गौ का ताजा दूध बहुत सहज मे मिल सकता है; इसलिए यदि यहाँ यह पश्चु इतना अधिक पवित्र माना जाता है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डिब्बो मे बन्द दूध एक तो यो ही महँगा पढ़ता है, दूसरे भारत-सरीखे दरिद्र देश मे उसका व्यवहार उपयुक्त हो ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त बच्चों के माता-पिता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज-कल लोग; ऐसे दूधों का बिना समझे-बूझे और किसी छाकटर का निश्चित परामर्श लिये जो व्यवहार करते हैं, उसमे बहुत सी ख़राबियां और डर हैं।

बनावटी भोजन के कारण जो ख़राबियां हो सकती हैं, उनका भय किसी अंश तक ताजे फलों के रस के व्यवहार से कम किया जा सकता है। ताजे फलों के रस मे एक विशेष प्रकार के विटैमिन होते-

है जिन्हें Anti-Scorbutic Principle कहते हैं। विशेषतः सन्तरे और नीबू में ये विटैमिन अधिकता से होते हैं। इसलिए जब कभी कुन्त्रिम भोजन के व्यवहार की आवश्यकता पड़े, तब उसके साथ ही साथ ताजे फलों का रस भी दिया जाना चाहिए।

फलों का रस तैयार करना—एक अच्छी ताजी नारङ्गी या सन्तरा खोकर उसका छिलका छील ढालना चाहिए और दबाकर उसका रस निकाल लेना चाहिए। जितना वह रस हो, उससे दूना उबाला हुआ पानी उसमें मिला देना चाहिए और मलामल के एक साफ़ टुकड़े से वह रस और पानी छान लेना चाहिए, जिसमें बच्चे को उसके बड़े बड़े टुकड़े न निगलने पड़े। तब उसमें थोड़ी सी चीनी मिला देनी चाहिए। बस अब यह रस काम में लाने के लिए तैयार हो गया। इसी तरह नारङ्गी या सन्तरे की जगह अंगूर, आम या नीबू का रस भी तैयार किया जा सकता है। पर हाँ, फल ऐसा तुनना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से मीठा हो।

चार महीने के बच्चे को इस रस का एक छोटा या चाय के ऐसा एक छोटे चम्मच देना आरम्भ करना चाहिए; और धीरे धीरे बढ़ाते हुए दो बड़े चम्मचों तक देना चाहिए। बच्चे को जब जब दूध पिलाना हो, तब तब पहले यह रस दे देना चाहिए।

गौ का दूध—बच्चों के लिए सबसे अच्छा और श्रेष्ठ दूध माता का होता है। इससे हमारा अनिप्राय स्तरों के दूध से है, फिर चाहे वह माता का हो या दाहूँ का। पर जब स्तरों का दूध नहीं अस्तित्व, तब उसकी जगह बच्चे को प्रायः गौ का ही दूध दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद यही सबसे अच्छा भोजन समझा जाता है और साथ ही सहज में मिल भी सकता है। केवल दूध ही एक ऐसा भोजन है जिसमें बच्चे के बढ़ने और प्राण-रक्षा के लिए सभी आवश्यक तत्व रहते हैं। बल्कि बड़े मनुष्योंके लिए भी यह एक सर्वों गपूर्ण भोजन है।

यदि बच्चे की अवस्था और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसे ठीक तरह से गौ का दूध दिया जायगा, तो अवश्य सफलता होगी। बच्चों

को जो अनेक प्रकार के रोग हुआ करते हैं, उनका एक मुख्य कारण यह है कि उन्हे पहले ही वर्ष गौ का दूध बिना समझे बूझे और अन्धाधुन्ध पिलाया जाता है। अधिकांश मातायें यही समझती है कि बच्चे को गौ का दूध देना बहुत ही साधारण बात है। परन्तु यह बात उतनी साधारण नहीं है जितनी ऊपर से देखने में जान पड़ती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। कुछ मातायें आरम्भ से ही बच्चे को गौ का खालिस और बिना पानी मिला हुआ दूध देने लगती हैं। कुछ माताएँ उसमें भिज्ञ मात्राओं से पानी मिलाती हैं और उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर बाकी सब बाटें संप्रोग पर छोड़ देती हैं। इन दोनों ही ढंगों में निश्चित रूप से विफलता होती है और थोड़े ही दिनों के बाद बच्चा बीमार पड़ने लगता है, क्योंकि इस प्रकार का दूध उसे अनुकूल नहीं पड़ता।

आगे की पंक्तियों में जो बातें बतलाई गई हैं, यदि उनका ध्यान-पूर्वक अध्ययन किया जायगा तो वे भूले नहीं होगी जो प्रायः गौ का दूध पिलाने में हुआ करती है।

नीचे दिये हुए नक्शे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें यह बतलाया गया है कि बच्चों को दिये जानेवाले भिज्ञ भिज्ञ दूध किन किन और कितने कितने तत्त्वों से बने हैं। इस नक्शे से भिज्ञ भिज्ञ दूधों का पारस्परिक अन्तर स्पष्ट हो जायगा।

भिज्ञ भिज्ञ दूधों के संयोजक तत्व

१०० मात्रों में पानी चरबी ग्रेटीन मिठास नमक
(१) मां का दूध ८७ ४८ ३ ७४ २ ०१ ६.३७ ०.३०
(२) गौ का दूध ८७ ८० ३ ४२ ३ ४० ४.७० ०.७१
(३) बकरी का दूध ८६ ८५ ४ ३४ ३ ७६ ३.७८ ०.६५
(४) मैस का दूध ८४ १० ७ १० ४ ०० ४ ०० ०.८०
(५) गधी का दूध ८७ ४८ ३ ७४ २ ०१ ६ ३७ ० ३०

अर्थात् मां के दूध और गौ के दूध में जो अन्तर है, वे अग्रलिखित इस प्रकार हैं—

पानी—यह दोनों में प्रायः समान ही है।

चरवियाँ—माँ के दूध में गौ के दूध की अपेक्षा यह कुछ अधिक होती है। मनुष्य के बच्चों के लिए गौ के दूध की चरवी पचाना अधिक कठिन होता है। उसे बच्चों के लिए उपयुक्त बनाने के बास्ते उसमें थोड़ा पानी मिलाने की आवश्यकता होती है।

प्रोटीन—माँ के दूध की अपेक्षा गौ के दूध में इसकी मात्रा लगभग दूनी है। इसलिए गौ के दूध में पानी मिलाना आवश्यक है, नहीं तो बच्चा उसे पचा न सकेगा।

मिठास या चीनी—मा के दूध में गौ के दूध की अपेक्षा यह प्रायः एक तिहाई अधिक होती है। अतः गौ के दूध को माता के दूध के प्रायः समान बनाने के लिए उसमें कुछ चीनी मिलाने की आवश्यकता होती है।

नमक—गौ के दूध में नमक की मात्रा प्रायः दूनी होती है।

गौ के दूध में कीटाणु होते हैं, पर माँ के दूध में कीटाणु विलकूल नहीं होते। गौ का दूध खटास लिये हुए होता है और मा के दूध में खारापन होता है।

भिज्ज भिज्ज संयोजक तत्त्वों का महत्त्व इस प्रकार है—

प्रोटीन—दूध में जो प्रोटीन होते हैं, उनसे बच्चों के शरीर की गठन बनती है।

दूध की मिठास या चीनी—इससे पुढ़ों में शक्ति आती है और सब अंग अच्छी तरह हिलने हुजने के योग्य होते हैं।

चरवियाँ—इनसे गरमी और शक्ति तो प्राप्त होती ही है, पर साथ ही स्नायुओं और मस्तिष्क का विकास भी होता है।

गौ का कच्चा दूध—बच्चे को गौ का कच्चा दूध कभी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने में बहुत सी वातों का ढर रहता है, क्योंकि सम्भव है कि उनमें कुछ कीटाणु विशेषतः ज्य, टाइफायट और

अपच के दस्त लानेवाले कीटाणु हो। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे को देने से पहले दूध ज़रा औटा लिया जाय। बाज़ार से लाया हुआ दूध तो खास कर और भी औटा लेना चाहिए। जिन लोगों के घर मे गौ हो, उन्हे भी यही उचित है कि बच्चे को पिलाने से पहले दूध कुछ गरम कर लिया करे। इसके सिवा जितने सहज मे उबाला हुआ दूध पचता है, उतने सहज मे बिना उबाला हुआ नहीं पचता।

दूध गरम करना—पहले दूध थोड़ी देर तक अर्थात् पांच से दस मिनट तक गरम करना चाहिए। ऐसा करने से उसमे के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध तभी तक गरम किया जाना चाहिए, जब तक उसमे चुल्हुके न उठने लगें। यदि गो का दूध अधिक समय तक उबाला जाता है तो उसके तत्त्वों मे कुछ विशेष परिवर्तन हो जाते हैं, जिनके कारण वह बच्चों के व्यवहार के योग्य नहीं रह जाता। गरम करने के बाद दूध जल्दी जल्दी और पूरी तरह से ढंडा कर लेना चाहिए, क्योंकि गरम दूध मे कीटाणु जल्दी बढ़ते हैं।

दूध की रक्षा—गरम करने के बाद दूध ढंडे स्थान मे रखना चाहिए, विशेषतः गरमी के दिनों मे उसे ढंडे स्थान मे रखने की और भी आवश्यकता होती है। दूध को धूल और मक्खियो आदि से खूब अच्छी तरह बचाना चाहिए, क्योंकि धूल और मक्खियो के द्वारा बहुत से रोगो के कीटाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं; विशेषतः उनके द्वारा वे कीटाणु और भी अधिक पहुँचते हैं जो बदहज़मी और टाइफायड उत्पन्न करते हैं। गरमी के दिनों मे यदि बच्चे के रहने के कमरे मे किसी उपयुक्त स्थान पर बरफ का एक छोटा सन्दूक रख दिया जाय तो उससे दूध को ताज़ा रखने मे बहुत सहायता मिलती है। यदि बरफ का सन्दूक न रखा जा सकता हो तो दूध का बरतन ढंडे पानी के किसी बड़े कटोरे मे रख देना चाहिए और उसे ऊपर से अच्छी तरह ढक देना चाहिए।

शुद्ध दूध—यह ठीक है कि आरम्भ में कुछ वच्चे शुद्ध दूध पीकर भी बहुत अच्छी तरह रहते हैं, पर शीघ्र ही ऐसा समय आ जाता है, जब वे वीमार पढ़ने लगते हैं। जो वच्चे ठीक समय से पहले ही उत्पन्न हुए हों अथवा नाजुक और कमज़ोर हों, उन्हें कभी गौ का खालिस दूध नहीं दिया जाना चाहिए। हरा जब वच्चा दस महीने का हो जाय, तब उसे खालिस दूध दिया जा सकता है।

गौ के दूध में पानी मिलाना—गौ के दूध में थोड़ा पानी इसलिए मिलाया जाता है कि जहाँ तक हो सके, वह माँ के दूध के समान हो जाय। गौ के दूध में एक ऐसा तत्व रहता है जिससे वह पेट में पहुँचते ही दही का रूप धारण करने लगता है। जहाँ तक हो सके, दूध को इस प्रकार दही बनने से रोकने के लिए ही गौ के दूध में पानी मिलाने की आवश्यकता होती है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं बतलाया जा सकता कि गौ के कितने दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए। इस सम्बन्ध में वच्चे के स्वास्थ्य और विशेषतः उसकी पाचन-शक्ति का ध्यान रखते हुए माता को दूध में पानी मिलाना चाहिए।

यदि वच्चा बलवान् और हृष्ट-सुष्ट हो और आगे लिखी मात्रा में पानी मिलाया हुआ दूध पचा सकता हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। पर यदि ऐसा न हो सके तो फिर जैसा अवसर पढ़े, उसके अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जब वच्चा तीन महीने का हो, तब माता को साधारणतः गौ के दूध में उसके बराबर ही पानी मिलाना चाहिए; और जब वह छः महीने का हो, तब दूध में आधा पानी मिलाकर ढेना चाहिए; और जब वह नौ महीने का हो तब दूध में एक तिहाई पानी मिलाना चाहिए। आठवें महीने के अन्त से लेकर दसवें महीने के अन्त तक पानी की मात्रा धीरे धीरे घटानी चाहिए। सब वच्चों की आवश्यकतायें अलग अलग हुआ करती हैं। एक मात्रा में पानी मिलाया हुआ दूध एक वच्चे को तो अनुकूल पड़ता है

और दूसरे को प्रतिकूल। तीन महीने की अवस्था में दूध में उतना ही पानी मिलाकर देना चाहिए और जन्म से आरम्भ करके धीरे धीरे इस अनुपात तक इस प्रकार पहुँचना चाहिए—

अवस्था	दूध	पानी
जन्मकाल में	...	१ भाग
एक सप्ताह	...	१ ...
एक मास	...	१ ...
दो मास	...	१ ...
तीन मास	...	१ ...

पानी की मात्रा किस प्रकार घटानी चाहिए—

आठवें महीने के अन्त से लेकर दसवें या बारहवें महीने के अन्त तक पानी की मात्रा धीरे धीरे इस प्रकार घटानी चाहिए कि अन्त में पानी की मात्रा उतनी ही कम रह जाय, जिसमें चीनी अच्छी तरह चुल सके।

दूध के घरेलू सुधार—माता घर में ही गौ के दूध में नीचे लिखे प्रकार से सुधार और परिवर्द्धन आदि कर सकती है।

सोडियम साइट्रेट (Sodium Citrate) मिलाना—

एक आठन्स दूध में दो ग्रेन सोडे का साइट्रेट (Sodium Citrate) मिलाने से दूध के दोष बहुत कुछ दूर हो जाते हैं और वह सुधर जाता है। जिस दूध में सोडियम साइट्रेट पड़ा रहता है, वह ख़राब नहीं होता और न उससे विसी प्रकार की हानि पहुँचती है। दूध या तो दही का रूप बिलकुल धारण करता ही नहीं; और यदि करता भी है तो बहुत देर से करता है; इसलिए वह दही बनने से पहले जल्दी ही पच जाता है।

बारली का पानी (Barley Water)—दूध को सुधारने का एक और उपाय यह है कि उसमें बारली या जौ का पानी मिला दिया जाय। इसका व्यवहार धीरे धीरे और अधिक अवस्था के बच्चों

के लिए किया जाता है। यदि दूध में सादे पानी की जगह यही बारती या जौ का पानी मिलाया जाय, तो कभी कभी और भी अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसके मेल से दूध जलदी पच जाता है। जौ का पानी दिन में दो बार तैयार किया जाना चाहिए; क्योंकि यदि वह एक बार बनाकर आरह छेटे से अधिक रखा जाय तो खट्टा हो जाता है। जौ का पानी तैयार करके बिना दूध में मिलाये ही अलग किसी ढंडे स्थान में रखा रहना चाहिए और केवल आवश्यकता के समय दूध में मिलाया जाना चाहिए। पर छेटे बच्चों के लिए यह पानी अधिक मात्रा में देना ठीक नहीं है, क्योंकि जौ में निशास्ते का भी अशा होता है।

बच्चे को गौ का दूध देने का भारतीय हंग—
बहुत ग्रामीन काल से भारत में यह प्रथा चली आती है कि मातायें अपने छेटे बच्चों को सीपी की सहायता से गौ का दूध पिलाती है। यह सीप नामक समुद्री जन्तु का ऊपरी ढकना होता है। यह किरती-जुमा अर्थात् नाव के आकार का होता है और इसका भीतरी तल देखने में सफेद, चिकना और चमकदार होता है। यदि कहीं ज़रा भी धूल, मिट्टी आदि हो, तो वह तुरन्त दिखाई पड़ जाती है और जलदी ही दूर की जा सकती है। सीपी बहुत सस्ती होती है और उसकी बनावट सीधी सादी होती है। इसमें एक और गुण यह होता है कि यह कढ़ी होती है और उतनी जलदी नहीं दूटती जितनी जलदी शीशा दूटता है। यह बहुत दिनों तक काम देती है और इसमें किसी प्रकार का रासायनिक या और कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि दूध में किसी प्रकार की ज़रा भी मैल आदि हो तो बच्चे को दूध पिलाने के समय माता उसे बहुत सहज में देख सकती है। सीपियाँ छोटी बड़ी अनेक आकारों की होती हैं, पर साधारण सीपी में प्रायः आध आठन्स दूध आता है। आज दिन तक प्रायः सारे देश में माताएँ बच्चों के सीपी के द्वारा ही दूध पिलाती हैं। चमच और दूध पिलाने की

बोतल से सीपी कई बातों में बहुत अच्छी होती है। माताओं को चाहिए कि वे सीपी से ही बच्चों को दूध पिलाया करे, उसकी जगह दूध पिलानेवाली बोतलों का व्यवहार न किया करे।

सीपी न हो तो माताये चमच की सहायता से बच्चों को दूध पिलाया करती है। आज-कल बच्चों को दूध पिलाने के लिए विशेष प्रकार की बनी हुई विलायती बोतलें आती हैं। उनका भी बहुत व्यवहार होता है। यहां यह बतलाया जाता है कि उनमें क्या क्या गुण और क्या क्या दोष होते हैं। हमारी पाठिकाएँ दोनों को व्यानपूर्वक समझ लें।

(१) दूध पिलाने की बोतल—बोतल की बनावट जहाँ तक हो सके, बिलकुल सीधी सादी होनी चाहिए। जो बोतल आकार में बिलकुल सीधी हो और जिसमें कोण आदि न हो, वही सबसे अच्छी होती है; क्योंकि अन्दर के केनों को बुख्श आदि की सहायता से साफ़ करना बहुत कठिन होता है। बाज़ार में जो और अनेक प्रकार की बोतलें मिलती हैं, उनकी अपेक्षा वे बोतले बहुत अच्छी होती हैं जिनका आकार किसी या नाव का सा अवयव बिलकुल गोल होता है।

(२) बोतल ऐसी होनी चाहिए जिसमें द से १० आउन्स तक दूध आ सके और उसमें आधे आधे आउन्स का निशान लगा होना चाहिए।

(३) उसमें रबर की कोई नली नहीं लगी होनी चाहिए। जिन बोतलों में रबर की लम्बी नलिया लगी होती है, वे स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होती हैं।

(४) बोतल ऐसी होनी चाहिए जो दोनों ओर से खुल सके और जिसमें एक और से दूसरी ओर तफ पानी बहा कर अच्छी तरह सफाई की जा सके।

(५) उसका गला इतना चौड़ा होना चाहिए कि वह अन्दर से खूब अच्छी तरह साफ़ किया जा सके।

(६) सदा दो बोतलें रखनी चाहिए और दोनों का पारी पारी से व्यवहार होना चाहिए।

(७) रबर की घुँड़ी—यह सादी और कोशाकार या लम्बो-तरी होनी चाहिए। यह बोतल की गरदन पर ठीक तरह से बैठ जानी चाहिए और इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि सहज में उलटी जा सके।

(८) यह ऐसी होनी चाहिए जो बोतल के सुँह पर ठीक तरह से और सहज में बैठाई जा सके और उसे किसी दूसरी चीज़ से कसने या बांधने आदि की आवश्यकता न पड़े।

(९) इस घुँड़ी का छेद इतना बड़ा होना चाहिए कि यदि बोतल उलटी कर दी जाय तो उसमें से प्रति सेकेंड एक लूँद के हिसाब से दूध गिर सके। छेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसमें से दूध की धारा ही वह निकले। यह बात बहुत ही महत्व की है; क्योंकि यदि उसमें से दूध की धारा वह निकलेगी तो बच्चे के जलदी जलदी दूध पीने के कारण उसे बदहज़मी हो जायगी। यदि बच्चा भूखा हो और बोतल से जलदी जलदी दूध पीने लगे तो उसका पेट अफर जायगा और इससे वह कैंसी करने लग सकता है। युक बार में बच्चे को जितना दूध पीना चाहिए, यदि वह उतना न पीकर उससे कुछ कम पीए, तो उसे ज़बरदस्ती बाकी दूध पिलाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य और भूख में समय समय पर जो अन्तर पड़ा करते हैं, उनका सदा ध्यान रखना चाहिए।

(१०) छेद बहुत छोटा भी न होना चाहिए; नहीं तो कमज़ोर बच्चा जलदी थक जायगा और बिना पेट भरे ही दूध पीना छोड़ देगा।

(११) रबर की घुँड़ी थोड़े थोड़े समय पर बदल दी जानी चाहिए और एक साथ बहुत सी घुँड़ियाँ मँगाकर रख लेनी चाहिएँ। रबर की घुँड़ी में प्रायः जगह जगह दरारें पड़ जाया करती है और तब उन्हें अच्छी तरह साफ़ करना असम्भव हो जाता है। उनमें के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए उन्हें गरम पानी में छोड़कर उबाल लेना आवश्यक है।

बोतल साफ़ करना—यदि बोतल ठीक तरह से साफ़ न की जाय तो उसमे रखा हुआ दूध गन्दा और सूराब हो जायगा जिससे बच्चे को ऐसे उसे आने लगेंगे जो किसी समय धातक भी हो सकते हैं। जब बोतल दूध से खाली हो जाय, तब उसे पहले अच्छी तरह ठंडे पानी से और तब गरम पानी से धो डालना चाहिए। विशेषतः गरमी के दिनों मे तो ऐसा करना और भी आवश्यक होता है। बोतल को अच्छी तरह धोने के लिए सोडा बाइर्क (Soda bicarb) और एक बुखरा की बहुत ज़खरत होती है। इसके बाद उसे साफ़ पानी से खूब अच्छी तरह धो लेना चाहिए। बोतल उलटी करके रख देनी चाहिए और अच्छी तरह सुखा लेनी चाहिए। वह इतनी साफ़ होनी चाहिए कि यदि रेशानी में रखकर देखी जाय तो उसमें कुछ भी धुँधलापन न दिखाई पड़े। काम मे लाने से पहले बोतल फिर गरम पानी से धो लेनी चाहिए। काम मे लाने से पहले भी और बाद भी रबर की धुंडी खौलते हुए पानी मे डालकर साफ़ कर लेनी चाहिए। बुखरा किसी साफ़ जगह में टैंगा रहना चाहिए और उस पर मैंक या धूल आदि नहीं बैठने देनी चाहिए।

बोतल का व्यवहार—छाती से दूध पिलाने की अपेक्षा बोतल से दूध पिलाने मे नियमित रूप से और ठीक समय पर पिलाने का और भी अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। दिन के समय ठीक चार घंटे पर और रात के समय छँदँ छँदँ पर दूध पिलाना चाहिए।

जो दूध अधिक समय तक बोतल में रखा रहा हो, वह कभी बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए।

बच्चे को कभी स्थाली बोतल की धुंडी या और किसी प्रकार की चूसनी नहीं चूसने देना चाहिए। ग्रायः मातायें अपने बच्चों को शान्त रखने के लिए उनके हाथ में स्थाली बोतल या चूसनी दे दिया करती हैं। यह ठीक नहीं है। इससे बच्चों को एक बुरी आदत पढ़ जाती है।

(१) दोष—जो बच्चे आरम्भ से ही बोतल की सहायता से दूध पीते हैं, उनके सम्बन्ध में पहले दो महीने तक माता-पिता को बहुत चिन्ता रहती है, क्योंकि ऐसे बच्चे प्रायः बीमार पड़ा करते हैं। बोतल को ठीक तरह से साफ़ करने में भी उन्हें बहुत कठिनता और कष्ट होता है।

(२) जिन दिनों बच्चे को दांत निकलने लगते हैं, उन दिनों भी बोतल से दूध पिलाने में कई ख़राबिया होती हैं।

(३) बच्चे को चमच या सीपी की सहायता से दूध पिलाने का जो सीधा सादा ढंग है, उसकी अपेक्षा बोतल से दूध पिलाने में ख़र्च भी अधिक होता है।

बोतल से दूध पिलाने में तो बहुत सी छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पर सीपी या चमच से दूध पिलाने में ये कठिनाइयाँ नहीं होतीं। बोतल से दूध पिलाने में बच्चे के लिए बहुत सी जोखिमें भी होती हैं; इसलिए माता को इस सम्बन्ध के सब काम बहुत सावधानी के साथ करने चाहिएँ। यदि माता खूब सतर्क रहे और पूरी सावधानी से काम ले, तो यह जोखिम बहुत कुछ कम हो जाती है। परं किर भी जोखिम को पूरी तरह से बचाना प्रायः असम्भव ही है।

(१) बोतल से दूध पिलाने का ढंग—माता को चाहिए कि जमीन पर बैठकर बच्चे को ठीक उसी प्रकार अपनी गोद में रख के जिस प्रकार उसे स्तन से दूध पिलाने के समय सेकर बैठती है।

(२) उस पर बतना ही ध्यान दे जितना कि स्तनों से दूध पिलाने के समय दिया जाता है।

(३) दूध गरम होना चाहिए और बोतल कुछ इस प्रकार सुकी रहनी चाहिए जिसमें उसकी गरदन और आगे की घुंडी दूध से भरी रहे।

(४) अधिक से अधिक पन्द्रह या बीस मिनट तक बोतल से दूध पिलाना चाहिए।

(५) दूध पिलाते समय बीच में तीन या चार बार बच्चे के मुँह के पास से बोतल हटा लेनी चाहिए जिसमें वह बहुत जलदी जलदी दूध न पी सके। .

(६) दूध पिला चुकने के बाद बोतल साफ़ कर लेनी चाहिए।

(७) जब दूध पिलाने का समय आवें, तब बच्चे को जगा लेना चाहिए और दूध पिलाने के बाद फिर उसे विस्तर पर लिटा देना चाहिए।

दूध की मात्रा—साधारणतः बच्चे की भूख पर ही दूध की मात्रा छोड़ दी जाती है। उसे जितनी भूख होती है, वह उतना दूध पी लेता है। पर शर्त यह है कि बच्चा खूब तन्हुरक्त हो। इसका फल बहुत ही सन्तोषजनक होता है। पर यह भी देखा जाता है कि बहुत से बच्चों का इस तरह से अच्छा पोषण और बढ़न नहीं होता; क्योंकि साधारणतः उन्हें कम दूध मिलता है; और कभी कभी वे अधिक दूध पी लेने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। दूध की मात्रा हर एक बच्चे की उमर और आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। साधारणतः लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक दूध पीती हैं।

यद्यपि दूध की मात्रा के सम्बन्ध में सबसे अच्छी बात यह है कि हर बार बच्चे को उतना ही दूध दिया जाय, जितनी उसे भूख हो, तो भी उसे कभी उसकी आवश्यकता से अधिक दूध पीने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए और न उसके पेट भरने से पहले उसके आगे से बोतल ही हटानी चाहिए। जन्म के समय बच्चे का पेट प्रायः एक आउन्स से और दो महीने की उमर में प्रायः दो आउन्स से भर जाता है। इस प्रकार छः महीने की आवस्था तक हर महीने प्रायः एक आउन्स की वृद्धि होती जाती है। हर महीने के अन्त में दूध की मात्रा अचानक नहीं बढ़ा देनी चाहिए। वह सदा धीरे धीरे और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाइ जानी चाहिए। इसका अच्छा उपाय यही है कि धीरे धीरे एक छोटा या चाय का चमच भर दूध बढ़ाते जाना चाहिए। यदि

अचानक दूध की मात्रा अधिक बढ़ा दी जायगी तो उससे बच्चे को कष्ट होगा। अगर बच्चे का बज़ुन वरावर अच्छी तरह बढ़ता चलता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। इसके विरुद्ध यदि हर सप्ताह उसका बज़ुन न बढ़ता हो तो उसे अधिक मात्रा में दूध देने की आवश्यकता होती है।

दिन रात में जितनी बार और जितने समय के अन्तर पर बच्चे को छाती से दूध पिलाया जाना चाहिए, उतनी ही बार और उतने ही अन्तर पर बोतल से भी दूध पिलाना चाहिए। अर्थात् दिन में चार बार घंटे पर और रात में छः छः घंटे पर दूध पिलाना चाहिए।

दूध में चीनी—गौ के दूध में छी के दूध की अपेक्षा कम मिठास होती है। इसलिए गौ के दूध में थोड़ी चीनी मिलानी चाहिए। लेकिन चीनी भी बहुत अधिक नहीं देनी चाहिए। नहीं तो उससे पेट में बायु उत्पन्न होगी, दरड होने लगेगा और दस्त आने लगेंगे।

गौ का दूध पीनेवाले बच्चों के लिए फलों के रस की आवश्यकता—जिन बच्चों को गौ का दूध पिलाया जाता हो, उन्हें थोड़ा फल का रस देना भी अच्छा होता है। इसमें सन्तरे, अंगूर, आम या नीबू का रस दिया जा सकता है। जब बच्चा चार महीने का हो जाय, तब उसे फल का रस देना आरम्भ करना चाहिए।

माता को रस के लिए वही फल चुनना चाहिए जो बच्चे को सबसे अधिक अनुकूल पड़ता हो। पहले उबालकर उठे किये हुए पानी में उस पन्द्रह बूँद रस मिलाकर बच्चे को देना चाहिए और ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि बच्चे पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को खासी आती हो तो फल का रस नहीं देना चाहिए; क्योंकि फल के रस से और विशेषतः खट्टे फल के रस से खासी और भी बढ़ जाती है। छः महीने तक रस की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर चाय के छोटे ढो चम्मच भर कर देनी चाहिए।

गौ का दूध अधिक पिला देना—जपर यह बताया जा सकता है कि यदि स्तन से बच्चे को अधिक दूध पिला दिया जाय तो उसे अपचंय या बदहजमी हो जाती है। गौ का दूध आवश्यकता से अधिक पिला देना और भी बुरा है। इससे बच्चे के पेट में बहुत वायु भर जाती है और वह बहुत देर तक दरद के मारे रोया करता है। जिन बच्चों को कृत्रिम रूप से दूध पिलाया जाता हो, वे यदि रोयें, चिल्कायें या हठ करें तो यह नहीं समझना चाहिए कि वे भूखे हैं, बल्कि यह समझना चाहिए कि उन्हें बदहजमी हो गई है। यदि दूध पीने के बाद तुरन्त ही अथवा दूसरी बार दूध पीने के समय से कुछ ही पहले ऐसा बच्चा रोने लगे तो उसके रोने का कारण भूख हो सकती है। इसलिए बच्चे को गौ का दूध कभी अधिक नहीं पिलाना चाहिए। यह एक नियम सा है कि एक बरस के बच्चे को एक क्वार्ट (Quart) से अधिक दूध की आवश्यकता नहीं होती।

गौ का दूध सफलतापूर्वक पिलाना—जो बच्चा अच्छी तरह बढ़ता रहता है, वह सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट रहता है। वह रात भर और अधिकतर दिन में भी बराबर आराम से सोता रहता है। वह कभी बेचैन नहीं होता। वह हर बार पन्द्रह मिनट में दूध पी जेता है और दिन रात में एक से तीन बार तक मल त्याग करता है। उसका मल भी साधारण हुआ करता है।

दूध पिलाने में विफलता—जब बच्चे में अपचंय के लक्षण दिखाई पड़े अर्थात् वह अधिक रोया करे, बार बार मल त्याग करे, कैरे और तौल में न बढ़े तो समझना चाहिए कि गौ का दूध पिलाने में सफलता नहीं हो रही है।

गौओं को रक्षापूर्वक रखना—जिस प्रकार माता के खान पान, परिस्थिति और मनोविकारों आदि के कारण माता के स्तन के दूध में अन्तर पड़ता रहता है और स्तनों के दूध से भरे रहने या खाली रहने के

कारण अन्तर पढ़ता रहता है, उसी प्रकार गौ के स्थारे, परिस्थिति और नसल आदि के कारण भी उसके दूध में समय समय पर अन्तर पढ़ता रहता है। बाजार में जो रही और ख़राब दूध मिलता है, वह दूध पिलाने के कारण भी बच्चों को बहुत सी बीमारिया हो जाया करती है। विशेषतः जो बच्चे बड़े बड़े शहरों में पलाने हैं, उनके सम्बन्ध में तो यह बात और भी टीक घटती है। आज-कल भारत में बच्चों को जो बहुत अधिक ज्यय या टाइफायड आदि रोग होते हुए देखे जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण बाजारों में मिलनेवाला दूध और विशेषतः गरमी के दिनों में मिलनेवाला दूध है। यह दस्तूर सा है कि दूध बड़े बड़े बरतनों में हुहा जाता है, उन्हीं बरतनों में बहुत दूर तक ले जाया जाता है और बहुत से हाथों से गुज़रने के बाद वह बच्चे को पीने के लिए मिलता है। गौ को हुहने से ही दूध में बहुत कुछ गम्दगी आ जाती है। दूध में कुछ तो गौ के शरीर की मैल आदि उतर आती है और कुछ हुहनेवाले के हाथों की मैल मिल जाती है। दूध के बरतन प्रायः ऐसे पानी से धोये जाते हैं जिनमें अनेक प्रकार के कीटाणु भरे होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों के पास जो दूध पहुँचता है, वह इस देश में ज्यय-रोग के फैलने का एक बहुत बड़ा कारण है। म्युनिसिपैलिटियों को उचित है कि वे स्वास्थ्यविभाग के द्वारा इस बात को रोकने का प्रयत्न करें और इस बात पर विशेष ध्यान दें कि दूध अधिक स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में हुहा और बेचा जाया करे। इन अवस्थाओं में सुधार करने के लिए पशु-चिकित्सा-शास्त्र के जाननेवालों के ज्ञान और दुष्क्रिय का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्यविभाग को उचित है कि वह गौओं के रहने के स्थानों का निरीक्षण करे, पशुओं की जांच करे, दूध बिकने के स्थानों की स्वच्छता पर ध्यान रखे और जिन स्थानों में दूध हुहा या बेचा जाता हो, उन पर पूरी पूरी निगरानी रखे जिसमें वहाँ की गम्दगी और दोषों के कारण लोगों का स्वास्थ्य न नष्ट हो।

जिस पशु का दूध दुहा जाता हो, वह स्वस्थ और नीरोग होना चाहिए। वह जिस स्थान से रखा जाय, वह स्थान बहुत खुलासा होना चाहिए और उसमें खूब हवा और रोशनी आनी चाहिए। गौशाला की ज़मीन पक्की और अच्छी दशा में होनी चाहिए और उसमें बहुत काफी सफाई होनी चाहिए। दूध दुहनेवाले लकड़-रोग से ग्रस्त नहीं होने चाहिए। यदि उनके परिवार से किसी को टाइफाईड हो तो उन्हें कुछ दिनों के लिए काम से हटा देना चाहिए। जिस दूकान में दूध बिकता हो, वहाँ खूब अच्छी तरह रोशनी और हवा आनी चाहिए और बहुत सफाई रहनी चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गौ का दूध दुहा जाने के समय से ले कर पीने के समय तक अनेक ऐसी परिस्थितियों में रहता है जिनके कारण दूध में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। जो दूध बच्चों का पिलाया जाता हो, उसकी इन सब परिवर्तनों से रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक दूध की रक्षा के लिए स्वास्थ्य-सम्बन्धी सभी भिन्न भिन्न सिद्धान्तों का ठीक तरह से पालन न किया जायगा, तब तक देश में और विशेषतः बड़े बड़े नगरों में लकड़-रोग का प्रसार ठीक तरह से नहीं रोका जा सकता।

बकरी का दूध—कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गौ का दूध कितना ही सुधार कर कशों न दिगा जाय, पर फिर भी वे अच्छी तरह नहीं बढ़ते। ऐसी अवस्था में बकरी का दूध सहज में पच सकता है। और चाहे जो हो, पर वह हिंड्बो में आनेवाले और दूसरे अनेक प्रकार के पेटेण्ट दूधों की अपेक्षा फिर भी अच्छा ही होता है। बकरी का दूध बहुत कुछ मां के दूध से मिलता-जुलता होता है। यह ठीक है कि उसमें गौ के दूध की अपेक्षा कम और मां के दूध की अपेक्षा और भी कम मिठास या चीनी होती है, पर उसमें चरबियाँ। और सनिभ, तेजाब आदि प्रायः उतनी ही मात्रा में होते हैं जितनी मात्रा में मां के दूध में होते हैं और दोनों में चार का अंश होता है। पर गौ या भैंस के दूध में तेजाब या खटास होती है।

गौच्रों को तो च्युथ-रोग होता है, पर बकरियों को नहीं होता। कुछ लोग माल्टा ज्वर (Malta ague) के भय से बकरी का दूध नहीं पीते; पर उनमें उतना अधिक भय नहीं है जितना लोग समझते हैं। फिर माल्टा ज्वर का परिणाम उतना भयंकर नहीं होता जितना भयंकर च्युथ-रोग का परिणाम होता है; और यदि बकरी की अच्छी तरह देख-रेख की जाय, तो माल्टा ज्वर का भय बहुत कम हो सकता है। गौच्रों के कारण च्युथ-रोग नो बहुत फैलता है, पर बकरियों के कारण माल्टा ज्वर मे पीड़ित होनेवाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है।

बकरी रखने के लिए बहुत अधिक स्थान की भी आवश्यकता नहीं होती आँर उमे खिलाने-पिलाने मे गां की अपेक्षा लंबे भी कम पड़ता है। बकरी बहुत ही गान्त, सीधी-मादी आँर निशीह होती है; इसलिए बच्चे उसे अधिक पसन्द भी करते हैं। उमकी देख-रेख के लिए भी किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई आदमी उमके लिए नित्य उम मिनट का भी समय निया करे, तो उसे खिला पिला भी भक्ता है आँर दुह भी सकता है। घर के किसी कोने मे बकरी बाधी जा भक्ती है आँर उमके कारण दूमगों को बहुत ही कम कष्ट होना है। यदि लोग बाजार का दूध लंबीदून की अपेक्षा बकरी पाल करे तो बहुत ही अच्छा है। आँर बहुत ये लोग पूसे होने हैं जो गां तो नहीं पाल सकते, पर बकरी सहज मे पाल भक्ते हैं।

यूगेप में आँर विशेषत: इटली, स्विजरलैंड, फ्रान्स आँर जर्मनी मे लोग बकरिया बहुत पालते हैं। जिन बच्चों को उनका दूध दिया जाता है, उनमे से बहुत से बच्चे बहुत अच्छी तरह बढ़ते हैं। किसी समय भारत मे भी लोग बहुत बकरिया पालते थे, पर अब यह बात कम हो रही है; क्योंकि प्रायः लोग बकरी पालना छोटा काम समझते हैं। बकरी बहुत माफ़ पश्चु है आँर प्रायः च्युथ-रोग तो उसे होता ही नहीं। बकरी का भोजन भी ऐसा बैसा नहीं होता जिससे हानि की सम्भावना हो।

पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हे यदि बकरी खा ले, तो उसके दूध पर उनका प्रभाव पड़ता है; और दूध से वह बुरा प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए जिन दिनों बकरी का दूध पीया जाता हो, उन दिनों उसे इधर-उधर नहीं घूमने देना चाहिए।

कुछ ऐसी अवस्थाएँ हैं जिनमें बकरी के दूध का व्यवहार अधिक अच्छा और उपयुक्त होता है। वे अवस्थाएँ इस प्रकार हैं—

(१) जब गौ का दूध अनुकूल न पड़ता हो।

(२) जब गौ का दूध पीनेवाले बच्चे का वज़न दिन पर दिन बढ़ता जाता हो।

(३) जब बच्चा दिन पर दिन दुर्बल होता जाता हो और सूखता जाता हो, तब बकरी का दूध अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। जिन बच्चों में ज्यय-रोग के कुछ लक्षण दिखाईं पड़ते हों, उनके लिए यह अधिक लाभदायक होता है; और जिन बच्चों को ज्यय-रोग होने का भय हो अर्थात् जो बच्चे ऐसे परिवार में उत्पन्न हुए हों जिसमें किसी को ज्यय-रोग हो चुका हो, तो इसके व्यवहार से उन बच्चों की ज्यय-रोग से रक्षा होती है।

गधी का दूध—जिन बच्चों को गौ का दूध अनुकूल नहीं पड़ता, उनके लिए कभी कभी गधी का दूध बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। वह कुछ रेचक होता है, इसलिए स्वस्थ और नीरोग बच्चों के लिए वह उपयुक्त नहीं होता। उसके संयोजक तत्व भी प्रायः वे ही होते हैं जो मां के दूध के होते हैं, पर उसमें पोषक गुण कम होता है।

बकरी की तरह गधी को भी ज्यय-रोग नहीं होता, इसलिए इन जानवरों का दूध बिना उबाला और कच्चा भी पीया जा सकता है।

जमा हुआ दूध—बाज़ारों में जो जमा हुआ दूध मिलता है, वह गौ के दूध को उड़ाकर तैयार किया जाता है और जमाने से पहले उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आये किये जाते हैं। कुछ कार-ख़ानेवाले तो इसे अधिक दिनों तक रहित रखने के लिए उसमें

चीनी मिलाते हैं, पर कुछ लोग चीनी नहीं मिलाते। मीठे जमाये हुए दूधों में नेसल का दूध (Nestle's Milk) अधिक प्रसिद्ध है। जो बच्चे ठीक तरह से दूध न दिये जाने के कारण गौ का दूध नहीं पचा सकते और इस कारण रोगी और दुबले हो जाते हैं, उन्हें यह दूध दिया जाता है। जब इसका व्यवहार बहुत अधिक समय तक किया जाता है, तब इससे बच्चों का ठीक तरह से पोषण होना रुक जाता है; और उसमें जो चीनी मिली हुई होती है, उसके कारण बच्चों को कुछ अधिक पाखाने आने लगते हैं। जितना पानी उसमें मिलाना चाहिए, यदि उससे अधिक पानी मिलाकर बच्चों को दिया जाय तो उसका पोषक गुण अवश्य ही बहुत कुछ घट जाता है।

जिन चीनीबाले दूध—इस प्रकार के दूधों का ढाम अधिक होता है; और एक बार जब इनका दिल्ला खुल जाता है, तब ये दूध भी प्रायः उतनी ही देर तक अच्छी दशा में रह सकते हैं जितनी देर तक साधारण गौ का दूध रहता है। उससे अधिक नहीं ठहरते। इसलिए चौबीस घंटों के बाद बच्चों के लिए उनका व्यवहार ठीक नहीं होता।

जिन बच्चों को जमाया हुआ दूध दिया जाता है, वे प्रायः मोटे तो होते हैं, पर उनमें बल कम होता है; वे यों ही फूले हुए होते हैं और रोगों का अच्छी तरह सामना नहीं कर सकते—रोग उन्हे जल्दी डबा लेते हैं। यदि उन्हें कभी दस्त आवि छिड़ जाते हैं, तो उनके बल और तौल में घातक रूप से कमी होने लगती है। इसलिए बहुत अधिक दिनों तक ऐसा दूध देना ठीक नहीं है।

जमाया हुआ दूध केवल वहीं काम में लाना चाहिए जर्हा गौ का ताजा दूध न मिल सकता है। जमाया हुआ दूध जब काम में लाना हो, तब उसमें उबाला हुआ पानी मिलाना चाहिए।

खुशक या सुखाया हुआ दूध—इसे तैयार करने के लिए पहले गौ के दूध को हलकी अथवा बहुत तेज़ आच पर पकाते हैं और

उसे महीन चूर्ण के रूप में बना लेते हैं। उसे फिर तरल रूप में लाने के लिए उसमें कुछ पानी मिलाना पड़ता है। इस देश में इस प्रकार के जिस दूध का अधिक व्यवहार होता है, वह ग्लैक्सो (Glosso) कहलाता है। यह मशीनों की सहायता से महीन चूर्ण के रूप में लाया जाता है और इसे पकाने के समय ज़रूरी तौर पर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं; इसलिये गौ के ताजे दूध के मुकाबले में यह कभी अच्छा नहीं ठहर सकता। जहा गौ का ताजा दूध न मिलता हो अथवा मिलने पर भी बच्चे को अनुकूल न पड़ता हो, वहां कभी कभी इसका व्यवहार लाभदायक होता है। इसका व्यवहार केवल कठिन अवसरों पर अस्थायी रूप से होना चाहिए। यदि इसका व्यवहार अधिक दिनों तक किया जायगा, तो इससे बच्चे को ऐसे रोग हो जायेंगे जो उनका ढीक तरह से पोषण न होने के कारण होते हैं।

निशास्तेवाले भोजन—जब तक बच्चा नौ महीने का न हो जाय, तब तक वह निशास्ता नहीं पचा सकता। इससे पहले बच्चे के लिए निशास्तेवाली चीज़ों के व्यवहार का विधान करना बड़ी भारी भूल है। इस प्रकार के भोजन गौ के दूध से तैयार किये जाते हैं और उनमें पहले से पचाया हुआ विशास्ता मिलाया जाता है। व्यवहार में खाने के समय उसमें केवल पानी मिलाने की आवश्यकता होती है और उसमें दूध नहीं मिलाया जाता। इस प्रकार का एक ऐसा दूध आता है जिसमें विशास्ता पहले से पूर्ण अथवा आशिक रूप में पचाया हुआ होता है। पर इस प्रकार के दूध में दूध और पानी दोनों मिलाने की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार के भोजनों का व्यवहार तभी करना चाहिए जब बच्चे की माता का दूध कुड़ा दिया गया हो और जब डाक्टर यह सताह दे कि अब इसे निशास्ता देने में कोई हज़ेर नहीं है। रोटी, अरारोट, साबुदाना, बिस्कुट और इसी प्रकार के दूसरे भोजनों में भी निशास्ता होता है; इसलिये जब तक बच्चे के दात न निकल आवे, तब तक

उन्हें ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए। जब बच्चे के पात्रता करनेवाले अंग अच्छी तरह बढ़कर विकसित हो जायें, तब इस प्रकार के भोजन लाभदायक हो सकते हैं। जिन बच्चों के नौ महीने की अवस्था से पहले ही निशास्तेवाले भोजन दिये जाते हैं, उन्हे अनेक प्रकार की हानियाँ पहुँचती हैं। जब बच्चे के दाँत इस योग्य हो जायें कि दूध के सिवा डोस पदार्थ भी चाचा सकें, तब भी दूध छुड़ाने के बाद उन्हे एक-एक निशास्तेवाला भोजन देना ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे ही शारीरिक दृष्टि से निशास्तेवाली चीज़ें साने के योग्य होता है।

बच्चों के लिए पेटेण्ट भोजन—आज-कल शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पेटेण्ट भोजनों का बहुत अधिक व्यवहार किया जाता है। पर पाठिकाश्चों को इनके सम्बन्ध में कुछ सचेत कर देना आवश्यक है, क्योंकि इनके व्यवहार से बच्चों में रोगों का सामना करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है और उन्हे अनेक प्रकार के रोग आ घरते हैं। इनके विज्ञापन लोगों को अम में ढाल देते हैं। इनके सम्बन्ध में प्रायः यह कहा जाता है कि ये बहुत ही उपयोगी होते हैं और सब जगह समान रूप से इनका व्यवहार किया जा सकता है। पर वास्तव में यह बात बहुत बढ़ाकर कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस प्रकार के भोजन माता के दूध के स्थान पर उसका पूरा पूरा काम देते हैं। पर यह बात भी ठीक नहीं है। वास्तव में इस प्रकार के भोजन अपने स्वरूप और रचना दोनों में माता के दूध से बहुत ही भिन्न होते हैं। इसके सिवा इस प्रकार के पेटेण्ट भोजनों का मूल्य भी बहुत अधिक होता है। भारत-सरीखे देश में जहाँ गौ का ताज़ा दूध सहज में मिल सकता हो, इस प्रकार के दिक्षें में बन्द भोजनों का व्यवहार करना बहुत ही छुरा है।

साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई एक प्रकार का पेटेण्ट भोजन किसी एक बच्चे के लिए लाभदायक होता हो,

तो यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि और बच्चों के लिए भी वह उसी प्रकार सामदायक हो। जिन बच्चों का पालन इस प्रकार के भोजनों से होता है, उनमें से अधिकांश आगे चलकर दुख भोगते हैं। लगातार अधिक समय तक इस प्रकार के भोजनों का व्यवहार करने से रक्तविकार (Scurvy) और रिकेट्स (Rickets) आदि वे रोग हो जाते हैं जिनका मूल उचित वोषण का अभाव होता है। ये रोग बहुत कठिनता से अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे इस प्रकार के भोजनों के व्यवहार से मोटे ताजे और फूले हुए दिखाई पड़ते हैं। पर उनका ऊपर से दिखाई पड़नेवाला यह स्वास्थ्य घोस्ता होता है, असली नहीं होता। वे देखने में इसी लिए मोटे जान पड़ते हैं कि डिब्बों में बन्द जो भोजन आते हैं, उनमें चीनी होती है। ऊपर से उन्हें देखने में तो ऐसा जान पड़ता है कि इनमें रोगों का सामना करने की यथेष्ट शक्ति है, पर वास्तव में उनमें वह शक्ति बहुत ही कम होती है। यदि उन्हें कभी मारी बदहज्जमी हो जाय जिससे उन्हें दस्त और कैं आने लगे या न्यूमोनिया सरीखे और रोग हो जायें, तो माता का दूध पीनेवाले बच्चों की अपेक्षा ऐसे बच्चों के जल्दी मरने का भय रहता है। इसलिए बिना अच्छी तरह समझे बूझे इस प्रकार के पेटेण्ट भोजनों का कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए; और जब बच्चे को इस प्रकार का कोई पेटेण्ट भोजन दिया जाय, तब खूब ध्यानपूर्वक यह देखते रहना चाहिए कि वह कहीं तक बढ़ता और उक्ति करता है।

बच्चों के लिए पेटेण्ट भोजनों का उपयोग—ऐसे भोजनों का उसी दशा में उपयोग हो सकता है जब गौ का ताजा दूध न मिल सकता हो और बच्चे को और सभी प्रकार से ठीक तरह से भोजन देने में विफलता हो जुकी हो। जब कभी रेल में बहुत जास्ता सफर करना हो और रात्से में गौ का ताजा दूध न मिल सकता हो, तब इस प्रकार के भोजनों का विशेष उपयोग हो सकता है। फिर भी उनका व्यवहार योड़े ही समय के लिए होना चाहिए।

पहले वर्ष में दूध के सिवा दूसरा भोजन—जब बच्चा छः या सात महीने का हो जाता है, तब उसका पहला दात निकलता है। जब कहुं दात निकल आये, तब यह समझ लेना चाहिए कि बच्चा दूध के साथ साथ और प्रकार के भोजन पचाने के योग्य हो रहा है। यदि बच्चा केवल दूध पीकर ही शान्त और सन्तुष्ट रहे, तब माता को चाहिए कि कुछ और छहर जाय और उसे निशास्तेवाले भोजन देना आरम्भ न करे। पर यदि बच्चा केवल दूध से ही सन्तुष्ट होता हुआ न दिखाई दे और उसका बजन ठीक तरह से बराबर न बढ़े, तब माता को चाहिए कि उसे और प्रकार का भी भोजन दे।

बच्चे को पकाई हुई रोटी के ऊपर का छिलका चबाने के लिए या थोड़ा मांस खागा हुआ हड्डी का टुकड़ा कुतरने के लिए दिया जा सकता है। इससे उसके जबड़े मज़बूत होगे। इसके सिवा उसे पकी हुई नारंगी या सन्तरे की एक फाक उसमें के बीज निकाल कर भी दी जा सकती है।

अधिक अवस्था के बच्चों का भोजन—यहा तक तो छोटी अवस्था के बच्चों या शिशुओं के भोजन के सम्बन्ध में विचार हुआ है। अधिक अवस्था के बच्चों के भोजन की समस्या भी उतनी ही महस्त्र की है और उस पर भी माता-पिता को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। बच्चे को ठीक तरह से भोजन देने का कर्तव्य पूर्ण रूप से माता का ही है। उसे चाहिए कि बच्चे की आवश्यकताओं का पता खाली और उन आवश्यकताओं के अनुसार उसको भोजन देने का नियम बनाये या अवस्था करे। पर जब तक वह खाद्य पदार्थों और भोजन कराने के मूल सिद्धान्तों को अच्छी तरह नहीं समझ लेती, तब तक वह सफलता-पूर्वक अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं कर सकती। माता को इस 'बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को होनेवाले बहुत से रोग उन्हें बिना समझे बूझे और ठीक डग से भोजन न देने के कारण

ही होते हैं। यदि बच्चा दुबला-पतला और कमज़ोर दिखाई पड़े और उसका स्वास्थ्य उत्तेजित न करे, तो माता को समझ लेना चाहिए कि बच्चे को ठीक भोजन नहीं मिलता। माताये प्रायः ऐसी पौष्टिक औषधे जानना चाहती है जिनके सेवन से उनके दुबले-पतले और कमज़ोर बच्चे मेंट-टाइप और बलवान् हो जायें। पर उन्हे यह स्मरण रखना चाहिए कि ऐसी औषधों के पीछे पढ़ने से कहीं अच्छा यह है कि वे भोजन कराने की समस्या पर ध्यान दे और उनका भोजन नियमित करे। जब तक अच्छा और उपयुक्त भोजन न दिया जायगा, तब तक पौष्टिक औषधों से बहुत ही कम लाभ होगा। बच्चे का बल जितना रसाईघर पर निर्भर करता है, उतना दबावानें पर निर्भर नहीं करता।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बच्चे अपने भोजन के सम्बन्ध में पूर्णरूप से अपनी माताओं के निर्णय और ज्ञान पर निर्भर करते हैं। माताये साधारणतः अपने छोटे बच्चों के भोजन का तो विशेष ध्यान रखती है, पर जब वे बच्चे दूसरे वर्ष में प्रवेश करते हैं, तब वे कम सचेत रहती हैं और उन्हे मनमाना भोजन देने लगती है। बहुत बच्चे के भोजन पर भी उन्हे उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसे अपने शारीरिक संगठन और विकास के लिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार के भोजन दरकार होते हैं। पहले पांच वर्षों में बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। उनकी फुरती और चंचलता भी उन्हीं दिनों में अधिक देखने में आती है। उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपयुक्त भोजन और अच्छे पोषण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि साधारणतः हज़र्वों दिनों में उनकी आदते भी बनती बिगड़ती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चे को अच्छी आदर्श डाली जायें और खाने-नीने के सम्बन्ध में उसे दुरी आदर्श न पढ़ने पाएं।

बच्चे के भोजन के सम्बन्ध में कोई एक ही और निश्चित नियम नहीं बतलाया जा सकता। इसका निश्चय बहुत कुछ जल-वायु, घर की दशा और सामाजिक अवस्थाओं आदि से होता है। ले केन इतना होने पर भी कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जिनका पालन माताओं को अपने बच्चों के लिलाने-पिलाने और उन्हें स्वस्थ रखने तथा दृष्टिपूष्ट और बलवान् बनाये रखने के लिए करना चाहिए। माता को यह बात भूल नहीं जानी चाहिए कि यदि बच्चे को ठीक भोजन न दिया जायगा अथवा ठीक तरह से न दिया जायगा, तो उसी समय अथवा कुछ आगे चलकर बच्चा बीमार पड़ जायगा, उसे बदहज़मी हो जायगी और उसका पूरा पूरा पोषण न होगा।

भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन—सब प्रकार के भोजन नीचे लिखे चार अलग अलग भागों में बंटे जा सकते हैं।

(१) **प्रोटीन वाले भोजन—**बच्चे के शरीर का संगठन करने के लिए इस प्रकार के भोजन बहुत ही आवश्यक होते हैं। उनमें नाइट्रोजन (Nitrogen) रहता है। इस वर्ग में जो विशेष प्रकार के भोजन आते हैं, उनके नाम ये हैं—दूध, मौस, मछली, अडे, हरी तरकारियाँ और दाल आदि।

(२) **कार्बोहाइड्रेट (Carbo-Hydrate) वाले भोजन—**इनसे शक्ति उत्पन्न होती है और साथ ही इनका कुछ अश्वचरकी के रूप में शरीर में रक्षित रहता है। चीनी, शहद, मीठे फल, आलू, चावल और रोटी आदि पदार्थ इस वर्ग के अन्तर्गत हैं।

(३) **चरबियाँ—**इनसे शरीर को गरमी पहुँचती है और शक्ति प्राप्त होती है। मक्कन, धी, तेल, मक्काई और अडो की छुरदी इस वर्ग के अन्तर्गत हैं।

(४) स्वनिज पदार्थ और नमक—शरीर के स्वाभाविक कार्यों को पूरा करने के लिए इनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है और बचपन में शरीर की वृद्धि बहुत कुछ हर्हीं पर निर्भर करती है। ये नमक आदि दूध, तरकारियों, फलों, दालों, अंडों और मांस में मिलते हैं।

दसरे वर्ष में बच्चों का भोजन—अभी तक हमने वे भोजन बतलाये हैं जो बच्चे को पहले वर्ष में दिये जाते हैं। माता के लिए यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि बच्चे को दूसरे वर्ष में क्या क्या चीज़े खाने को दी जानी चाहिएँ; क्योंकि उसके हर्हीं बातों के ज्ञान पर बच्चे का स्वास्थ्य और कल्याण एक बड़ी सीमा तक निर्भर करता है। यदि बच्चा बराबर तौल में बढ़ता रहे और खूब सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहे, तो माता को समझ लेना चाहिए कि वह ठीक तरह से बढ़ रहा और उन्नति कर रहा है।

पहले वर्ष में बच्चे के लिए स्वाभाविक भोजन दूध है। जब दूसरे वर्ष वह और बढ़ने लगता है, तब उसकी पाचन-शक्ति भी बढ़ने लगती है और उसे अपने विकास के लिए और भोजन की आवश्यकता होती है। उसका पेट दूध के सिवा और प्रकार के भोजन भी पचाने के योग्य हो जाता है। उस समय यदि उसे कैवल दूध मिले तो उसे हानि पहुँचती है। दूसरे वर्ष में माता को उसके भोजन में कुछ डोस पदार्थ भी मिलाने की आवश्यकता जान पड़ी और उसे उतना दूध नहीं देना चाहिए, जितना वह पहले दिया करती थी। ज्यों ज्यों और पदार्थों की मात्रा बढ़े, ल्यों ल्यों दूध की मात्रा घटनी चाहिए। उस समय बेतज़ का अव्याहार बन्द कर देना चाहिए और बच्चे को प्याज़ से दूध पीना सिखाना चाहिए। यद्यपि इस समय उसे खाने की नई नई चीज़ें भी दी जाती हैं, परंतु भी दूसरे वर्ष में भी उसका मुख्य भोजन दूध ही रहता है।

नशास्तेवाले भोजन—जब बच्चे के कई दात निकल आवे, तब समझ लेना चाहिए कि वह नशास्तेवाले पदार्थ खाने के योग्य हो गया है। ये चीज़ें रोटी, चावल या सावूटाने के रूप में दी जा सकती हैं। पर ध्यानपूर्वक बराबर यह देखते रहना चाहिए कि बच्चे पर इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर एक बच्चे की पाचन-शक्ति अलग अलग हुआ करती है। ज्यों ही स्वस्थ के कुछ भी स्फुराव होने का कोई लक्षण दिखाई पड़े, त्यों ही नशास्तेवाला भोजन देना तुरन्त बन्द कर देना चाहिए, और जब तक बच्चा पूरी तरह से नीरेग और स्वस्थ न हो जाय, तब तक उसे बराबर दूध ही देते रहना चाहिए। इसके बाद फिर नशास्तेवाली चीज़े देकर उनका परिणाम देखना चाहिए और तब उनके अनुसार आगे चलना चाहिए।

फल—जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, बढ़नेवाले छोटे बच्चों के भोजन में फलों का रस एक बहुत शावश्यक अग है और विशेषतः जब कि उन्हे ऊपरी दूध दिया जाता हो। यह रस या तो सब्वे या दोपहर के भोजन के समय दिया जाना चाहिए। पर यदि नारंगी या सन्तरा दिया जाय तो इस बात का ज्ञान रहना चाहिए कि उसमें बीज न हों। एक वर्ष के बच्चे को प्रायः जाय के दो छोटे चम्मच भर रख दिया जाना चाहिए और फिर धीरे धीरे बढ़ाकर तीन या चार चम्मच तक कर देना चाहिए। अंगूठ, आम या सेब का रस भी दिया जा सकता है। बच्चे केला भी पसन्द करते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि केले से बच्चों को हानि पहुँचती है। पर यह बात ठीक नहीं है और इस भूठे विश्वास के कारण बच्चों को केला देने से डरना नहीं चाहिए। फलों के सम्बन्ध में यह कह देना भी शावश्यक जान पड़ता है कि बच्चों को केवल ताजे और पके हुए फल ही और वह भी थोड़ी मात्रा में देने चाहिए। यदि अधिक मात्रा में दिये जायेंगे तो उनकी पाचन-शक्ति स्फुराव हो जायगी। बहुत अधिक पके

हुए और बासी फल देने से प्रायः बच्चों का स्वास्थ्य विगड़ जाता है। इसलिए ऐसे फल नहीं देने चाहिए।

तरकारियाँ—भारत गरम देश है, इसलिए यहाँ तरकारियों का रस बहुत ही उपयोगी होता है। इससे एक तो खाने की चीज़ों में हर फेर हो जाता है और दूसरे उनमें कई प्रकार के नमक होते हैं जो शरीर के भिन्न भिन्न रेशों की रचना के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी होते हैं। देशी तरकारियों का सदा खूब व्यवहार होना चाहिए; क्योंकि उनसे स्वास्थ्य सुधरता है। पर सभी तरकारियाँ लाभदायक नहीं हुआ करती। इसलिए घ्यानपूर्वक देखते रहना चाहिए कि किस तरकारी का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके अनुसार उसमें परिवर्तन या सुधार करते रहना चाहिए। ताज़ी तरकारियों में से बच्चे आलू बहुत पसन्द करते हैं, पर उनका बहुत अधिक व्यवहार हानिकारक होता है।

अंडे—बच्चों के लिए अंडे बिलकुल निरर्थक होते हैं। पर ही यदि दूसरे वर्ष के आरम्भ में उन्हें अंडे की ज़रवी दी जाय और विशेषतः ऐसी अवस्था दें दी जाय जब कि वे दुर्बल हो तो उनसे उन्हें लाभ पहुँच सकता है। यदि नियंत्रण एक अंडा दिया जाय तो उनसे कोई हानि नहीं हो सकती। पर जिन बच्चों को दमा या खुजली और सेहुर्झा आदि का रोग हो, उन्हें अंडा नहीं देना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को उबले हुए कड़े अंडे नहीं देने चाहिए, क्योंकि प्रायः बच्चे उन्हें पचा नहीं सकते। बच्चों को अंडा देने का सबसे अच्छा ढंग यह है कि या तो उन्हें नरम उबाला हुआ अंडा दिया जाय या उसकी खीर बनाकर दी जाय।

मछली—जब बच्चा साल भर का हो जाय, तब उसे उबाली हुई मछली के छोटे छोटे दुकड़े दिये जा सकते हैं।

मांस—जब बच्चे का दूसरा वर्ष पूरा होने लगे, तब उसे कभी कभी मांस भी दिया जा सकता है। पर यदि वह मांस न खाना

चाहता हो तो उसे खाने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। इडओं में बन्द जो विलायती मांस आता है, वह बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए।

धी—बच्चे की ठीक तरह से बृद्धि और विकास करने के लिए धी बहुत आवश्यक है। रोटी या चावल के साथ धी दिया जा सकता है। आरम्भ में केवल थोड़ा ही धी देना चाहिए और वह भी उसी समय देना चाहिए जब बच्चा भूखा हो। आज-कल बाजारों में जो धी मिलता है, वह शुद्ध नहीं होता और उसने कई तरह की चीजें मिली हुई होती हैं। ऐसे धी से क्रेटे बच्चों के स्वास्थ्य को जितनी अधिक हानि पहुँचती है, उसकी पूरी पूरी कल्पना भी नहीं हो सकती। जब गले की सूजन, पाचनशक्ति की ख़रादियों और बुखार आदि का पता लगाया जाता है, तब यही सिद्ध होता है कि इनका कारण बाजार के धी से तैयार की हुई मिठाइयों का व्यवहार है। गौ या भैंस के ताजे दूध से मक्खन निकालकर जो धी बनाया गया हो, उसका मुक्का-बला बाजार का कोई धी नहीं कर सकता।

दही—भारत में बहुत प्राचीन काल से ही दही एक बहुत ही लाभदायक भोजन माना जाता है। भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहा के लोग दही के व्यवहार

• यहाँ जिस दही का लिंक किया जाता है, वह वही दही है जो देशी ढंग से भारत में तैयार किया जाता है। यहाँ का दही प्रायः वैसा ही होता है जैसा बलगोरिया में बनाया जाता है। विलायत से एक प्रकार की टिकिया आती है जिन्हें लैक्टो बैसिलस बलगोरिक्स (*Lacto bacillus bulgaricus*) कहते हैं। ये टिकियां बैंगरेजी दवा बेचनेवालों के यहाँ मिल सकती हैं और वे ही लोग यह भी बतला देते हैं कि कितने दूध को जमाने के लिए उसमें कितनी टिकियां डालनी चाहिए।

को स्वास्थ्य के लिए अच्छा न समझते हैं। पाश्चात्य देशों के चिकित्सक भी उसकी उपयोगिता मानते हैं। भारत-सरीखे गरम देश में दही का व्यवहार करने से आंतों के अन्दर मल सड़ने नहीं पाता; और कुछ विशेष प्रकार की चीजों के खाने से शरीर में लो अनेक प्रकार के विष उत्पन्न हो जाते हैं, वे रक्त के प्रवाह में मिलने नहीं पाते। दही में लैकिटक एसिड (Lactic Acid) नाम का जो एक विशेष प्रकार का तेजाब होता है, वह आंतों में होनेवाले कुछ विशेष प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करता है। वे कीटाणु तेजाब में बढ़ने और फैलने नहीं पाने। हाँ यदि कोई खारी पदार्थ हो तो उसमें वे अवश्य बढ़ते और फैलते हैं। बच्चों और बड़ी उमर के लोगों को आंतों में मल के सड़ जाने के कारण जो दस्त आने लगते हैं, वे प्रायः दही या छांच के व्यवहार से रुक जाते हैं। अच्छे और बढ़िया दही की पहचान यही है कि वह भीठा हो, खट्टा न हो। और प्रकार की जेलिमो से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उसे तैयार करने में कहूं बातों की सावधानी रखी जाय। जिस दूध का दही जमाना हो, उसे हानिकारक कीटाणुओं से बचाये रखने के लिए पहले उबाल लेना चाहिए और तब उस दूध में किसी विश्वसनीय प्रकार का लैकिटक एसिड छोड़ देना चाहिए। इसके बाद वरतन को अच्छी तरह से ढक्कर रात भर पढ़ा रहने देना चाहिए। सबेरे दही तैयार हो जायगा।

प्रायः दो वर्ष की अवस्था के छोटे बच्चे दही बहुत पसन्द करते हैं। साधारणतः दही का व्यवहार करने से पहले उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया जाता है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना नमक के ही दही खाना पसन्द करते हैं। कुछ बच्चे अधिक दही खाते हैं और कुछ कम। आरम्भ में दो बड़े चम्मच भर दही देना बहुत है। इसके बाद धीरे धीरे मात्रा बढ़ाई जा सकती है। माता-पिता को ज्यानपूर्वक यह देखते रहना चाहिए कि उसके व्यवहार से बच्चे को कठिन्यत न होने पावे। यदि कठिन्यत हो तो कुछ समय के लिए दही का व्यवहार

वन्द कर देना चाहिए। यदि ऐसा न किया जायगा तो पाचन के सम्बन्ध की कई भारी खुराकियां उत्पन्न होने का भय रहेगा। रात के समय और खासकर जाडे के दिनों में ढही का व्यवहार करना ठीक नहीं है।

मिठाइयाँ—चीनी एक अच्छी और लाभदायक खाने की चीज़ है। पर यदि चीनी और मिठाइयों आदि का बहुत अधिक व्यवहार किया जायगा, तो उससे दूसरे आवश्यक और पोषक भोजनों की भूख नष्ट हो जायगी। चीनी का अधिक व्यवहार करने से पेट और आतों में खुगबी पैदा होती है और शरीर का ठीक तरह से पोषण नहीं होने पाता। इससे बच्चों को उतनी ही भीषण बान पढ़ जाती है जितनी भीषण बान अधिक अवस्था के लोगों में शराब का व्यवहार करने से उत्पन्न होती है। यदि बच्चों को बहुत अधिक मिठाई लिलाई जाय और विशेषतः ऐसी मिठाई लिलाई जाय जो मिलावटवाले और अशुद्ध वीं या मक्कलन के साथ तैयार की गई हो, तो अवश्य ही उनमें पाचन-सम्बन्धी अन्तर प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों को और विशेषतः मोटे बच्चों को मिठाइयाँ बहुत ही समझ-नूम कर और कम दी जानी चाहिए।

बहुत अधिक चिकने पदार्थ, मसालेदार पदार्थ और अचार, चटनी आदि भी बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। छोटे बच्चों को चाय और कहवे स भी हानि पहुँचती है।

बच्चों को भोजन देने के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी सूचनायें—जिस प्रकार बच्चे के केवल दूध पीने के दिनों में उसे ठीक समय और अन्तर पर भोजन देने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कुछ बड़े होने पर भी ठीक समय पर और नियम से भोजन देने की आवश्यकता होती है। उसके भोजन करने के समय निश्चित कर देना बहुत अच्छा है। इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं बतलाया जा सकता। बच्चे की भूख और स्वास्थ्य देखते हुए माता-

पिता को आप ही उसके भोजन के समय निश्चित कर लेने चाहिए। पर उसे सदा नियमित रखने का पूरा ध्यान रखना चाहिए; और जहा तक हो सके, उसके लिए बनाये हुए नियम का पालन करना चाहिए।

बच्चे के भोजन का जो समय निश्चित हो, उससे पहले उसे कभी कुछ खाने को नहीं देना चाहिए। यहां तक कि उसे शोड़ा दूध भी नहीं पीने देना चाहिए, क्योंकि दूध को पचाने के लिए भी उतनी ही पाचन-शक्ति की आवश्यकता होती है जितनी और चीज़ों को पचाने के लिए होती है। बच्चों को अपच या बदहज़मी होने का एक बहुत ही सीधा-सादा कारण यह होता है कि भोजन के समय से पहले ही बीच बीच में उन्हे कोई न कोई चीज़ खाने को दे दी जाती है। बच्चे को यह भी सिखाना चाहिए कि भोजन खूब अच्छे तरह चबाया करो। जल्दी जल्दी खाने की चीज़ों को निगलने से एक बुरी आदत पढ़ जाती है। ज्यो ही यह देखो कि बच्चा जल्दी जल्दी भोजन को बिना अच्छी तरह चबाये ही निगल रहा है, तो ही उसे रोक दो, क्योंकि इस प्रकार भोजन करने से प्रायः बदहज़मी होती है। बच्चों से यह भी नहीं कहना चाहिए कि जल्दी जल्दी खा लो। उन्हे धीरे धीरे आराम से खाने देना चाहिए। जब कई बच्चे एक साथ मिलकर भोजन करने वैठते हैं, तब उन्हे बहुत आनन्द आता है जिससे भूख भी बढ़ती है और पाचन भी खूब होता है।

यह भी देखते रहना चाहिए कि बच्चा खाने की कौन सी चीज़ पसन्द करता है। कभी कभी बच्चे इसलिए कोई चीज़ खाने से इनकार कर देते हैं कि वह चीज़ उनके अनुकूल नहीं होती, उन्हे अच्छी नहीं लगती या उस समय उनकी कुछ खाने की हव्वा ही नहीं होती। बच्चों को डरकर या घुड़कर कभी कोई चीज़ नहीं सिखानी चाहिए। इसके बदले मे उनके मन-बहसाव का कोई सामान कर देना चाहिए जिससे

भोजन की ओर उनकी रुचि बढ़ जाती है। नहीं तरह की चीज़े उन्हें भी? भी? सिलाना आरम्भ करना चाहिए और उनका परिणाम या फल ध्यानपूर्वक देखते रहना चाहिए। उनके भोजन की मात्रा भी भीरे भीरे बढ़ानी चाहिए।

मातायें प्रायः: एक यह भी भूल किया करती है कि बच्चे को भोजन कराने के उपरान्त तुरन्त ही नहलाने लग जाती है। ऐसे बच्चों को प्रायः निश्चितरूप से सरबी लग जाती है और बदहज़मी हो जाती है। इस सम्बन्ध में नियम यह होना चाहिए कि बच्चे को भोजन के उपरान्त कम से कम एक घंटे तक न नहलाया जाय।

बच्चों को भूख करने लगना—यदि बच्चे को अच्छी तरह खुलकर भूख न लगती हो और वह थोड़ भोजन न करता हो तो उसका पोषण और बृद्धि रुक जाती है। ऐसे बच्चों को खूब खुली हवा में रखना चाहिए। बहुत अधिक आदमियों से भरे हुए कमरों, ग-दी हवा या बातावरण में रहने और खुली हवा के न मिलने से भूख असाधारण रूप से कम हो जाती है। माता अपने पढ़ोसियों से शिकायत करती फिरती है कि मेरा बच्चा कुछ खाता-नहीं नहीं। पर यदि वह इस प्रकार समय नष्ट करने के बदले नियंत्रण सवेरे और सम्बन्ध अपने बच्चों को खुली हवा में छुमाने के लिए ले जाया करे तो बच्चे को जल्दी ही खुल कर भूख लगने लगेगी। बच्चे को फिर ठीक अवस्था में लाने के लिए माता को चाहिए कि वह उसकी रुचि देसे और समझे। यदि वह केवल बहुत अधिक चिन्ता करेगी तो बात भी बिगड़ जायगी। जो लड़के कम खाते हों, यदि भोजन के समय उनका साथ ऐसे लड़कों से करा दिया जाय जो अधिक खाते हैं, तो भी बहुत कुछ जाम होता है। यदि उन्हे नियमित रूप से छः छः घंटों पर भोजन दिया जाया करे और बीच में कोई चीज़ खाने को न दी जाय तो इससे भी जाम होता है। बालार की बनी हुई मिठाई बच्चों को कमी बहीं देनी चाहिए।

ग्राथः कष्टियत के कारण भी वच्चों की भूख जाती रहती है। उसे ठीक और उपयुक्त भोजन दिया जाना चाहिए, साथ ही खूब पानी पिलाना चाहिए, सुली हवा में रखना चाहिए, उससे कसरत करानी चाहिए और उसे खाने को फल देने चाहिए। जहाँ तक हो सके, उसे दस्त लानेवाली दवायें नहीं देनी चाहिए।

आठवाँ प्रकारण

बच्चों की स्वास्थ्यरक्षा

माता के प्रति—यह एक पुरानी कहावत है कि बीमारी का इलाज करके अच्छा करने से उत्तम यह है कि वह पहले ही से रोक दी जाय या होने ही न दी जाय। किनी बीमारी को इलाज करके अच्छा करने से सहज काम यही है कि बीमारी होने ही न दी जाय—पहले से ही रोक दी जाय। यह सत्य सिद्धान्त अपने मन में बहुत अच्छी तरह बैठा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सम्बन्ध में इसका बहुत अधिक महत्व है। बच्चों में रोगों को रोकने या उनका सामना करने की शक्ति कम होती है; इसलिए परिस्थितियों के उस पर ऐसे प्रभाव पड़ सकते हैं जो उसके विकास में स्पष्ट रूप से वाधक हो। जिस पर बच्चों को पालने-पोसने का भार हो, उसे सब तरह से बहुत ही सचेत रहना चाहिए। यद्यपि आज-कल रोगों की चिकित्सा करने के ढंगों में बहुत कुछ सुधार और उन्नति हुई है, तथापि उसमें अभी बहुत कुछ सुधार और उन्नति होने की गुंजाइश है। इसलिए बच्चों के रोगों की चिकित्सा करने की अपेक्षा माताओं को अधिक ज्ञान इसी बात पर देना चाहिए कि उन्हे रोग होने ही न पावें। इस प्रकरण में माताओं को उचित मार्ग दिखाने के लिए स्वास्थ्यरक्षा के सम्बन्ध के मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलाये जाते हैं। आरम्भ से ही इन सबका महत्व अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और हर एक बात पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। यदि इन नियमों का ठीक तरह से पालन किया जायगा, तो बच्चे का केवल जीवन ही रक्षित नहीं हो जायगा, बल्कि वह बड़ा होकर एक स्वस्थ, बलवान् और परिश्रमी तथा कुशल नागरिक बन जायगा।

घर या रहने का स्थान—बहुत छोटे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक दशा में बनाये रखने के लिए अच्छे मकान और पड़ोस से भी बहुत बड़ी सहायता मिलती है। दुर्भाग्यवश इस समस्या पर विचार करते समय माता-पिता की हीन आर्थिक अवस्था की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि माता-पिता की आर्थिक अवस्था अच्छी हो, तो उनके रहने के मकान भी स्वभावतः ऐसे अच्छे स्थान में होगे जहाँ की सब बातें स्वास्थ्यवर्धक होंगी। पर इससे यह नहीं मान सका चाहिए कि गृहीब लोग अपनी हीन आर्थिक अवस्था के अनुसार और अपने गृहीबी ढंग से अपने और अपने आस-पास के रहने के स्थानों में कोई सुधार कर ही नहीं सकते। यह स्मरण रखना चाहिए कि गृहीबी और उसके कारण स्वास्थ्यनाशक स्थानों में निवास करने का बड़ी आयु के पुरुषों की अपेक्षा छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ही खुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि घनी आबादीवाले नगरों और मकानों में सम्पन्न लोगों के जितने बच्चे मरते हैं, उनकी अपेक्षा गृहीबों के बच्चे कहीं अधिक संख्या में मरते हैं। तंग मकानों में रहनेवाले बच्चों को सूर्य का प्रकाश और ताज़ी साफ़ हवा न मिलने के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं।

धनवान् लोग केवल अपने धन या सम्पत्ति के कारण ही स्वस्थ नहीं रहते, बल्कि हँसलिए अधिक स्वस्थ रहते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य-रक्षा के सिद्धान्तों का पालन करने के लिए अधिक सुभीते ग्रास होते हैं। ग्राम: देखा जाता है कि धनी और सम्पन्न लोग भी अपने मकानों की भीतरी सफ़ाई पर उतना अधिक ध्यान नहीं देते। यदि धनवान् लोग स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का पालन न करें, तो उनके बच्चों को भी उसी तरह कष्ट भोगने पड़ेंगे जिस तरह गृहीबों के बच्चे भोगते हैं।

बच्चों के रहने के कमरे सदा लम्बे-चौड़े होने चाहिए, उनमें पूरा प्रकाश आना चाहिए, वे अच्छी तरह सजे हुए होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि उनमें हवा के बहुत तेज़ झोके न आ सके। वे

ऐसे होने चाहिएँ कि उनमें पश्च, चूरे, कीड़े-भकोडे और विशेषतः विलियार्ड न आ सकें। यदि घर में कोई विलियी पली हो तो उसे बच्चे के कमरे में नहीं जाने देना चाहिए। बच्चों का चेहरा प्रायः गरम और आकर्पक होता है, इसलिए विलियां प्रायः उन पर लेट जाती हैं जिससे उन्हें बहुत कष्ट होता है। इसके सिवा विलियों के द्वारा बच्चों को छूतवाले रेग भी हो सकते हैं। जिस कमरे में बच्चा रखा जाय, वह खूब हवादार होना चाहिए और उसमें इधर-उधर व्यर्थ के सजावट के सामान नहीं विलिये होने चाहिए, जैसे कि प्रायः घरों में हुआ करते हैं। जिस कमरे में बच्चा रहता है, उसमें कपड़े धोते और सुखाने भी न चाहिएँ और वहाँ से काक्कीने आदि भी हटा देनी चाहिए; क्योंकि उन्हें गर्द आकर जमती और बैठती है। बच्चों के कमरे में खान-पीने की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए; क्योंकि उनके कारण घर में चीटिया और मक्खिया आती हैं। यदि बच्चा मल लाग करे तो वह भी वहाँ से तुरन्त हटा देना चाहिए।

मारत में बच्चों के कमरों को सुगन्धित करने के लिए उनमें अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ जलाये जाते हैं। यह बात किसी अंश तक लाभदायक तो अवश्य है; पर इससे भी अधिक महस्त की बात यह है कि ताज़ी हवा आने के लिए मारं सुखा रहना चाहिए।

ताज़ी हवा—स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए साफ़ और ताज़ी हवा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। बच्चे के स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही बलकारक प्रभाव पड़ता है। मातायें प्रायः जाड़े के दिनों से बच्चों को इसलिए बाहर नहीं ले जातीं कि कहीं उन्हें सरदी न लग जाय। पर उन्हें यह याद रखना चाहिए कि यदि बच्चा स्वस्थ और नीरोग होगा, तो उस पर ताज़ी ठंडी हवा का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वल्कि उसे लाभ ही पहुँचेगा। यदि बच्चा बलवान् और स्वस्थ हो तो उसे जाड़े के दिनों में सरदी सहने के योग्य बनाना चाहिए। यदि बच्चा खूब साफ़ और ताज़ी हवा में रहेगा, तो उससे न केवल फेफड़ों

की बीमारियाँ नहीं बढ़ेंगी—बल्कि उसमें नहीं बीमारियाँ भी नहीं आने पायेंगी।

यदि मौसिम अच्छा हो तो गरमी के दिनों में बच्चे को तीन सप्ताह का हो जाने के उपरान्त और जाइ ए के दिनों में चालीस दिनों का हो जाने के उपरान्त बाहर निकालना चाहिए। भारतवासियों में यह एक पुरानी प्रथा है कि जब तक बच्चा चालीस दिन का नहीं हो जाता, तब तक उसे घर से बाहर नहीं निकालते। पर इस प्रथा में कुछ शिथेलता लाने की आवश्यकता है। जाइ ए के दिनों में तो इस पुरानी प्रथा के अनुसार बच्चों को इतने दिनों तक बाहर न लाना ठीक ही है। पर गरमी के दिनों में उसे इतने अधिक समय तक कमरे के अन्दर बन्ड रखना ठीक नहीं है। जब वह तीन सप्ताह का हो जाय, तब वह मकान के बाहर लाया जा सकता है और इससे उसके स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुँच सकती। जिन माझानों में बहुत अधिक लोग रहा करते हों, उनमें रहनेवाले माता-पिता को इस नियम का पूरी तरह से और अवश्य पालन करना चाहिए। बच्चों को बाहर की खुली हवा में लाने के सम्बन्ध में माता-पिता को नीचे लिखे हुए नियमों का ध्यान रखना चाहिए—

बच्चों को बाहर हवा में रखने का समय धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। पहले दिन बच्चे को पन्द्रह मिनट तक बाहर रखना चाहिए और दूसरे दिन बीस मिनट तक; और इसी प्रकार उसे बाहर रखने का समय धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। उसे कमरे से बाहर लाने से पहले अच्छा यह होगा कि कमरे की खिड़किया आदि खोलकर उसे तापमान की भिन्नताओं का कुछ अभ्यस्त कर लिया जाय।

माता-पिता प्रायः बच्चों को बाहर गली में ले जाया करते हैं और यह समझते हैं कि हमने बच्चे को ताज़ी हवा सिखायी। इससे कहीं अच्छा यह होगा कि वे बच्चे को बाहर चिकालने और ताज़ी हवा सिखान के लिए किसी बाग् बगीचे में ले जाया करें।

दिन के समय और विशेषतः गरमी के मौसिम में कमरे की लिहड़-किर्णा और दरवाजे खुले रखने चाहिए जिसमें बरावर हवा आती रहे। यदि लिहड़की पूर्ण तरह से न खोलकर केवल थोड़ी सी खोली जायगी, तो तेज़ हवा का मांक आवेगा जो भयंकर और हानिकारक होगा। विशेषतः जब बच्चे को खमरा, काली खासी या डर्सी प्रकार का और कोई रोग हुआ हो और वह उस रोग से अच्छा हो गया हो, तो फिर उन्हें बन्द कमरे में रखना और भी हानिकारक होता है। ऐसी अवस्था में कमरे में बन्द रहने से उन्हें ज्यरु रोग हो जाने का भय रहता है।

भातांये प्रायः बच्चों को मक्खियों आदि से बचाने के लिए उनका सुँह किसी कपड़े या रूमाल आदि से ढक डिया करती है। पर उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि मेघा करके वे बच्चे की नाक और सुँह तक नाज़ी हवा पहुँचन का मार्ग बन्द कर देती है। जिन बच्चों को प्रायः सरड़ी और खासी आदि हुआ करती है, उन्हें इससे और भी अधिक हानि पहुँचती है। इसलिए बच्चे का सुँह सदा और विशेषतः जब कि वह साथा रहे, चुला रहना चाहिए जिसमें उसे साम लेने के लिए ताजी और साफ़ हवा बरावर मिलती रहे।

नीचे लिखी आतों से सचेत रहना चाहिए—

- (१) बच्चों को आंधी और तेज़ हवा से बचाना चाहिए।
- (२) यदि बच्चे को छोड़कर खासी आती हो, तो उसे लेकर बाहर नहीं निकलना चाहिए।

(३) भारत-सर्वज्ञे गरम देश में बच्चे को गरमी के दिनों में सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाना चाहिए। यहाँ हर साल बहुत से बच्चे केवल इसी लिपु मर जाते हैं कि वे सूर्य की प्रक्षर किरणों के सामने बहुत अधिक समय तक रखे जाते हैं।

(४) बच्चों की आंखों पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ने देना चाहिए, नहीं तो उनकी आंखें आ जायेंगी या हुखने लगेंगी।

(५) बच्चों को और विशेषतः ऐसे बच्चों को जिन्हें प्रायः जुकाम और खांसी हुआ करती हो, तेज़ हवा के झोकों से बहुत रक्षाना चाहिए।

व्यायाम या कसरत—दूध पीते और दूसरे छोटे बच्चों के लिए व्यायाम या कसरत का जो महत्व है, उसे माता-पिता बहुत ही कम समझते हैं। साधारणतः माता-पिता यही समझते हैं कि छोटे बच्चों को कोई कसरत करने की आवश्यकता नहीं होती। पर उन्हे यह स्मरण रखना चाहिए कि एक छोटे बच्चे के शरीर में भी उतने ही अंग होते हैं, जितने किसी वयस्क युवा के अंग होते हैं; यह बात दूसरी है कि उसके वे अंग उतने अधिक विकसित न हों। उसके लिए यह आवश्यक होता है कि उसके सभी अंग समानरूप से काम करें, और यह बात कसरत करने से ही हो सकती है। शरीर के रग-पट्टों का विकास करने के लिए कसरत करने की आवश्यकता होती है। बिना कसरत के तो भोजन का पाचन भी ठीक तरह से नहीं हो सकता। कसरत न करने से आंतें भी ठीक तरह से काम नहीं करती, पाखाना साफ़ नहीं होता जिससे शरीर में अनेक प्रकार के विष फैलने लगते हैं, बच्चा बहुत ही शिथिल और अकर्मण्य या सुरुच हो जाता है, उसका मन बुझा सा रहता है और उसमे उत्साह या उमड़ नहीं रह जाती। हम यह भी कह सकते हैं कि बच्चा आपसे आप जितनी ही अधिक कसरत करता है, उसका स्वास्थ्य भी उतना ही अधिक अच्छा रहता है।

बच्चों के लिए कसरत—बच्चों को अपने रग-पट्टों का अवहार करने के लिए जहाँ तक हो सके, पूरा सुभीता देना चाहिए। यदि वे रेंग सकते हों तो उन्हे रेंगने देना चाहिए। यदि वे खड़े हो सकते हों तो उन्हे खड़े होने के लिए उत्साहित करना चाहिए। हाथ-पैर इधर-उधर हिलाने से भी कसरत हो जाती है। इसका अच्छा उपाय यह है कि बच्चे को दूध पिलाने के उपरान्त यो ही लेटा दिया जाय और वह जिस प्रकार कसरत करना चाहे, उस प्रकार उसे कसरत

करने दिया जाय। बच्चे जो चिल्लाते या किलकारिया मारते हैं उससे भी उनकी कसरत हो जाती है और फेफड़े मजबूत होते हैं।

जब बच्चा एक महीने का हो जाय, तब उसे पेट के बल लिटाना चाहिए। यदि इस अवस्था में उसे कुछ कष्ट जान पड़ेगा, तो वह आप ही किसी ओर करवट ले लेगा। दिन भर में एक बार बच्चे को इस प्रकार की कसरत करानी चाहिए जिसमें उसे पीठ के पुट्ठों को मजबूत करने का अवसर मिले। यदि वह सदा पीठ के बल ही पढ़ा रहे गा तो उसे इस बात का अवसर न मिलेगा। हम यहाँ यह भी कह देना चाहते हैं कि उसके शारीर का बहुत कुछ विकास उसकी पीठ के पट्ठों के विकास पर ही विर्भर करता है।

बड़े बच्चों के लिए कसरत—खेल-कूद पसन्द करते हैं। यह बात उनके लिए उचित भी है और स्वास्थ्य-वर्धक भी। बच्चों को कभी खेलने से रोकना या मना नहीं करना चाहिए। हरा इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी गुलत रास्ते पर न जायें। बड़े बच्चों को घर से बाहर निकलकर खूब दौड़ने-धूपने और तरह-तरह के खेल खेलने देना चाहिए। दूसरे बच्चों का साथ उनके लिए लाभदायक होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि उनके बच्चे सामाजिक दृष्टि से निम्नकोटि के लोगों के बच्चों के साथ गलियों में खेलें तो वे इसमें अपना अपमान समझते हैं। पर कुछ परिस्थितियों में बच्चों को इस प्रकार खेलने देना चाहिए। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि धनवानों के लड़के पूरी तरह से कसरत न करने और दूसरे बच्चां के साथ न खेलने के कारण कई प्रकार की हानिया उठाते हैं। खेल-कूद और मनोविनोद मानो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक औषधि के समान हैं। जो बच्चे छोटी अवस्था में दूसरे बच्चों के साथ नहीं मिलते जुलते, वे बड़े होने पर शरमीले होते हैं जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार की उत्पत्तियों में बाधा पड़ती है। पर दूसरे बच्चों के साथ मिलने से उनकी

भिन्नक निकल जाती है और यह बाधा नहीं होने पाती। जो लोग बड़े होने पर सदा मनहूस और सुख दिखाई देते हैं, वे प्रायः ऐसे ही होते हैं जो बाल्यावस्था में दूसरे बच्चों के साथ हँसने खेलने नहीं पाते। जो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिलते जुलते रहने हैं, वे बड़े होने पर व्यवहार के सच्चे होते हैं और लोगों के साथ मिलता स्थापित करने का भाव भी उनमें रहता है।

जब लड़का या लड़की बड़ी हो जाय तब उसे खूब चलाना फिराना और टहलाना चाहिए। दौड़ने-धूपने और उछलने-कूदने से बच्चे प्रसन्न भी रहते हैं और उनकी कसरत भी हो जाती है। नंगे पैर दौड़ना अच्छा होता है। रबड़ का गेद उन्हे दौड़ने में और भी सहायक होता है। प्रायः बच्चे घर के काम-धन्दे में सहायता देना चाहते हैं। यदि वे ऐसा करें तो उनसे सहज सहायता लेनी चाहिए।

जब बच्चा ढो बरस का हो जाय तब उसे ऐसा अवसर देना चाहिए कि वह मूला आदि मूलकर बाहों की कसरत कर सके। आगे और पीछे की तरफ़ मूलने से बच्चे प्रसन्न भी रहते हैं और उनके हाथों की कसरत भी हो जाती है। कुछ बच्चे इस प्रकार के खेल बहुत पसन्द करते हैं।

कसरत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें बच्चे बहुत अधिक थक जायें या शिथिल हो जायें। किसी बच्चे को उससे बड़े या अधिक बलवान् बच्चे के साथ मुकाबला करने या भिड़ने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के मुकाबले में उसके शरीर पर आवश्यकता से अधिक ज़ोर पड़ता है और वह बहुत थक जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खेल उजड़ापन का न हो और उसमें अधिक शोर न होने पावे।

भारत में लोग प्रायः बच्चों के शरीर पर तेल मला करते हैं। यह बहुत खाभदायक होता है; क्योंकि शरीर पर तेल की मालिश करने से शरीर में रक्त का अच्छी तरह संचार होता है।

बच्चे के शरीर की सफाई—बच्चे का स्वास्थ्य ठीक दशा में बनाये रखने के लिए शरीर की खाल का जो विशेष महत्व है, उसका माता-पिता को ज्ञान होना चाहिए। यह केवल शरीर का ऊपरी आवरण या उसे ढकने की ही चोज़ नहीं है, बल्कि वह सांस लेने का भी उतना ही अंग है जितना कि फेफड़े हैं। इसके सिवा इसी मार्ग से शरीर की बहुत कुछ गन्दगी भी बाहर निकलती है। यदि वह गन्दगी अन्दर ही बन्द रह जाय तो उससे आदमी बीमार पड़ सकता है। गरमी के दिनों में यह गन्दगी पसीने के रूप में निकलती है। शरीर के चमड़े या खाल का दूसरा काम यह है कि उससे शरीर का तापमान ठीक बना रहता है। इन सब कामों के ठीक तरह से होने के लिए यह आवश्यक है कि शरीर के ऊपर की खाल को बराबर हवा लगती रहे।

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि बच्चों के शरीर की खाल पूरी तरह से विकसित अवस्था में नहीं होती और इधर-उधर गिरने-पड़ने आदि के कारण उसमें प्रायः चोट और खरोच आदि लग जाया करती है। इस प्रकार की चोटों और खरोचों से बाहर की अनेक जहरीली चीज़ों और रोग के विषों आदि को शरीर के अन्दर पहुँचने का मार्ग भिल जाता है। बच्चों के शरीर में उन्हें रोकने की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। जन्म के समय बच्चा जितना ही कम परिपक्व होता है, उसमे बीमारियों आदि की छूत से बचने की भी उत्तनी ही कम शक्ति होती है। इसलिए माता को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के शरीर में इस प्रकार रोगों की छूत न लगने पावे। गन्दे कपड़े पहनाने या गन्दे पानी से नहलाने से भी इस प्रकार शरीर में रोगों के विष प्रवेश कर जाते हैं।

शरीर में रोगों के प्रवेश करने का दूसरा साधन ऐसे बच्चों का संसर्ग—भेज-जोल—है जिनकी खाल पर किसी प्रकार की सूजन या फौड़ा-फुन्सी आदि हो। जिन बच्चों के शरीर की खाल का ठीक ध्यान रखा जाता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहता है।

स्नान—माता को बच्चे के शरीर की सफ़ाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्नान के सम्बन्ध में जो बातें नीचे बतलाई जाती हैं, वे अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए।

(१) बच्चे को नियम नहलाना बहुत आवश्यक है; पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के स्वास्थ्य पर उसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े। स्नान के बाद बच्चे के हाथ-पैर या नाक ठंडी नहीं रहनी चाहिए। यदि ये अंग ठंडे रहें तो समझना चाहिए कि स्नान कराने से बच्चे का बल घटता है और उसकी तबीयत ख़राब होती है। ऐसी दशा में उसके शरीर की सफ़ाई के लिए केवल स्पंज का व्यवहार करना चाहिए।

(२) जब बच्चा अच्छी तरह से नहलाया जाता है, तब उसे बहुत आनन्द मिलता है। यदि सम्भव हो तो माता को चाहिए कि बच्चे को तब तक बराबर नियम स्नान कराती रहे, जब तक उसे आप ही नियम स्नान करने का अन्याय न पड़ जाय।

(३) नये जन्मे हुए बच्चे को तब तक पूरा स्नान नहीं कराना चाहिए जब तक उसकी नाल गिर न जाय।

(४) बच्चे को दूध पिलाने के उपरान्त तुरन्त ही स्नान नहीं कराना चाहिए।

(५) बच्चे को स्नान कराने का पानी बहुत साफ़ होना चाहिए। गरमी के दिनों में साधारण कल का जल या किसी साफ़ कुएँ से खींचा हुआ ताज़ा जल ही बहुत अच्छा होता है। जाड़े के दिनों में गरम पानी का व्यवहार करना चाहिए। यह जानने के लिए कि स्नान का पानी अधिक गरम तो नहीं है, पहले उसमें से थोड़ा पानी अपनी हथेली के पिछले भाग या कोहनी पर ढालकर देख लेना चाहिए। यदि वह पानी सहता हो तो उससे बच्चे को स्नान कराना चाहिए।

(६) स्नान कराने के समय वच्चे को होशियारी से पकड़े रहना चाहिए जिसमें वह हाथ से फिसल या गिर न जाय।

(७) वच्चे का सारा शरीर जल्दी जल्दी धो डालना चाहिए। नहलाने में पांच मिनट भी अधिक समय नहीं लगना चाहिए; और इस बात का व्यान रखना चाहिए कि नहलाने के समय कमरे में तेज़ हवा का फोंका न आवे। यदि तेज़ हवा न चलती हो तो धूप में नहलाना अधिक उत्तम है। उस दशा में नहलाने से पहले उसके शरीर पर थोड़ी देर तक धूप लगने देनी चाहिए। सूर्य की वे किरणें वच्चे के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। सिर की सफाई में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रायः उसमें बहुत सी धूल और गर्ड जम जाती है। बालों में कंधी करके उन्हें भी साफ़ रखना चाहिए।

(८) अधिक सावुन मलने से खुशकी पैदा होती है। यदि साधारण तरह से धोने से ही बाल बहुत खुश या रुखे हो जावें, तो उनमें योद्धा सा चिकना पश्चार्थ लगा देना चाहिए जिसमें धोने से उनकी जो स्वाभाविक चिकनाहट निकल जाती है, वह फिर आजाय। इस काम के लिए किसी ग्रकार के तेल का अवहार किया जा सकता है। जल्दु और तापमान को ढेखते हुए यदि वच्चे को सप्ताह में पुक या दो बार सारे शरीर में पहले तेल मलकर तब नहलाया जाय, तो उससे बहुत लाभ होता है। वच्चे की गरदन और उसके आस पास का स्थान विशेष रूप से साफ़ करना चाहिए; क्योंकि ग्रायः दूध पिलान में उसका कुछ अश गरदन पर गिरकर जम जाया करता है। इसके सिवा बगल, कोहनी, रान और कमर का पिछला भाग आदि भी खूब अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए।

(९) वच्चे का शरीर जल्दी-जल्दी और पूरी तरह से पोँछना और सुखाना चाहिए। सबसे पहले सिर पोँछना चाहिए और तब नीचे कं अग पोँछने चाहिए। मोटे वच्चों के शरीर में अनेक स्थानों पर और पैरों तथा शरीर के बीच में और जोड़ों आदि पर जो शिकन होती

है, वे भी अच्छी तरह साफ़ की जानी चाहिएँ; क्योंकि प्रायः ऐसे ही स्थानों पर से चमड़े की बीमारियां पैदा होती हैं। यदि ऐसे स्थानों पर बोरेसिक पाउडर छिड़क दिया जाया करे तो चमड़े की सूजन आड़ि का भय कम हो जायगा।

(१०) लड़के के पेशाब करने की जगह पर जो चमड़ा आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है, उसमें की मैल आड़ि भी साफ़ करनी चाहिए। यदि ऐसा न किया जायगा तो उसमें खुजली होने लगेगी जिससे वह अग सूज जायगा। इसी प्रकार लड़कियों का यह अंग भी अच्छी तरह साफ़ किया जाना चाहिए।

(११) नाखून—छोटी आवस्था से ही बच्चों के नाखून बीच बीच में काटते रहनों चाहिए। यदि नाखून न काटे जायेंगे और बड़ जायेंगे तो हघर-उघर हाथ पैर पटकने में उनके कारण बच्चे के चेहरे पर खरोच लग जायगी।

वस्त्र—शरीर के चमड़े या खाल का जो महत्व है, वह ऊपर बतलाया जा चुका है। हम इस बात की ओर भी पाठकों का ध्यान दिलाना आवश्यक समझते हैं कि शरीर की खाल के ढीक तरह से काम करते रहने के लिए उसमें बाहर की हवा लगती रहनी चाहिए जिसमें उसके अन्दर की गन्दगी बराबर बाहर निकलती रहे। बच्चों के लिए कपड़े पसन्द करने के समय इस सिद्धान्त का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हर्बा ज्ञान आदि के प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती और कपड़े भी बराबर ज्ञानुओं के अनुसार ही होने चाहिएँ। नीचे हम कुछ ऐसी बातें बतलाते हैं जिनसे माता-पिता को बच्चों के लिए कपड़े पसन्द करने में सहायता मिलेगी।

कपड़े ऐसे होने चाहिएँ जो शरीर का ताप न हरण करें—गरमी बाहर न निकलने दें। जाड़े के दिनों में गरम कपड़ा होना चाहिए पर ऐसा न होना चाहिए कि शरीर को हवा ही न लग सके और उसमें की गन्दगी ही भाव के रूप में बाहर न चिकिता सके। नहीं तो

गन्धरी के बाहर निकलने का रास्ता न मिलेगा और चमड़ा शरीर का तापमान ठीक रखने का अपना काम न कर सकेगा। इसलिए पहनने के कपड़े ऐसे होने चाहिएँ जिनमें बहुत ही छोटे छोटे सूखाख़ हवा आने जाने के लिए हों। वच्चों के शरीर की खाल बहुत ही कोमल होती है और खुरदुरे कपड़ों से उन्हें बहुत कष्ट होता है, इसलिए उनके कपड़े मुलायम होने चाहिएँ। वे तौल में भी हल्के होने चाहिएँ जिसमें वच्चों के शरीर पर भार न हो जायें।

कपड़े ऐसे होने चाहिएँ जिनसे वच्चों को हाथ-पैर ढुलाने में कोई कठिनता न हो। उनके तन्दुरस्ती के साथ बढ़ने-भूलने के लिए उनके अंगों का स्वतन्त्रतापूर्वक हिलना-डुलना बहुत आवश्यक है। इसलिए लम्बे और उलझनेवाले कपड़ों का कभी व्यवहार न होना चाहिए। जो कपड़े छोटे और तंग हो गये हों, वे वच्चों को बड़े होने पर नहीं पहनाने चाहिएँ।

कपड़े ऐसे भी नहीं होने चाहिएँ जिनसे शरीर के किसी अंग पर अनावश्यक रूप से ढबाव पड़ता हो। प्रायः लोग वच्चों की छाती पर बहुत से कपड़े लाठ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छाती को फैलने की आवश्यकता होती है। छाती पर कपड़ों का जो भाग पड़ता हो, वह बहुत तंग या कसा हुआ नहीं होना चाहिए; और कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिएँ जिन्हें पहनाने या उतारने में कठिनता हो। पिनों की जगह बटनों या फीतों आदि का व्यवहार करना बहुत अच्छा है।

गरमी के दिनों में कपड़े पतले या महीन होने चाहिएँ और ऐसे होने चाहिएँ जिनमें से सूर्य की किरणें बराबर अन्दर आ सकें। स्वास्थ्य के लिए धूप लाभदायक होती है। जिस प्रकार वच्चों को बिना ठीक तरह से कपड़े पहनाये हुए भिज्ज ताप-मानों में इधर-उधर बहुत धूमने देना हानिकारक है, उसी प्रकार उन्हें बहुत से कपड़ों से लाद देना भी हानिकारक है।

खड़, उन और रेशम आदि बहुत शोषक होते हैं और उनसे से हवा बहुत अच्छी तरह आ जा सकती है; इसलिए अन्दर या नीचे पहनने के लिए इन चीजों के कपड़े बनाना बहुत अच्छा है।

बच्चों के कपड़े—पेट पर बांधने की पट्टी—बच्चों के कपड़ों में पट्टी एक बहुत उपयोगी चीज़ है। विशेषतः जाड़े के दिनों में और बच्चे के जीवन के पहले दो तीन महीनों में उसका और भी अधिक उपयोग होता है। इसके बाद पट्टी बाधना बन्द किया जा सकता है। कुछ अवस्थाओं में ऐसा होता है कि बच्चे को ठंड लग जाने पर उसके पेट में भी कुछ तकलीफ होने लगती है। या तो उसे दस्त आने लगते हैं और या कैं होने लगती है। ऐसी दशा में उसके पेट पर केवल पट्टी बांधकर ही उसका कष्ट दूर किया जा सकता है। यदि फलालैन या खड़क की पट्टी लेकर दोहरी कर ली जाय तो उससे अच्छी तरह काम चल सकता है। इससे आंते अच्छी तरह गरम रहेंगी और सरदी होने की सम्भावना कम हो जायगी। पट्टी २० हैंच लम्बी और ६ हैंच चौड़ी होनी चाहिए। इसमें जोड़ की जगह ऊपर और नीचे दोनों ओर छोटी छोटी सेपटी पिने लगा देनी चाहिए । पट्टी बहुत अधिक कसकर नहीं बाँधी जानी चाहिए, नहीं तो इससे आंतों के आवश्यक परिचालन और छाती के नीचे के भाग के परिचालन में बाधा पड़ेगी। आरम्भ के दो तीन महीनों के बाद पेट या पेढ़ पर पट्टी बांधने की आवश्यकता नहीं रह जायगी। हरा यदि बच्चा बहुत अधिक दुबला हो और उसके पेढ़ या पेट में इसनी चरबी न हो कि भीतरी अंगों की पूरी पूरी रक्षा कर सके, तो उस दशा में अवश्य पट्टी की कुछ और दिनों तक आवश्यकता होगी। पट्टी ऐसी होनी चाहिए जिससे सारा पेट उक जाय।

रूमाल—ज्यों ही बच्चा पेशाव करे या पाखाना फिरे और उसका रूमाल गन्दा हो जाय, त्यों ही वह बदल दिया जाना चाहिए। वह रूमाल तुरन्त खो भी डालना चाहिए। इससे बच्चे के चूतड़ों पर

न्खुजली आदि नहीं होने पावेगी। ये स्माल तिकोने होने चाहिएँ और आकार में बहुत छोटे नहीं रहने चाहिएँ।

कभीज़ या कुरता ऐसे होने चाहिएँ जिसके बटन आगे की ओर हो। बच्चों के लिए स्वेटर भी एक अच्छा पहनावा है। स्वेटर बदन में खूब चुस्त आता है और वह जल्दी कही फँसता या फटता नहीं। बहुत अधिक फैन्सी कपड़ों के कारण बच्चों को इधर-उधर हिलाने-डोलने से कठिनता होती है। प्रायः लोग सुन्दरता के विचार से लड़कों के लिए अधिक झेंचे निकर बनवाते हैं। पर ऐसे निकर अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनके कारण बच्चों का चमड़ा छिल जाने का भय रहता है। बच्चों के लिए कमरबन्द या पेटी अच्छी नहीं होती। बच्चों के कपड़ों में पिनें लगाना ठीक नहीं है। जूते भी बहुत समझ बूझकर पसन्द करने चाहिएँ। उनका पंजा चौड़ा होना चाहिए और एड़िया नीची होनी चाहिएँ। जहाँ तक हो सके बच्चों को नगे पैर दौड़ने देना चाहिए, क्योंकि इससे पैरों का स्वाभाविक आकार बना रहता है।

रात के समय बच्चों के कपड़े उतार लेने चाहिएँ और उन्हें अच्छी तरह हवा में सुखा देना चाहिए, जिसमें दिन भर का लगा हुआ उसमें का पसीना सूख जाय और वे फिर दूसरे दिन पहनने के योग्य हो जायें। माताये प्रायः यह एक भूल किया करती है कि रात के समय बच्चों पर बहुत अधिक कपड़े लाद देती है। इससे बच्चों को अच्छी तरह नींद नहीं आती। विशेषतः जो बच्चे बहुत ही नाजुक हों, उन्हे तो कभी रात के समय अधिक कपड़े नहीं पहनाने चाहिएँ।

ऋतु और समय—बच्चों के कपड़े ऋतु और समय के अनुसार होने चाहिए। गरमी के दिनों में कपड़े बजन में भी हल्के होने चाहिएँ और उनका रग भी हल्का होना चाहिए; और उनकी बनावट ऐसी होनी चाहिए जिसमें अन्दर चमड़े तक हवा सहज में पहुँच सके। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि सबसे नीचे या अन्दर जो कपड़ा हो वह या तो खालिस ऊनी हो

या ऊन और सूत अथवा ऊन और रेशम मिला हुआ हो। जाड़े के दिनों में बच्चों को बहुत अधिक गरम कपड़े नहीं पहनने चाहिएँ; क्योंकि अधिक कपड़े पहनने से अधिक पसीना होता है जिससे बच्चे को सरदी या जुकाम हो जाने का भय रहता है। जाड़े में पैर विशेष रूप से गरम रखने चाहिएँ। उन दिनों टर्गें नंगी नहीं रहनी चाहिए। इससे भी अनेक प्रकार के रोग होने का भय रहता है। गरमी के दिनों में जब हवा गरम रहती है, बच्चों को जर्हा तक हो सके, कम कपड़े पहनाकर इधर-उधर घूमने देना चाहिए। जाड़े में उपयुक्त गरम कपड़े पहनने से बच्चों की सरदी, जुकाम और खांसी से रक्षा रहती है और उन्हें कै या दस्त सरीखी पाचन-सम्बन्धी बीमारियां भी नहीं होने पातीं।

बच्चों को नियमित रूप से पाखाने और पेशाव की आदत ढालना—यह बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों को आरम्भ से ही ठीक समय पर पेशाब करने और पाखाना फिरने की आदत ढाली जाय। जन्म से ही उन्हें ऐसा अभ्यास ढालना चाहिए कि वे ठीक समय पर पेशाब किया करें और ठीक समय पर पाखाना फिरा करें। इससे केवल बार बार रूमाल धोने की कठिनता से ही रक्षा नहीं होगी, बल्कि बच्चों को नियमित रूप से रहने की शिक्षा भी मिलेगी। बच्चे को ऐसी आदत ढालने के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि माता बहुत धैर्य और अध्यवसाय से काम करे। पर यदि वह बच्चे को ऐसी आदत ढाल देगी तो बच्चे को कष्टज्ञयत का रोग नहीं होने पावेगा। यह कष्टज्ञयत का रोग ऐसा हुरा होता है कि जब एक बार हो जाता है, तब जन्म भर बहुत कष्ट देता है।

जन्म लेने के बाद दो तीन दिन तक बच्चा दिन रात में तीन या चार बार पाखाना फिरता है। जन्म लेने से पहले ही बच्चे की आंतों में जो भूल जाता है, वह इन दो तीन दिनों में निकलता

है। यह मल गहरे भूरे रंग का होता है। तीसरे या चौथे दिन पाख़ाने का रंग पीला हो जाता है। आरम्भ में तो एक दो दिन तक नियम तीन बार बार पाख़ाना होता है और फिर उसके बाद प्रायः दिन में दो बार पाख़ाना होता है।

माता को अवित है कि वह नियम बच्चे के पाख़ाने की अवस्था देख-कर अपना सन्तोष कर लिया करे। उसे नियम स्वयं बच्चे का पाख़ाना देखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसका रंग और रूप आदि जैसा चाहिए, वैसा है या नहीं। यदि उसमें कोई साधारण बात हो तो उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि इन सूचनाओं पर ध्यान दिया जाय और इनके अनुसार काम किया जाय तो बच्चों की बहुत सी बीमारियाँ रोकी जा सकती हैं। अपनी मां का दूध पीनेवाले स्वयं बच्चों का पाख़ाना या तो नारंगी रंग का होना चाहिए या सुनहरे पीले रंग का। वह बहुत अधिक पतला, हरे रंग का या जमा हुआ और थके के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे का पाख़ाना इस प्रकार का हो तो माता को चाहिए कि वह बच्चे का भी और साथ साथ स्वयं अपना भी भोजन बदल दे। बच्चे के पाख़ाने में किसी प्रकार की दुर्गन्ध भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें तेज़ और अभिय गन्ध हो तो समझ लेना चाहिए कि पाख़ाने में कुछ खुराकी है। बच्चों को कभी कभी तो हरे रंग का पाख़ाना हो जाया करता है; पर यदि माँ का दूध पीनेवाले बच्चे को प्रायः हरे रंग का पाख़ाना हुआ करता हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। माता को यह भी देखते रहना चाहिए कि रूमाल पर बच्चे के पेशाब का दाग तो नहीं पड़ता है। प्रायः बच्चों के रोने का कारण यह हुआ करता है कि उनका रूमाल पेशाब आदि से तर हो जाता है जिससे उन्हें कष्ट होता है। इसलिए रूमाल थोड़ी थोड़ी देर पर बदले जाने चाहिए; क्योंकि पेशाब से तर रूमाल के कारण बच्चों को बहुत जल्दी कष्ट मालूम होने लगता है। बच्चे के शरीर का कपरी चमड़ा बहुत नाजुक होता है और पेशाब या पाख़ाने आदि

के लगाने से उसमें बहुत जल्दी खुजली होने लगती है, जिससे वह बेचैन हो जाता है और खिजलाने लगता है। इसलिए माता को चाहिए कि वह बच्चे के शरीर का ऊपरी चमड़ा खूब अच्छी तरह साफ़ रखा करे। जिन बच्चों की अवस्था कुछ अधिक हो गई है, माता को चाहिए कि उन्हें नित्य ठीक समय पर पाख़ाने जाने के लिए विवश किया करें, चाहे उन्हें पाख़ाना आता भालूम हो या न हो। उन्हें सबैटे के समय पाख़ाने जाने के लिए कहना बहुत अच्छा है। इसके बाद उनका पाख़ाना देख लेना चाहिए और यह भी समझ लेना चाहिए कि उसमें कोई असाधारण बात तो नहीं है। भारत में क्षिर्या प्रायः बच्चों को अपने पैरों पर बैठाकर पाख़ाना किराती है। यह ढंग विलायती कमोड पर पाख़ाने किराने के ढंग से कहीं अच्छा और स्वभाविक है। भारतीय ढंग में यह विशेषता है कि बच्चे की दोनों जांघें आकर पेट के साथ सट जाती है जिससे पेट के दब दो दुर्बल भागों को सहारा मिलता है जहाँ से आंते उतरती हैं। जिस बच्चे के पेट की भीतरी दीवार कमज़ोर हो, उसे जब इस प्रकार का सहारा मिलेगा तो उसे आंते उतरने का उतना भय न रह जायगा। पर कमोड पर पैर लटकाकर बैठनेवाले कमज़ोर लड़कों को इस प्रकार आंते उतरने का कहीं अधिक भय रहेगा।

माता को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि झबरदस्ती पाख़ाना किराने के लिए बच्चा बहुत अधिक ज़ोर न लगावे या न करें। उसे बच्चे के सिर पर सवार भी नहीं रहना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि अगर तुम कुछ भी पाख़ाना न किरोगे तो मार खाओगे। यदि पाख़ाना होने को होगा, तो बहुत ही थोड़ा ज़ोर लगाने से हो जायगा। और यदि उसके लिए बहुत ज़ोर लगाया जायगा, तो उससे लाभ तो कोई होगा ही नहीं, हाँ हानि बहुत कुछ हो सकती है।

पेशाब के सम्बन्ध में ध्यान रखना—बच्चों को इस बात की आदत डालनी चाहिए कि वे दिन में कई बार नियमित समय पर पेशाब किया करे। माता को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा सोने से पहले एक बार पेशाब कर लिया करे।

बिस्तर पर पेशाब करना—दुर्बल बच्चे ग्राम्य बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया करते हैं। पर यदि बच्चों को बहुत ही ल्लोटी अवस्था में अच्छी तरह शिक्षा दी जाय तो फिर वे शायद ही कभी बिस्तर पर पेशाब करेंगे। जो बच्चे सोये सोये बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते हों, उन्हे खुली इवा में कसरत करने की आवश्यकता होती है। इससे उनका स्वास्थ्य सुधरेगा और यह आदत छूट जायगी। ऐसे बच्चों को बहुत ही सादा भोजन दिया जाना चाहिए। यदि इतनी बातों का ध्यान रखने पर भी उनकी अवस्था में सुधार न हो, तब डाक्टर को दिखाना चाहिए। हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि बच्चों का यह दोष दूर करने के लिए उन्हें कभी मारना पीटना नहीं चाहिए। इससे बच्चों की आदत तो छूटेगी ही नहीं, उलटे वे और अधिक दुर्बल तथा डरपेक्ष हो जाते हैं और उनका यह दोष पहले से और भी बढ़ जाता है।

मुँह की रक्षा—जब तक बच्चे के दात न निकले, तब तक उसके मुँह की कोई विशेष रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय उसका मुँह धोना या पौँछना बिलकुल अनावश्यक होता है। इससे खाम कुछ भी नहीं होता, हा हानि अवश्य होती है। वह बच्चे के मुँह पर जितना ही कम ध्यान देगी, उसे वहा उतनी ही कम खराबो दिखाई देगी। बच्चे का मुँह साफ रखने के लिए माता को चाहिए कि वह उसे दूध पिलाने से पहले और घाद अपने स्तनों की बुंदिया अच्छी तरह धो डाला करे। यदि बोतल या शीशी से दूध पिलाया जाता हो तो उसका रबरबाला मुँह पानी में उबाल देना चाहिए। यदि इन सब बातों का ध्यान रखा जायगा तो बच्चे के मुँह

में कोई रोग आदि न होगा। बड़ी अवस्था के बच्चों के लिए स्वास्थ्य के उन्ही नियमों के पालन की आवश्यकता होती है जिनका पालन बड़ी अवस्था के लोग करते हैं। स्थायी दाँतों का स्वस्थ और ठीक रहना। बहुत कुछ दूध के दाँतों के स्वस्थ रहने पर ही निर्भर करता है। इसलिए माता को दूध के दाँतों पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके सिवा दूध के दात ही स्थायी दाँतों की नीव होते हैं और उनका दंग निश्चित करते हैं, इसलिए जितने अधिक समय तक हो सके, दूध के दाँतों को बना रहने देना चाहिए। बच्चे का सुन्दर नियमित रूप से तो साफ़ कराना ही चाहिए, पर साथ ही उससे खूब अच्छी तरह कई कुल्ले कराने चाहिए जिसमें दाँतों की सतह के ऊपर खाने पीने की अजिंक्य का जो अंश जमा हुआ हो, वह भी बाहर निकल जाय।

बच्चों की नीद—न सोने या कम सोनेवाले बच्चों की अपेक्षा अधिक सोनेवाले बच्चे जल्दी बढ़ते और बलवान् होते हैं। बच्चे का नीवन गरमी, भोजन और नीद पर ही निर्भर करता है। यदि इन तीनों में से किसी एक में कोई बाधा पड़ती है तो बाकी दोनों दातों में भी आपसे आप बाधा पड़ जाती है। इसलिए माता को सदा ध्यान-पूर्वक यह देखते रहना चाहिए कि बच्चा अच्छी तरह सोता है या नहीं। और यदि वह अच्छी तरह न सोता हो तो उसके न सोने के कारण का पता लगाना चाहिए।

साधारणतः कितनी देर तक सोना चाहिए—जन्म लेने पर दो या तीन दिनों तक बच्चा प्रायः हर दम सोया करता है। और पहले सप्ताह में वह चौबीस घंटों में से प्रायः बाईंस घंटे सोया करता है। इस बीच में वह केवल भूख, बेचैनी और पीड़ा आदि के कारण ही जागता है। प्रायः वह दूध पीने के लिए जागता है और दूध पी कर फिर सो जाता है। आरम्भ के तीन महीनों में बच्चे को नियमित दिन रात में प्रायः इक्कीस घंटे सोना चाहिए। उसके बाद के तीन

महीनों में दिन रात में उड़ीस घंटे और छः महीने की अवस्था होने पर सोलह घंटे नित्य सोना चाहिए। एक से पाच वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को दिन रात में चौबह घंटे सोने की आवश्यकता होती है। इससे पाठकों को यह पता चल गया होगा कि बच्चा जितना ही छोटा होता है, उसे उतना ही अधिक सोने की आवश्यकता होती है।

उचित समय से कम सोना—बच्चों को जितने समय तक सोना चाहिए, यदि वे उससे बहुत कम सोयें तो यह कहा जाता है कि उन्हें नींद न आने का या उड़िद्र रोग हो गया है। इसके कारण का तुरन्त पता लगाना चाहिए और उसका हलाज करना चाहिए। नहीं तो उसका स्वास्थ कुछ समय के लिए अथवा सम्भव है कि सदा के लिए ख़राब हो जाय।

बच्चे बहुत जल्दी और सहज में सो जाते हैं। उन्हें अधिक अवस्थावाले आदमियों की तरह नींद की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। जब बच्चे के साधारण जीवन-क्रम में किसी प्रकार का विप्पना पड़ता है, तभी उसे नींद न आने का रोग होता है। इसलिए बच्चे को नियमित रूप से और ठीक समय पर सोने की आदत डालनी चाहिए; और माता को चाहिए कि वह बच्चे को ऐसी आदत डालने पर ज़ोर दिया करे।

(१) बच्चों को नींद न आने के कारण—यदि बच्चे को दूध ठीक तरह से न पीता हो, उसकी ठीक तरह से व्यवस्था न की जाती हो, उसके शरीर में पेशाब या पाखाना आदि लगा हो या वह ऐसी अवस्था में हो कि उसे कष पहुँचता हो तो उसे नींद नहीं आती। यदि वह मा का दूध पीता हो तो भूखे होने के कारण भी उसे नींद नहीं आती।

(२) कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सोने के कमरे में बहुत गरमी होती है। इससे भी बच्चों को ठीक तरह से नींद नहीं आती। इसलिए कमरे का तापमान मध्यम और सुखद होना चाहिए।

(३) कमरे में खूब अच्छी तरह हवा आना बहुत आवश्यक है।

(४) यदि कमरे में अँधेरा न होगा तो भी बच्चे को नींद न आवेगी।

(५) जिस कमरे में बच्चा सोता हो, यदि उसमें बहुत से आदमी मिलकर बातचीत करेंगे और शोर मचावेंगे तो भी उसे नींद न आवेगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए।

(६) प्रायः बच्चे प्यास लगने के कारण भी जाग उठते हैं; पर उनकी इस आवश्यकता पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। बच्चा तो प्यास के मारे बार बार रोता है और माँ उसके मुँह में छाती देती है। यदि ऐसे समय उसे थोड़ा सा ताज़ा ठंडा पानी पिला दिया जाय तो वह सन्तुष्ट हो जाता है। यदि बच्चे को दूध पिलाने से पहले उसके सामने थोड़ा पानी रखा जाय तो वह शायद ही कभी पानी पीने से इनकार करेगा।

(७) कुछ मातायें अपने काम के भुभीते के विचार से बच्चों को उनके ठीक समय पर सोने नहीं देतीं और उसके कुछ देर बाद सुलाती हैं। इससे भी बच्चों की नींद जाती रहती है। ऐसे बच्चों का स्वभाव बहुत चिड़चिढ़ा हो जाता है और वे सहज में शान्त नहीं होते।

(८) जिस बच्चे को ठीक तरह से और नियत समय पर दूध नहीं पिलाया जाता वह भी प्रायः असमय ही जाग उठता है। पर जिस स्वस्थ बच्चे को बराबर ठीक समय पर दूध पिलाया जाता है और जिसे ठीक तरह से दूध पीने और सोने आदि की शिक्षा दी जाती है, वह बराबर ठीक समय पर सो जाया करता है।

बच्चों को ठीक तरह से सोने की आदत ढालने का पूरा प्रयत्न—प्रायः मातायें और दाइर्यां बच्चों को सूखा सूखा कर सुलाया करती हैं। पर सूखा या पालना बच्चों में स्नायु-सम्बन्धी दुर्बलता उत्पन्न करता है और उसका कभी व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसके कारण बच्चे को पूरी और सुख देनेवाली नींद नहीं आती।

इसके सिवा जब बच्चे को पालने में या मूले पर सोने की आदत पढ़ जाती है, तब फिर वह बिना उसके सोता ही नहीं। आगे चल कर इससे माता या दादी को बहुत अधिक कष्ट होता है, इसलिए बच्चे को पालने पर मूला कर कभी नहीं सुखाना चाहिए।

‘कुछ माताये’ बच्चों को सुखाने के लिए थोड़ी सी अफीम दे दिया करती है। उनका मतलब यह होता है कि बच्चा जाग कर हमें कष्ट न पहुँचावे, हमें भी आराम करने को मिले। इससे बहुत अधिक हानि होती है। बच्चे को सुखाने के लिए जो अनेक प्रकार के शरबत आदि आते हैं, उनका भी कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए।

बच्चों को सोने में मनिखया भी कष्ट देती है। इससे बचाने के लिए उनके मुँह पर रुमाल नहीं ढाकना चाहिए बल्कि जाली का कोई ढुकड़ा ढाल देना चाहिए। रुमाल की अपेक्षा जाली में से बच्चा सहज में सास ले सकता है।

प्रायः माता बच्चे को दूध पिलाती पिलाती सो जाती है। थोड़ी देर बाद अबोध बच्चे के मुँह से छाती की घुंडी तो छूट जाती है और वह बिछौने पर के कपड़ों में अपना सिर गड़ा कर पढ़ जाता है। जो क्षिया शराब आदि पीती है, वे ऐसी अवस्था में सोकर उठने पर देखती है कि दम छुटने के कारण बच्चा मर गया है। जब तक बच्चा दूध पीना समाप्त न कर ले, तब तक ऐसी माताओं को स्वयं कभी नहीं सोना चाहिए। उचित यह है कि बच्चे के लिए एक अलग छोटी खटेली का प्रबन्ध कर दिया जाय जिसने उसे काफ़ी ताज़ी हवा मिलाती रहे। इससे बच्चे के दबने या कुचले जाने का भी भय न रह जायगा। एक ही विस्तर पर डो बच्चों को एक साथ नहीं सुखाना चाहिए; क्योंकि बहुत पास पास और मुँह के साथ मुँह सटा कर सोने से दोनों को उतनी अच्छी और मीठी हवा नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए।

प्रायः माताये भुरे भुरे आदमियों या हौवा आदि का नाम लेकर बच्चों को डराया करती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।

बच्चे के दाँत निकलना—साधारण नियम यह है कि जब बच्चा छः या सात महीने का हो जाता है, तब उसके दाँत विकलने लगते हैं। पर कुछ बच्चों के दाँत इसके और भी बाद निकलते हैं। पहले अस्थायी रूप से जो दाँत विकलते हैं, वे संख्या में बीस होते हैं और दूध के दाँत कहलाते हैं; और प्रायः तीसवें महीने के अन्त तक ये सब दाँत निकल आते हैं। छठे वर्ष में दूध के दाँत ढूटने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दाँत विकलने लगते हैं। पहले या दूध के दाँत प्रायः दो दो साथ विकलते हैं।

मिश्न मिश्न दृतियों के निकलने का औसत समय और क्रम इस प्रकार है—

- (१) नीचे के दो बीचबाले सामने के दांत ६ से ६ महीने तक
 (२) ऊपर के चार बीचबाले सामने के दांत . ८ „ १२ „ „
 (३) नीचे के दो आस-पास के दांत और

चार अगली डाढे	१२ , ,	१८ , ,
(४) चार कुचलियाँ	१८ , ,	२४ , ,
(५) चार पिछली दाढे	२४ , ,	३० , ,
०	०	०	०

एक वर्ष की अवस्था में बच्चे के	दर्शात होने चाहिए
झेड़ वर्ष	१२ "
दो वर्ष	१६ "
दाहि वर्ष	२० "

इन दृतों के निकलने के क्रम में कभी कभी कुछ अन्तर भी पढ़ जाता है।

यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो तो उसे दूर्त निकलने के समय कोई कष्ट नहीं होता। प्रायः दूर्त निकलने के समय बच्चों को कुछ बुखार हो जाया करता है। यदि यह बुखार २४ घण्टे से अधिक रहे और उसके बाद बढ़े तो डॉक्टर को दिखलाना चाहिए।

दाँत निकलने में कष्ट—साधारणतः दाँत निकलने के समय बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता। पर कभी कभी कुछ ऐसे लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं जिनसे यह सूचित होता है कि बच्चे के मुँह में किसी प्रकार का कष्ट है या उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।

बच्चों को अनेक प्रकार के जो साधारण रोग हुआ करते हैं, उनके सम्बन्ध में पुराने ढङ्ग के चिकित्सक प्रायः यही कहा करते हैं कि ये रोग दाँत निकलने के कारण ही होते हैं। पर आज-कल के डाक्टरों का विचार यह है कि दाँत निकलना एक विलक्ष्ण स्वाभाविक कार्य है और उससे बच्चे के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि दाँत निकलने के समय बच्चे का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ जाय तो यह समझना चाहिए कि दाँत निकलने के साथ ही साथ उसे कोई और रोग भी हो रहा है और यह उसी का लक्षण है। आज-कल पढ़े-लिखे लोगों का भी विश्वास है कि दाँत निकलने के कारण बच्चे को दुखार, हसकी खासी या दस्तों आदि की शिकायत हो ही जाया करती है। इसलिए पहले कई दिन तक लोग इन रोगों का कोई इलाज नहीं करते और यही समझते हैं कि ये सब अस्थायी लक्षण हैं और दाँत निकलने के कारण ही उत्पन्न हुए हैं।

(१) उपयोगी सूचनायें—दाँत निकलने के समय बच्चे के मुँह से प्रायः लार टपकती है। ऐसी अवस्था में उसकी छाती पर गही बांध देनी चाहिए और जब एक गही भीग जाय, तब दूसरी बदल देनी चाहिए।

(२) यदि हर बार दाँत निकलने के समय बच्चे को कोई कष्ट होता हो तो उसकी आवहना बदल देनी चाहिए, उसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। इससे उसका स्वास्थ्य सुधर जायगा और दाँत निकलने के समय उसे जो कष्ट होता है, उससे वह बच जायगा।

(३) यदि बच्चा कुछ बीमार हो जाय तो केवल दाँत निकलने को ही उसका एक-मात्र कारण नहीं समझ लेना चाहिए। दाँत निकलने के कारण मसूड़ों में जो ददे होता है, यदि उस दर्द के कारण बच्चा

दूध न पी सकता हो तो जातियों में से दूध निकालकर चम्मच की सहायता से उसे पिलाना चाहिए ।

(४) बाज़ार में कई तरह के शरबत और चूर्ण बिकते हैं जिनके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इनके व्यवहार से बच्चों के दृष्टि बहुत सहज में निकल आते हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं होता । ऐसी दवाओं का कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए । जिस दवा के बारे में यह पता ही न हो कि वह किन चीज़ों से बनी है, अपने बच्चे पर कभी उसकी परीक्षा मत करो ।

चेचक का टीका और उसका इतिहास—जब पहले लोगों को यह पता चल गया कि एक बार चेचक निकल छुकने पर आदमी सदा के लिए इस रोग से बच जाता है, तब संसार के भिन्न भिन्न भागों में लोग इस बात की जाँच करने लगे कि कौन सा देसा उपाय है जिससे कृत्रिम रूप से इस रोग का विष शरीर में पहुँचा कर सदा के लिए मनुष्य की इस रोग से रक्षा की जा सकती है । विद्यना के ग्रो० क्लेमेन्स वान पिर्केंट साहब लिखते हैं कि चेचक का टीका लगाने का सबसे पुराना ढङ्ग वह है जो बहुत आदि-कल से भारत के ब्राह्मण (भारतवासी) काम में लाते रहे हैं । उनका कथन है—“उनके यहीं का चेचक के टीके का ढङ्ग हमारे आज-कल के ढङ्ग से बहुत कुछ मिलता-जुलता है और चीन, अरब तथा सरकेशियन जातियों में जो ढङ्ग प्रचलित है, उनकी अपेक्षा वह कहीं अधिक ध्यान देने चाहिये है । इंग्लैंड के जेनर नामक एक चिकित्सक ने अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में चेचक के टीके का वह ढङ्ग निकाला जो इस समय संसार के सभी सभ्य देशों में माना और काम में लाया जाता है । इस महान् आविष्कार के लिए मानव-जाति पर इस महान् चिकित्सक का जितना अधिक और स्थायी ऋण है, उतना शायद और किसी का नहीं है । चेचक के टीके के सम्बन्ध में अब तक माता-पिताओं में अनेक प्रकार के मिथ्या अमैले हुए हैं । पर जब बच्चे को यह रोग हो जाता है और उसके प्राण

संकट में पड़ जाते हैं, सब उन लोगों को तुरन्त अपनी भूल मालूम हो जाती है। यद्यपि चेचक के टीके के कारण मानव-जाति का बहुत अधिक कल्याण हुआ है, परं फिर भी लोग टीक समय पर बच्चे को चेचक का टीका नहीं लगावाना चाहते। इससे बच्चे की जान पर आ बनने का भय होता है। यदि एक वर्ष से कम अवस्था के बच्चे को चेचक का टीका न लगा हो और इस बीच मे उसे छोटी मात्रा निकल आवे, तो यह बात प्रायः निश्चित है कि वह मर जायगा। और पाँच वर्ष से कम अवस्था बाले ऐसे बच्चों में से प्रायः आधे बच्चे मर जायेंगे। जो थोड़े से बच्चे भी रहेंगे, वे शायद अन्धे हो जायेंगे। केवल टीका लगाने से ही चेचक से रक्षा हो सकती है।

यदि पास-पड़ोस मे किसी को मात्रा या चेचक निकले से वहाँ के सब लोगों को फिर से टीका लगावाना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग पहले टीका लगवा तुके हों, उन्हे भी लगवा लेना चाहिए। उस समय जो कुछ थोड़ी बहुत झंझट होगी, उसके सिवा फिर उन्हे और कोई झंझट न सहनी पड़ेगी। अस्पतालों में जो डाक्टर और दाह्यर्या आदि चेचक के रोगों की चिकित्सा या सेवा-शुभ्रूषा करती हैं, उनकी रक्षा केवल टीका लगावाने से और दोबारा टीका लगावाने से ही होती है।

यदि पास में कहीं किसी को चेचक निकली हो तो बच्चे को जहाँ तक जल्दी हो सके, टीका लगवा देना चाहिए। यदि बच्चे का स्वास्थ टीक न हो और पास-पड़ोस में कहीं चेचक भी न फैली हो से टीका लगावाने का काम तब तक टाला जा सकता है जब तक बच्चा पूरी तरह से अच्छा न हो जाय।

चेचक के टीके से होनेवाली बीमारी—टीका लगावाने के पाँचवें दिन बच्चे को कुछ थोड़ा सा ज्वर चढ़ता है और उसके बाद तीन चार दिन तक जना रहता है। वह कुछ क्रोधी और चिढ़चिढ़ा हो जाता है और रात को चैन से नहीं सोता। कभी कभी कुछ दस्त भी आने लगते हैं और नवे या दसरे दिन उसकी बांह कुछ सूज आती है;

वह स्थान कुछ लाल हो जाता है और जलने लगता है। टीके के निशान के चारों ओर एक हँच या इससे कुछ अधिक दूरी तक वह सूजन बढ़ती है। पर धीरे धीरे ये सब बातें जाती रहती हैं और यह डर की कोई बात नहीं होती। यदि गरदन या बगल की गिलिटर्या कुछ बढ़ जायें तो भी कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। ज्यों ही शरीर मे से टीके का ज़ेर कम होगा, त्यों ही गिलिटर्या भी अपने पुराने रूप मे हो जायेंगी। इसलिए जब तक डाक्टर कोई दवा देने के लिए न कहे, तब तक माताश्री को उचित है कि वे बच्चे को इस बीच में कोई दवा न दें। उन्हे केवल इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि कोई गन्दी चीज़ टीके के निशानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए और बच्चे की बाह घर कोई चेट-चेट नहीं लगनी चाहिए। जयर जो खुरंड जमे हुए हों, उन्हे कभी छेड़ना नहीं चाहिए। वे आप से आप गिर जायेंगे। जब बच्चा दस वर्ष का हो तब या उसके कुछ ही बाद उसे फिर से टीका लगवा देना चाहिए।

बच्चे का स्नायु-सम्बन्धी स्वास्थ्य—मस्तिष्क का अच्छी तरह से विकास होने—बढ़ने-फूलने—के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि आस-पास की परिस्थिति बहुत ही शान्तिपूर्ण और सुखद हो। और कोई ऐसी बात न होने पावे जिससे झनावश्यक उत्सेजना या आवेश उपज़ हो।

कुछ लोग बच्चों के साथ खेलते समय उन्हे बहुत अधिक हँसाते हैं और अनेक प्रकार के इश्य दिखाकर, शब्द सुनाकर और चेष्टाएँ कर के उन्हें इतना उत्सेजित करते हैं कि वे किलकारी मारकर हँसते और चिल्लाने लगते हैं जिससे ऊपर से देखने से यह जान पड़ता है कि वे प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसी बातों से माता-पिता और देखनेवाले दूसरे लोगों को भले ही बहुत आनन्द आता हो, पर यह निरचय है कि इन बातों से बच्चों के स्नायुओं पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। **विशेषतः** यदि सन्ध्या के समय इस प्रकार की बातें की जायें तो इनसे

बच्चों को और भी अधिक हानि पहुँचती है। बच्चों को प्रायः शान्त रखना ही अच्छा होता है और कम से कम बच्चे की आवस्था के एहले वर्ष में तो इस प्रकार के खेल-तमाशे आदि बिलकुल ही न होने चाहिए।
(होल्ट का मत)

बच्चे को चरित्रवान् बनाना—बहुत कम माता-पिता ऐसे होने हैं जो बहुत बचपन में ही बच्चे की मानसिक स्थिरता की नींव रखने की आवश्यकता समझते हैं। इस प्रकार की मानसिक साम्य स्थिति पर ही आगे चलकर बच्चे के चरित्र की दृढ़ता निर्भर करती है। जैसा कि डा० गेसेल ने कहा है—“जिस प्रकार नींव और चौखटे आदि से किसी मकान का स्वरूप निश्चित होता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे के जीवन के आरम्भ के वर्षों में उसका चरित्र निश्चित होता है।” आरम्भ के छु: वर्षों में ही बच्चे की सब आदतें बन या बिगड़ जाती हैं और इन्हीं आदतों से चरित्र बनता या बिगड़ता है। प्रायः माता-पिता ये बातें जानते ही नहीं; और यदि उनमें से कुछ लोग ये बातें जानते भी हैं तो वे भी ऐसी महत्व की बात की ओर विशेष ध्यान नहीं देते। पर यह बात ऐसी है जो बच्चे के स्वस्थ और पूर्ण विकास का एक बहुत बड़ा अंग है। यदि वे यह समझते हों कि चरित्र सुधारने की शिक्षा बच्चे को कहाँ और जगह से या बाहर से मिलेगी तो वे बड़ी मूल करते हैं। बच्चे के चरित्र पर ही उसका भावी कल्याण बहुत कुछ निर्भर करता है और उसका यह चरित्र केवल उसके माता-पिता ही बना सकते हैं। बच्चे के आगले जीवन में जो सफलता या विफलता होती है, यदि उसके मूल का पता लगाया जाय तो वह मूल घर के आरम्भिक जीवन की शिक्षा में ही मिलेगा और उसके लिए मुख्य रूप से माता-पिता ही उत्तरदायी हैं। इस विषय में माता पिता को बच्चों के सामने स्वयं एक बहुत अच्छा आदर्श उपस्थित करना चाहिए। बच्चों का चरित्र बनाने में यह बात अधिक महत्व की है। उसे आरम्भ से ही आलगौरव, आशाकारिता, आत्म-निर्भरता, सत्यता, स्वार्थत्याग और

सेवा-भाव आदि का बहुत बड़ा महत्व बतलाना चाहिए। इसके विपरीत अनाज्ञाकारिता, आत्म-निरोध का अभाव, स्वार्थपरता और इसी प्रकार की दूसरी बुरी प्रवृत्तियों का बिलकुल आरम्भ में ही नाश कर देना चाहिए। बच्चे के चरित्र का विकास करने में घर के उदाहरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। घर की शान्ति का भी कुछ कम महत्व नहीं है। इससे बच्चे में मन की शान्ति और सामंजस्य आदि का भाव उत्पन्न होगा। पर यदि घर में माता-पिता और दूसरे सम्बन्धियों आदि में प्रायः लड़ाई-मराड़ा हुआ करता हो तो उससे बच्चे में भी अनिश्चितता और लापरवाही आदि बातें आ जाती हैं। यदि बच्चों को बराबर भिन्न-भिन्न की मिला करे तो वे हर एक बात का दुर्बाव अपने मन में रखने लगते हैं। इससे वे बहुत दुःखी रहने लगते हैं और उनकी जीवनी शक्ति बहुत घट जाती है, जिसके कारण आगे चलकर कभी कभी उनका मस्तिष्क बहुत दुर्बल हो जाता है। बच्चे के केवल शारीरिक कल्याण का ही ध्यान रखने से काम नहीं चलता, बल्कि माता-पिता का यह भी कर्त्तव्य है कि वे उसकी आत्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति किया करें। बचपन में ही इन सब बातों का पूरा पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जिसमें आगे चलकर उसका बहुत अच्छा और दृढ़ मानसिक तथा नैतिक विकास हो। बच्चे की निरीचणशक्ति, विवेक, स्मरणशक्ति, इच्छाशक्ति तथा उसके भावों और आत्मा को बलवान् बनाना चाहिए जिसमें वह अच्छी और सुन्दर बातों का आदर करके उन्हे प्रहरण कर सके। बच्चे की आत्मिक शिक्षा के अन्तर्गत यही सब बातें आती हैं।

बच्चे का चरित्र बनाने में घर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण-प्रभाव परिस्थितियों का पड़ता है। यह एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि किसी आदमी का अच्छा या बुरा होना उसके संगी-साथियों से ही जाना जाता है। इसलिए माता-पिता का यह एक बहुत महत्व-पूर्ण कर्त्तव्य हो जाता है कि वे ध्यानपूर्वक उन परिस्थितियों आदि को देखते रहें जिनमें

धर के प्रभाव-क्षेत्र के बाहर बच्चा रहता है। अर्थात् वे उसके संग-साथ आदि पर पूरा पूरा ध्यान रखें। यदि वह अबाधित स्थप से बुरे लड़कों के साथ रहने दिया जायगा तो धर की शिक्षा के सभी अच्छे प्रभाव नष्ट हो जायेंगे और उसके चरित्र के उचित विकास में बहुत बड़ी बाधा पड़ जायगी।

यदि सभी बातों में बच्चे को मनमाना काम करने दिया जायगा तो फिर न तो उसमें आत्मनिरोध की शक्ति रह जायगी और न अपने से बड़े और श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति उसके मन में कोई आदरभाव ही रह जायगा। बड़े होने पर ऐसे बच्चों से माता-पिता को बहुत ही कष्ट और सन्ताप पहुँचता है। इसलिए यह बात बहुत ही आवश्यक है कि माता-पिता आरम्भ से ही इस सम्बन्ध में बच्चे पर पूरा पूरा नियन्त्रण रखें। बच्चे को सुधारते समय उसे कभी मिड्की-धुड़की या मारने-पीटने की धमकी नहीं देनी चाहिए। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि बच्चों को ठीक तरह से शिक्षा आदि देने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि उसके माता-पिता बहुत ही स्वच्छतापूर्वक रहें, उसे बराबर सज्जन और योग्य बनाने का प्रयत्न करें, उसके सान-पान की बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्था करें और दृढ़तापूर्वक उनका परिचालन करें।

बुरी आदतें

आरम्भिक सूचनायें — जीवन के आरम्भिक वर्षों में और विशेषतः आरम्भ के छः वर्षों में ही बच्चों की आदतें बनती बिगड़ती हैं। अच्छी आदतों की अपेक्षा बुरी आदतें जल्दी पड़ जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना माता-पिता का कर्तव्य है कि आरम्भ में ही बच्चों को बुरी आदतें न पड़ जायें। इस प्रकार की बुरी आदतों को रोकने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि उन आदतों का विकास ही न होने

दिया जाय—उन्हे आरम्भ मे ही नष्ट कर दिया जाय। यही बात हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ज्यो ही बच्चे मे कोई बुरी आदत देखी जाय, तो ही वह रोक दी जानी चाहिए।

जो बच्चा बिलकुल अकेला रहता है, वह प्रायः ख़राब आदते सीख लेता है। पर जो बच्चा और कई बच्चों के साथ रहता है, वह प्रायः आमोद-प्रमोद मे लगा रहता है और इसलिए उसके बुरी आदते सीखने की कम सम्भावना रहती है। इसलिए माता पिता के उचित है कि वे ऐसी व्यवस्था करे जिसमे उनके बच्चों को अच्छे लड़कों की सेह-बत मे रहने का अवसर मिले और वे अच्छी अच्छी बातों मे लगे रहे। बच्चों को सुधारने की वजिट से मारना पीटना या और कोई दण्ड देना न तो उचित ही है और न आवश्यक ही। पर हाँ कुछ ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब कि उन्हे केवल सजाह देने की अपेक्षा कुछ अधिक कठोर उपायों का अवलम्बन करना पड़ता है। पर माता-पिता के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि वे बच्चों को प्रेमपूर्वक और सतर्क होकर ही सब बाते समझावें बुझावे।

मिट्टी खाना— प्रायः बच्चे मिट्टी खाते हुए देखे जाते हैं। युरानी बदहजमी या बार बार मलेरिया ज्वर के कारण जिन बच्चों का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, उनमे यह आदत बहुत अधिक देखी जाती है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिलकुल स्वस्थ होते हुए भी मिट्टी खाते हैं। यदि आरम्भ मे ही इस आदत को रोकने का प्रयत्न न किया जाय तो यह आदत महीनों क्या बल्कि बरसों तक बनी रहती है। मिट्टी खाने से बच्चे का चेहरा पीला पढ़ जाता है, वह बोदा हो जाता है और उसका पेट बढ़ जाता है। स्वस्थ बच्चों के चेहरे पर जो चमक और गुलाबी झ़त होनी चाहिए, उसका उसमे अभाव होता है। जो बच्चे मिट्टी खाया करते हैं, उनकी भूख बिलकुल मारी जाती है, उन्हे ठीक तरह से पाखाना नहीं होता और कठिन्यत बनी रहती है। ऐसे बच्चों का स्वभाव भी चिह्नित होता है।

जाता है। उन्हें अच्छी तरह से नींद नहीं आती और वे सोये सोये खैंक रठते हैं। उनके शरीर का बजून साधारणतः बढ़ने के बदले दिन पर दिन घटने लगता है। माताओं को उचित है कि जब वे अपने बच्चे में मिट्ठी खाने की आदत देखें, तब डाक्टर से उसके स्वास्थ्य की परीक्षा करावें।

इस बुरी आदत से कोई बहुत भारी हानि नहीं होती, क्योंकि साधारणतः चिकित्सा करने से यह दूर हो जाती है। यह आदत प्रायः उन्हीं बच्चों को पड़ती है जो अपने आस-पास के स्थानों को पसन्द नहीं करते; इसलिए यदि उन्हें पुराने स्थान से हटाकर किसी नये और अच्छे स्थान पर रखा जाय तो यह आदत जल्दी छूट जाती है। लड़के को सदा प्रसन्न और किसी काम में लगाये रखना चाहिए जिसमें उसे मिट्ठी खाने का अवसर ही न मिले। ज्यों ही बच्चे में यह आदत देखी जाय, तो ही यदि उसे इस प्रकार रोकने का प्रयत्न किया जाय तो यह जल्दी छूट जाती है। पर यदि यह आदत महीनों बनी रही तो फिर उसे छुड़ाना सहज नहीं होता। यह आदत प्रायः उस समय लगती है जब बच्चा दो बरस का हो जाता है। और जब वह तीन या चार बरस का हो जाता है और संसार की और और बातों में लगने लगता है, तब यह आदत आपसे आप छूट जाती है। कुछ बच्चों में तो यह आदत कुछ बड़े होने तक या पूर्ण वयस्क होने तक भी बनी रहती है।

दाँत पीसना—यह एक दूसरी बुरी आदत है। प्रायः बच्चे सोने की दशा में दाँत पीसते हुए देखे जाते हैं। इसका कारण या तो अनुपयुक्त भोजन के कारण होनेवाली बदहजुमी होती है और या पेट में कीड़ों का होना। माताओं को उचित है कि वे व्यानपूर्वक बच्चे का पाख़ाना देखा करें और बच्चे का ठीक ठीक इलाज करावें। अधिकांश अवस्थाओं में बच्चे के भोजन में विचारपूर्वक परिवर्तन करने से ही यह बात दूर हो जाती है।

नाखून कुतरना—जब कभी बच्चे को दाँत से नाखून कुतरते हुए देखा जाय, तो इसे दूर करने का सबसे सहज उपाय यह है कि

बच्चे के नाखूनों पर कुनीन का घोल या इसी प्रकार का और कोई कड़वा पदार्थ लगा दिया जाय ।

अँगूठा चूसना—जब बच्चा अँगूठा चूसता हुआ देखा जाय, तब उसे तुरन्त रोक देना चाहिए, नहीं तो उसे इसकी आदत ही पढ़ जायगी । यदि बच्चे मे इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाय तो उसके अँगूठे और डंगलियों पर पुखुआ या इसी प्रकार का और कोई कड़वा पदार्थ लगा देना चाहिए । उस उसके कड़वे स्वाद के कारण ही बच्चा अँगूठा चूसना छोड़ देगा ।

नक़ल उतारना—बच्चों मे प्रक छुरी आदत यह भी पढ़ जाती है कि वे दूसरे लोगों की नक़लें उतारने लगते हैं । ज्यों ही उनमे यह बात देखी जाय, त्यों ही रोक दी जानी चाहिए ।

हक्लाकर बोलना—प्रायः दूसरो की नक़ल उतारने के कारण बच्चों को इसकी भी आदत पढ़ जाती है ।

नाक से गुनगुना कर बोलना—बच्चों को यह आदत भी नहीं पढ़ने देनी चाहिए ।

चुसनी चूसना—बच्चे प्रायः चुसनी चूसते हुए देखे जाते हैं । माताये बच्चे के हाथ से चुसनी छीनकर सहज में उनकी यह आदत कुड़ा सकती है । यह स्मरण रखना चाहिए कि चुसनी चूसने से प्रायः च्य-सरीखे भीषण रोग हो जाते हैं जिनका बचपन में कोई इलाज ही नहीं हो सकता । बच्चों के गले मे जो बांटी बढ़ आती है या अन्दर की जो गिलिर्धा सूज जाती है, वह कभी कभी इसी आदत के कारण होती है । कुछ बच्चों मे यह छुरी आदत पढ़ जाती है कि जब तक उन्हें कोई दूसरा आदमी न खिलावे, तब तक वे खाते ही नहीं । इस आदत को रोकने के लिए बीच मे कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार और भी बहुत सी छुरी आदते हैं जिनका पूरा पूरा वर्णन नहीं हो सकता और जिनका कई प्रकार से बच्चे के स्वास्थ्य और चरित्र पर

बहुत दुरा प्रभाव पड़ता है। ज्यो ही इस प्रकार की दुरी आदतें देखने में आवें, तो ही उन्हें रोक देना चाहिए।

परिवार के डाक्टर—पश्चात देशों में यह प्रायः देखा जाता है कि हर परिवार का एक विशेष डाक्टर होता है। इस प्रकार एक विशिष्ट डाक्टर रखने से जो लाभ होते हैं, उन्हें वे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कहते हैं कि चीन में परिवार के डाक्टर को बीमारी रोकने और घर के लोगों का स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए ही कुछ धन दिया जाता है। यह नहीं होता कि जब कोई बीमार पड़े, तभी डाक्टर को कुछ मिले। इस प्रथा से बहुत से लाभ होते हैं; क्योंकि परिवार का डाक्टर केवल एक विश्वसनीय डाक्टर ही नहीं रहता, बल्कि परिवार का मित्र भी हो जाता है। ज्यो ही घर में किसी के स्वास्थ्य में कुछ भी ख़्राबी दिखाई पड़े, तो ही उससे काम लिया जा सकता है। कोई विशेष आवश्यकता पड़ने पर डाक्टर को बुलाने या दिखलाने में जो व्यय पड़ता है, उसकी अपेक्षा परिवार का एक डाक्टर बना लेने में व्यय भी कम ही पड़ता है। जो डाक्टर किसी परिवार में प्रायः आता-जाता रहता है, वह उस परिवार के सब लोगों के शारीरिक संगठन और पैचिक तथा अर्जित रेगों आदि से इतना अधिक परिचित हो जाता है कि दूसरे डाक्टरों की अपेक्षा उसका काम बहुत सहज हो जाता है और उसे सफलता भी अधिक होती है। भारत में प्रायः पारिवारिक डाक्टर रखने की प्रथा नहीं है। अधिकांश लोग उसी समय डाक्टर के पास जाते या उसे बुलाते हैं, जब उनका अपना अनादीपन का इलाज कुछ काम नहीं करता और जब वे जीवन और मरण के मध्य की अवस्था में पहुँच जाते हैं। साधारणतः यह बात सभी अवस्थाओं में और विशेषतः बच्चे के स्वास्थ्य का प्रश्न उपस्थित होने की दशा में बहुत मूल की है। बच्चों का जीवन बहुत ही कोमल होता है और यदि उनके रोग की उपेक्षा की जाय तो वे जलदी ही मर सकते हैं। पर यदि उनका ठीक तरह से इलाज किया जाय तो उनका

जीवन बहुत सहज में बच सकता है। वयस्क पुरुषों की अपेक्षा बच्चों पर ठीक ठीक दवाओं का इतना अच्छा और जलदी प्रभाव पड़ता है कि जहाँ बच्चे के प्राण बचने की बहुत ही कम आशा रहती है, वहाँ भी दवा का प्रभाव देखकर स्वयं डाक्टरों को बहुत अधिक आश्चर्य होता है। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य और रक्षा की हाइट से भी और किफायत के विचार से भी परिवार के लिए पुक डाक्टर रखना बहुत ही अच्छा और लाभदायक होता है। जहाँ कोई असाधारण लक्षण दिखाई पड़े, वहाँ यदि तुरन्त उसकी उचित चिकित्सा की जाय तो बच्चे का रोग भीषण रूप नहीं धारण करने पाता और वह बलवान् तथा हृष्प-पुष्ट रहता है। बच्चों का इलाज टालना बहुत ही धातक होता है। केवल समय पर इलाज न होने के कारण ही बहुत से बच्चों के रोग बहुत भीषण रूप धारण कर लेते हैं और कुछ बच्चे तो उन रोगों से मर भी जाते हैं। पेटेण्ट दवाओं के सम्बन्ध में न तो यही पता रहता है कि वे किन चीजों से बनी होती हैं और न उनका प्रभाव या गुण ही ज्ञात होता है। पर कुछ लोग डाक्टर की फ़ीस बचाने के लिए हन्हीं पेटेण्ट दवाओं का व्यवहार करते हैं, जिसका प्रायः बहुत ही धातक परिणाम होता है। ऐसे लोगों को आप ही यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि बच्चे के जीवन का मूल्य डाक्टर की फ़ीस से अधिक है या नहीं।

यह जानने के लिए कि बच्चा शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से ठीक तरह से उन्नति कर रहा है या नहीं, बच्चे की साल में दो बार किसी डाक्टर से परीक्षा करा लेना बहुत ही लाभदायक होता है। यदि उसमें कोई असाधारण बात दिखाई पड़ेगी तो डाक्टर ठीक समय में उसे सुधार लेगा अथवा माता-पिता को यह सूचना दे देगा कि बच्चे का जीवन किस प्रकार नियमित और व्यवस्थित किया जाना चाहिए। बच्चे के भोजन, कसरत, कपड़े, स्नान आदि अर्थात् उसके जीवन की सभी बातों का पूरा पूरा विचार करना होगा और

समय रहते ही उपयुक्त उपायों का अवलम्बन करना होगा। अन्त में इससे माता-पिता लाभ में ही रहेंगे और उन्हें इस बात का इतमीनान हो जायगा कि बच्चे के स्वास्थ्य की अनुपयुक्त भोजन आदि के प्रभाव से श्रीक तरह से रक्षा हो रही है।

परिवार के लिए डाक्टर बहुत ही सचेत होकर और सावधानी से जुनना चाहिए। पर जब एक बार कोई डाक्टर जुन लिया जाय, तब उसके निर्णय और चिकित्सा पर पूरा पूरा विश्वास और भरोसा रखना चाहिए; क्योंकि डाक्टर की चिकित्सा में सफलता होने के लिए उसकी योग्यता पर पूरा पूरा विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है।

आज दिन तक भारत में एक बहुत बड़ी सीमा तक केवल विश्वास के बल पर चिकित्सा करने की प्रथा अचित्त है। इसकी जड़ में एक विशेष मनोविज्ञान भरा है। विश्वास से मन बलवान् होता है और मन का शरीर पर रोग की दशा में भी और स्वस्थ रहने की दशा में भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विशेषतः जब कि रोग का कारण मानसिक या आलिमक होता है, तब विश्वास की चिकित्सा का इतना अधिक आश्चर्यजनक प्रभाव देखने में आता है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि रोग के अच्छे होने में भय, चिन्ता आदि जो भाव और परिस्थितिया रुकावट होती है, वे परिस्थितियां इस विश्वास के कारण आपसे आप दूर हो जाती हैं। प्रायः बहुत से शारीरिक रोग इस इड़ विश्वास के कारण ही अच्छे हो जाते हैं। पर इस विश्वासवाली चिकित्सा की भी कुछ सीमा है। जब शरीर का रोग इतना बढ़ जाय कि रोगी अपने विश्वास का उपयोग करने में समर्थ ही न रह जाय, तब इस प्रकार के विश्वास की चिकित्सा का कुछ भी फल नहीं होता।

यह भी हो सकता है कि किसी परिवार में कुछ ऐसे घातक प्रभाव काम कर रहे हों जिनका उस परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर जुरा परिणाम होता हो। जब परिवार के लिए एक डाक्टर नियत और

निश्चित कर लिया जाता है, तब इस प्रकार के प्रभाव सहज में दूर किये जा सकते हैं। जब घर के सब लोग उस पर विश्वास रखने लगते हैं, तब उसकी स्थिति बहुत दृढ़ हो जाती है और लोगों को अपनी रक्षा का पूरा पूरा विश्वास हो जाता है। इस विश्वास के कारण रोग के बाल अच्छा ही नहीं हो जाता, बल्कि सदा के लिए नष्ट हो जाता है। अपनी रक्षा के इस विचार का जो मूल्य या महत्त्व होता है, वह प्रायः साधारण आदमी नहीं समझते। परं फिर भी बहुत से लोग इसके लाभदायक प्रभाव देखते और उनका अनुभव करते हैं। यह भी वैसा ही है जैसा ईश्वर अथवा मनुष्य पर होने-वाला विश्वास। इस प्रकार के विश्वास से कल्पित और वास्तविक सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं और जीवन का भार बहुत कुछ हल्का हो जाता है।

जब डाक्टर यह समझता है कि यह सारा परिवार मेरे ही निर्णय और परामर्श पर निर्भर करता है, तब वह अपने कर्तव्य का पालन बहुत ही उत्सुकता और निष्ठा या ध्यान के साथ करता है। परं जब वह समझता है कि इन लोगों का मुक्त पर कोई विशेष विश्वास नहीं है और ये यों ही मुक्तसे अपना काम चला रहे हैं, तब वह भी यों ही अपना काम चलता करता है। यदि रोग भीषण रूप धारण कर ले तो किसी दूसरे अच्छे डाक्टर या विशेषज्ञ की व्यवस्था भी उसी के द्वारा करानी चाहिए और उसी के द्वारा परामर्श लेना चाहिए। बिना उस डाक्टर से कहे और उसके पीछे कभी किसी दूसरे डाक्टर को बुलाकर नहीं दिखलाना चाहिए और न उसकी सलाह लेनी चाहिए। डाक्टर के प्रति तो यह व्यवहार सज्जनोचित होता ही नहीं, परं इससे स्वयं रोगी को भी बहुत ही कम लाभ पहुँचता है। इसका कारण यह है कि नया डाक्टर अपने ही ढंग से इलाज करना शुरू करता है और उसे यह पता ही नहीं चलता कि पहले इस रोगी की किस प्रकार चिकित्सा हुई है।

सारे संसार में यह देखा जाता है कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए डाक्टर को हौशा बना देते हैं। यदि बच्चा खाने-पीने की चीज़ या दवा आदि नहीं खाता तो उससे कहा जाता है कि तुम तुरन्त इसे खा लो; नहीं तो डाक्टर साहब तुमको मारेंगे या कोई दंड देगे। इस प्रकार की धमकियाँ देना बहुत बुरा है। पुलिस के सिपाही से भी बच्चे उतना नहीं डरते जितना उन्हे बेचारे डाक्टर से डराया जाता है। माता-पिता के लिए उचित तो यह है कि वे बच्चे के मन में डाक्टर के प्रति आदर और भ्रम का भाव उत्पन्न करें। पर वे ऐसा न करके बच्चे के मन में उसके प्रति दुर्भाव उत्पन्न कर देते हैं। बच्चों की चिकित्सा करनेवाला डाक्टर उनका सबसे अच्छा मित्र होता है, और बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वे उसे अपना सबसे अच्छा मित्र समझा करें।

नवाँ प्रकरण

बच्चों की उचित बृद्धि और विकास

माता के प्रति—इस प्रकरण में यह बतलाया जायगा कि साधारणतः उचित रूप से बच्चे के शरीर की किस प्रकार बृद्धि और विकास होना चाहिए। इसमें ऐसी बातें बतलाई गई हैं जिनका आधार बहुत दिनों का निरीक्षण और अनुभव है। इन सब बातों को जान लेने के बाद तुम्हारे लिए यह सम्भव हो जायगा कि तुम सहज से यह समझ सको कि तुम्हारे बच्चे का जैसा चाहिए, वैसा विकास हो रहा है या नहीं। इसलिए इस प्रकरण में बतलाई हुई बातें तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिएँ; और यदि तुम्हारे बच्चे में कोई असाधारण बात दिखलाई पड़े तो तुम्हें तुरन्त डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

विषय-प्रवेश—इस प्रकरण में यह बतलाया जाता है कि बच्चे के शरीर का साधारणतः कब, कितना विकास होना चाहिए, वह कब कितना बढ़ना चाहिए। सब बच्चों के शरीर की बृद्धि और विकास पृक्सा नहीं होता और सबसे बहुत अधिक अन्तर देखने में आते हैं। पर किर भी यहाँ जो बाते बतलाई जाती हैं, वे सारे ससार में बहुत अधिक बच्चों की जांच और परीक्षा करके निश्चित की गई हैं। इसलिए माता-पिता के मार्ग-दर्शन के लिए ये बहुत ही विश्वसनीय हैं।

उच्चाई—नया जन्मा हुआ बच्चा प्रायः २० हंच लम्बा होता है और पहले वर्ष प्रतिमास प्रायः है इच बढ़ता है। अर्थात् पहले

एक वर्ष से वह औसत ९ हँच बढ़ता है। इस प्रकार जब बच्चा एक वर्ष का होता है, तब वह २६ हँच लम्बा होता है। दूसरे वर्ष औसत ४ हँच, तीसरे वर्ष प्रायः ५ त्रूट हँच और चौथे वर्ष तीन हँच लम्बाई बढ़ती है। पांचवे वर्ष से लेकर लड़कियों में भारहर्वें वर्ष तक और लड़कों में तेरहर्वें वर्ष तक प्रतिवर्ष दो हँच लम्बाई बढ़ती है। इसके बाद दोनों का यौवन-काल आरम्भ होता है जिसमें वे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं।

यदि माता-पिता लम्बे होते हैं तो उनकी सन्तान भी प्रायः लम्बी होती है; और यदि वे नाटे होते हैं तो सन्तान भी नाटी होती है। यदि बच्चे को ठीक तरह से पोषक भोजन न मिले तो उसकी बाढ़ कम होती है।

तौल—जन्म के समय बच्चों की चैचाई तो प्रायः कम या अधिक भी होती है, पर तौल में प्रायः सभी बच्चे औसत ७ पारंड या ८ त्रूट सेर होते हैं। जो दो बच्चे एक साथ उत्पन्न होते हैं, अथवा जो बच्चे ठीक समय से पहले ही पैदा होते हैं, वे तौल में इसकी अपेक्षा बहुत कम होते हैं। यदि जन्म के समय बच्चा तौल में ६ पारंड या तीन सेर से कम हो तो माता-पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के अधिकाश बच्चे वही होते हैं जो समय से पहले ही पैदा होते हैं और जिनके पालन-पोषण में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह एक नियम है कि लड़कों की अपेक्षा लड़किया तौल में कम होती है। नाटे आदमियों की सन्तान भी तौल में कम होती है। जन्म लेने के कुछ ही दिनों के अन्दर बच्चे तौल में कुछ घट जाते हैं। यह कभी जाकर दसवें दिन तक पूरी हो जाती है और तब उसके बाद वे तौल में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। पांचवे महीने के अन्त में बच्चे की तौल जन्म-समय की तौल से दूनी हो जानी चाहिए। यदि जन्म के समय बच्चा तौल में ७ पारंड हो तो पांचवें महीने के अन्त में वह १४ पारंड का हो जाना चाहिए।

इसी प्रकार बारहवें महीने वह तौलते में तिगुना और दो वर्ष में चौगुना हो जायगा।

बच्चे को बराबर ध्यानपूर्वक तौलते रहना चाहिए और उसका ठीक लेखा रखना चाहिए। इससे यह ठीक ठीक अनुमान किया जा सकता है कि उसकी उच्चति या विकास किस ढंग से हो रहा है। आरम्भ के कुछ महीनों में बच्चे को प्रति सप्ताह तोलना चाहिए और उसके बाद महीने में दो बार। यदि उसकी बाढ़ सन्तोषजनक हो तो फिर महीने में एक बार तोलना चाहिए। पर यदि उसकी बाढ़ ठीक तरह से न होती हो तो उसे बीच बीच में जल्दी जल्दी तोलना चाहिए।

सिर का घेरा—बच्चे के सिर का घेरा नापने का जो महत्त्व और मूल्य है, वह माता-पिता प्रायः समझते ही नहीं या बहुत कम समझते हैं। साधारणतः जन्म के समय वह १३ इंच होना चाहिए। नाप ठीक मस्तक की सतह से लेनी चाहिए। यदि सिर का घेर तेरह इच्छ से बहुत कम हो तो बच्चे की मानसिक विकास से बहुत दुर्बल होने की सम्भावना रहती है और इसके लिए माता-पिता को आरम्भ से ही सावधान रहना चाहिए। यदि घेरा इससे बहुत बड़ा हो तो हाक्टर को दिखलाना चाहिए, क्योंकि यह रोग की अवस्था का लक्षण है, और यदि इसकी उपेक्षा की जायगी तो यह आगे चलकर भीषण रूप धारण करेगा। एक वर्ष की अवस्था में सिर का घेरा प्रायः १८ इंच होता है। पहले वर्ष में सिर बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता है। पहले वर्ष के अन्तिम महीनों में वह हर महीने प्रायः आधे इंच के हिसाब से बढ़ता है। तीसरे वर्ष के अन्त में यह घेरा प्रायः १९ इंच होता है।

दाँत—बीच के निचले दो दाँत छः से नौ महीने के बीच में निकलते हैं और ऊपर के बीच के चार दाँत आठ से बारह महीने के बीच में निकलते हैं। जब बच्चा एक वर्ष का हो जाय, तब उसके छः दाँत होने चाहिएँ। अठारह महीने की अवस्था में उसे बारह,

दूसरे वर्ष के अन्त में सोलह और ढाई वर्ष का होने पर बीस दर्ता होने चाहिए ।

छाती—छातियों की बुँदी की सतह से छाती नापनी चाहिए । पन्द्रह वर्ष की अवस्था तक प्रतिवर्ष एक हंच छाती बढ़नी चाहिए ।

पेट—बचपन में पेट का धेरा भी प्रायः उतना ही रहता है जितना छाती का होता है । दूसरे वर्ष के अन्त में सिर, छाती और पेट तीनों की नाप प्रायः एक समान ही होती है । पर इसके बाद छाती की नाप बाकी दोनों बीजों की नाप की अपेक्षा बहुत तेजी के साथ बढ़ती है ।

दृष्टि—ज्यों ही बच्चा जन्म लेता है, ज्यों ही उसकी दृष्टि ऐसी होती है कि वह अन्धकार और प्रकाश में अन्तर समझ लेता है । वह बहुत चमकीले प्रकाश से बचना चाहता है, क्योंकि उससे उसे कष्ट होता है । इसलिए जिस कमरे में बच्चा रखा जाय, वह कमरा कुछ और धेरा होना चाहिए और उसमें बहुत अधिक प्रकाश नहीं होना चाहिए । बच्चे को बहुत चमकीली रोशनी में नहीं ले जाना चाहिए और न उसकी आँखों पर धूप की किरणें सीधी पढ़ने देनी चाहिए । इन बातों का ध्यान बच्चे के सोने के समय भी रहना चाहिए और जागने के समय भी ।

अपने जीवन में कठे दिन बच्चा दीए पर निगाह जमा सकता है और जिधर दीआ ले जाओ, उधर ही वह भी देखता है । चौथे महीने बच्चा अपने माँ-बाप को देखकर पहचान लेता है और किसी अजनकी आदमी को देखकर कुछ डर-सा जाता है ।

सुनने की शक्ति—जन्म के बाद पहले कुछ दिनों तक बच्चे में सुनने की शक्ति बहुत ही कम होती है । पर उसके बाद धीरे धीरे वह शक्ति बढ़ने लगती है । कुछ महीनों में उसे यह शक्ति बहुत कुछ ग्रास हो जाती है । यदि बहुत साधारण या हल्का शोर भी हो तो उसकी नींद खुल जाती है । तीसरे महीने के अन्त में वह प्रायः उस

ओर अपना सिर बुमा देता है जिस ओर से कोई आवाज़ आती है। बहुत तेज़ शोर से बच्चे को कष्ट होता है, इसलिए आरम्भ के कुछ महीनों में इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि उसके आस-पास बहुत शोर न हो। उसके मस्तिष्क पर ऐसे शोर का जो प्रभाव पड़ता है, वह प्रायः बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि उसके कारण उसके मन में डर समा जाता है।

स्पर्श की शक्ति—नये जन्मे हुए बच्चे के होठों और ज़बान में स्तन से दूध पीने के लिए तो स्पर्श की शक्ति बहुत तेज़ होती है परन्तु साधारणतः और अंगों में उसकी यह शक्ति बहुत ही कम, प्रायः नहीं के समान होती है। पर जब वह तीन महीने का हो जाता है, तब उसके सारे शरीर में स्पर्श की शक्ति आ जाती है।

स्वाद लेने की शक्ति—बच्चे में यह शक्ति बहुत विकसित होती है। जन्म लेने के समय से ही वह समझ सकता है कि कौन सी चीज़ मीठी, खट्टी या कड़वी है। मीठे स्वाद के कारण ही वह स्तनों को चूसने लगता है और यदि उसके मुँह में कोई कड़वी चीज़ लगा दी जाय तो वह मुँह बना लेता है और उसे कष्ट होता है। यदि खाने-पीने की चीज़ों के स्वाद में ज़रा भी अन्तर पढ़ जाय, तो छोटा बच्चा उसे तुरन्त पहचान लेता है, और यदि वह स्वाद उसे अच्छा न लगता हो तो वह स्तन या बोतल में से दूध नहीं पीता, उसके सामने से मुँह हटा लेता है।

गन्ध लेने की शक्ति—जन्म लेने के समय बच्चे में गन्ध लेने की थोड़ी बहुत शक्ति तो रहती ही है, पर आगे चलकर और शक्तियों के अच्छी तरह विकसित होने के बाद बढ़ती है।

बोलने की शक्ति—कुछ बच्चों में तो बोलने की शक्ति बहुत जल्दी आ जाती है और कुछ बच्चों में बहुत देर में आती है। इसलिए इसका कोई निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों प्रायः तीन चार महीने पहले ही बोलने लगती

हैं। साधारणतः बच्चा पहले वर्ष के अन्त में मामा, बाबा, दादा आदि शब्दों का उच्चारण करने लगता है। दूसरे वर्ष के अन्त में वह दो तीन शब्दों को जोड़कर एक छोटा सा वाक्य बनाने के योग्य हो जाता है। इसके बाद उसके बोलने की शक्ति बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है और हर महीने में उसकी विशेष उन्नति दिखाई पड़ती है। साधारणतः वह पहले आदिमियों के नाम लेना सीखता है; चीज़ों के नाम लेना उसे बाद में आता है।

जब माता-पिता देखते हैं कि हमारा बच्चा ठीक तरह से बोलना नहीं सीख रहा है, तब उन्हें चिन्ता होने लगती है। माताये इसका कारण प्रायः यह बतलाया करती है कि बच्चे की जुबान के नीचे की फिल्सी अधिक सटी हुई है और वही उसे बोलने नहीं देती। पर यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि इसके कारण बच्चे के बोलना सीखने में देर नहीं होती। हा इसके कारण उसके दूध पीने में कुछ कुछ बाधा हो सकती है और वह कुछ विशिष्ट शब्दों का उच्चारण नहीं करने पाता। वे ही बच्चे देर में बोलना सीखते हैं जिनका दिमाग़ कुछ कमज़ूर या ख़राब होता है। बोलने का सम्बन्ध तो वास्तव में ध्यान देने से है। यदि बच्चा ठीक तरह से ध्यान देने के योग्य होगा तो वह बोलना भी जल्दी सीख जायगा। यदि यह सम्भेद हो कि बच्चे के कानों में ही कोई ख़राबी है और वह ठीक तरह से नहीं सुन सकता तो किसी डाक्टर को उसके कान दिखाने चाहिए। पर यदि कानों में कोई विशेष या असाधारण बात न हो तो यही समझना चाहिए कि बच्चे में किसी बात पर ठीक तरह से ध्यान देने की शक्ति नहीं है और इसी कारण उसके बोलना सीखने में देर हो रही है।

यदि बच्चे का शरीर बहुत कमज़ूर हो और उसका स्वास्थ ठीक न हो और उसने कोई बड़ी बीमारी भोगी हो तो उसके बोलना सीखने में कुछ देर होती है। पूरी तरह से नीरोग और स्वस्थ हो जाने पर वह साधारण रूप में बोलना सीख लेगा। इसलिए ऐसी अवस्थाओं

मेरी माता-पिता को किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

अंगों का विकास—आरम्भ से बच्चों से पूँछिया रखने और हाथ-पैर पटकने आदि की जो गतिर्थी होती है, वे आपसे आप होती है; वे जान बूझकर नहीं की जाती। ज्यों ज्यों बच्चों की अवस्था बढ़ती है, लोंगों वे अपनी इच्छा से गतिर्थी और अंगों का संचालन करने लगते हैं; जैसे सिर ऊपर उठाना, चीज़ों को हाथों से पकड़ना, बैठना, रेंगना, खड़े होना और चलना आदि।

बच्चा तीसरे या चौथे महीने तक अपना सिर उठाने लगता है। रग-पट्टों के विकास की कसी या बेशी के अनुसार इस समय में कुछ अन्तर भी पड़ता है। पर जीवन के आरम्भ के महीनों में ही उसके हाथ में कोई चीज़ या दँगली आदि रख दी जाय तो वह उसे पकड़ सकता है। पांचवें महीने वह किसी चीज़ को हाथ से पकड़कर सुन्ह तक ले जाने लगता है। यदि बच्चे की हथेली पर कोई चीज़ रख दी जाय और वह उसे ठीक तरह से न पकड़ सकता हो तो माता-पिता को समझ लेना चाहिए कि या तो बच्चा बहुत कमज़ोर है और या इसके मसिल्क में कोई दोष है। बच्चे के उठकर बैठने की शक्ति उसकी पीठ के रग-पट्टों के बल पर निर्भर करती है। साधारणतः छः महीने से पहले उसमें बैठने की शक्ति नहीं आती। जब वह प्रायः पुक वर्ष का हो जाता है, तब वह बिना किसी सहारे के बैठने के योग्य हो जाता है। नवें या दसवें महीने वह रेगने के योग्य हो जाता है। जिस बच्चे के अंगों का ठीक तरह से विकास हुआ हो, वह ग्यारहवें या बारहवें महीने खड़ा हो सकता है। जब वह प्रायः चौदह महीने का होता है तब उसमें आपसे आप चलने की शक्ति आती है। यदि चौदहवें महीने बच्चा चलने के योग्य न हो तो समझना चाहिए कि इसे किसी प्रकार की चीमारी है। जो बच्चा अपने हाथ-पैर आदि अंग अच्छी तरह और स्वतन्त्रतापूर्वक न हिलाता हो और जिसे ऐसा करने में आनन्द न आता हो साधारणतः

उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार होता है। माता के ध्यान उसने योग्य दूसरी बात यह है कि यदि बच्चा कुछ दिनों तक चलने के बाद फिर चलना नहीं दे, तो उसे डाक्टर को दिखलाना चाहिए कि यह कभी किस कारण से हुई है।

किसी बच्चे के अंगों का विकास जल्दी और किमी का डेर से होता है; और यह अंगों का विकास उसके स्वास्थ्य और परिस्थिति आदि पर निर्भर करता है।

पहले वर्ष में बच्चे की उन्नति और विकास—
नीचे हम संक्षेप में यह बतलाते हैं कि पहले वर्ष में हर महीने बच्चे में किन किन बातों का विकास होता है। इससे माताये यह अच्छी तरह समझ सकेंगी कि उनके बच्चे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं या नहीं।

पहला महीना—बच्चा प्रकाश या रोशनी देखकर कुछ घबराता है। बहुत तेज़ रोशनी उसे अच्छी नहीं लगती। आरम्भ के कुछ दिनों में ही उसमें सुनने की अच्छी शक्ति आ जाती है और शोर होने पर जल्दी वह जाग उठता है।

दूसरा महीना—बच्चा सुस्कराने लगता है और प्रसन्नता प्रकट करता है।

तीसरा महीना—तीसरे महीने के अन्त में वह उस ओर सिर झुमाता है जिस ओर से आवाज़ आती है।

चौथा महीना—बच्चा बिना किसी सहारे के सिर उठा सकता है। अपने माता-पिता को देखकर और उनकी आवाज़ सुनकर वह उन्हे पहचानने लगता है। उस समय वह अजनबी आदमियों को बहुत जल्दी पहचान लेता है; और यदि वे उसके पास आते हैं तो वह प्रायः रोने लगता है।

पाँचवाँ महीना—वह चीज़ों को पकड़ने और उन्हे अपने मुँह में डालने लगता है। खिलौनों से वह प्रसन्न होता है।

छठा महीना—वह बैठने का प्रयत्न कर सकता है।

सातवाँ महीना—बैठे और सातवें महीने के बीच में उसके दाँत निकलने लगते हैं। पहले नीचे के बिचले दो दाँत निकलते हैं।

आठवाँ महीना—ऊपर के बीचबाले दाँत निकलने लगते हैं।

नवाँ महीना—कुरसी या किसी दूसरी चीज़ को पकड़कर वह उठकर खड़े होने का प्रयत्न करता है। यदि वह ऐसा प्रयत्न करे तो उसे बिना किसी बाधा के ऐसा करने देना चाहिए।

दसवाँ महीना—लड़कियां कुछ शब्द बोलना सीखती हैं। यह नियम है कि लड़कियां जबदी बोलना सीखती हैं और लड़के देर से बोलना आरम्भ करते हैं।

ग्यारहवाँ महीना—बच्चा खड़े होने के योग्य होता है और सहारे से चलने भी लगता है।

बारहवाँ महीना—पहले वर्ष के अन्त में बच्चे के छः दर्ता होते हैं—चार ऊपर और दो नीचे। उस समय उस पर पूरी निराह रखनी चाहिए, क्योंकि वह जो चीज़ देखता है, वही पकड़ लेता है।

बच्चों को तौलना—जिन बच्चों का पालन बनावटी भोजन से होता हो, विशेषत. उन्हे तौलना बहुत ही आवश्यक होता है। थोड़े थोड़े अन्तर पर यह पता किया लेना बहुत अच्छा होता है कि इस कृत्रिम भोजन से बच्चा तौल में बढ़ता है या नहीं। अर्थात् यह समझ लेना चाहिए कि बच्चे को वह भोजन ठीक तरह से पचता है या नहीं। यदि बच्चा तौल में बराबर न बढ़ता हो तो समझना चाहिए कि ऊपर से डेखने में भोजन चाहे जितना अनुकूल क्यों न जान पड़ता हो, परं फिर भी वह बच्चे के लिए अनुकूल नहीं पड़े रहा है, फिर चाहे कैसा दस्त आदि ऊपरी चिह्न न भी हों। इसलिए माताओं को उचित है कि जिन बच्चों को ऊपरी दूध पिलाया जाता हो, उन्हे हर महीने तौल लिया करे। यदि बच्चा तौल में कम हो जाय या तौल बढ़े नहीं, तो

समझ लेना चाहिए कि बच्चे का यह भोजन बढ़ावने की आवश्यकता है; फिर चाहे उसे और किसी तरह का रोग या कोई शिकायत हो या न हो।

पहले वर्ष बच्चे को नियमित रूप से तौलना चाहिए। इस तौल में उसके कपड़े का भी ध्यान रखना चाहिए जिसमें कोई भूल न पड़े। हर बार बच्चा तौल में जितना उतरे, एक अलग कागज पर लिख रखना चाहिए; और उसमें जो कमी-बेशी हो, उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिसमें यह पता चलता रहे कि बच्चा कहाँ तक उचित कर रहा है और उसे जो भोजन दिया जाता है, उसमें पोषक गुण कितना है। बच्चे को तौल में जितना बढ़ना चाहिए, यदि वह उतना न बढ़े तो यह समझ लेना चाहिए कि, उसमें कोई ख़राबी है और उसके भोजन से या तो उसका पूरा पूरा पोषण नहीं होता और या वह किसी न किसी रूप में उसके अनुकूल नहीं पड़ता।

यदि बच्चे को दिये जानेवाले दूध में चीनी अधिक हो या उसे जमाया हुआ मीठा दूध अथवा इसी प्रकार का और कोई पेटेन्ट भोजन दिया जाता हो तो उससे बच्चा तौल में तो बहुत बढ़ जायगा, पर उसकी वह वृद्धि अम में ढालनेवाली होगी, क्योंकि बच्चे की वास्तविक शक्ति उतनी नहीं होती जितना वह फूल जाता है। ऐसे बच्चे में रोगों का सामना करने की शक्ति कम होती है और वह छूतवाले रोगों का जल्दी शिकार हो सकता है।

यदि दौंत निकलने सरीखी हल्की बीमारियाँ हों तो उनमें बच्चे तौल में कुछ कम अवश्य हो जाते हैं, पर उनकी यह कमी स्थायी नहीं होती। और इस प्रकार की अस्थायी अवस्था के कारण भाता को चिनित न होना चाहिए, क्योंकि जब वह बीमारी दूर हो जायगी, तब यह कभी की अवस्था भी जाती रहेगी।

जन्म के समय बच्चे का जितना आकार होता है, उसी के अनुसार स्वस्थ बच्चा भी तौल में उतना ही होता है। यदि और सब बार्टे

समान हो तो भी जो बच्चा आकार से बढ़ा होगा, वह स्वभावतः तौल में अधिक होगा; और जिस बच्चे का आकार छोटा होगा, वह तौल में भी कम होगा। जो बच्चा तौल में सन्तोषजनक रूप से नहीं बढ़ता, उसमें रोगों का सामना करने की शक्ति कम होती है और इस बात का हर समय डर बना रहता है कि कहीं उसे अर्थात् या छाती की कोई बीमारी न हो जाय।

जो बच्चा अपनी मां का दूध पीता होगा, वह पहले पांच महीनों में हर हफ्ते छः से आठ आउन्स तक तौल में बढ़ेगा। इसके बाद साल पूरा होने तक यदि वह हर हफ्ते चार से छः आउन्स तक भी बढ़े, तो उसकी वृद्धि सन्तोषजनक समझनी चाहिये।

बच्चा जन्म के समय तौल में जितना होता है, पांच छः महीने में वह उससे दूना हो जाता है और साल के अन्त में तिगुना हो जाता है।

दसवाँ प्रकरण

बच्चों के कुछ साधारण और

दूतवाले रोग

माता के प्रति—छोटे बच्चों को आरम्भ में जो कुछ साधारण या दूतवाले रोग हो जाते हैं, उन्हीं का इस प्रकरण में वर्णन किया गया है। इस प्रकरण में जो बातें घोरेवार बतलाई गई हैं, यदि तुम उन्हें अच्छी तरह समझ लोगी तो तुम ऐसे रोगों को केवल यथासाध्य रोक ही नहीं सकोगी, बल्कि बच्चे के बीमार होने की दशा में तुम सब काम विश्वास और बुद्धिमत्तापूर्वक कर सकोगी। एक बात पर हम विशेष रूप से तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहते हैं। वह यह है कि साधारणतः खिर्या बच्चों के रोगों का आप ही इलाज करके जो भूल कर बैठती हैं, वह भूल तुम कभी मत करो; बल्कि जहाँ तक जल्दी हो सके, तुम किसी अच्छे डाक्टर से सलाह लो और इलाज का सारा काम उसी पर छोड़ दो।

छोटी अवस्था में पाचन-सम्बन्धी विकार—आरम्भक-सूचनायें—जिन बच्चों को छोटी अवस्था में ठीक तरह से भोजन नहीं दिया जाता, उन्हें जीवन के पहले चर्च में पाचन-सम्बन्धी कई प्रकार के विकार हो जाते हैं और उनमें से बहुत से बच्चे मर भी जाते हैं। जो भोजन बच्चे के लिए उपयुक्त न होगा, अथवा जो भोजन बच्चा अच्छी तरह पचा न सकेगा, उस भोजन से बच्चे के पेट में अवश्य विकार उत्पन्न होगा। यदि माता बच्चे पर पूरी तरह से ध्यान रखे तो वह आरम्भ में ही ऐसे

उचित उपाय कर सकती है जिसमें बच्चे का वह विकार या रोग भी पर्याप्त रूप धारण न करने पावेगा। पर यदि वह अज्ञानी होगी अथवा लापरवाही करेगी तो बच्चा अवश्य ही बीमार पड़ेगा। जो बच्चे अपनी माता या दाई का दूध पीते हैं, उनको भी पाचन-सम्बन्धी विकार अवश्य होते हैं; पर ये विकार अधिकतर उन्हीं बालकों में देखे जाते हैं जिन्हे ऊपरी दूध दिया जाता है। माता का दूध पीनेवाले बच्चों को भी कई प्रकार के विकार होते हैं। जहां तक हो सके, ऐसे विकारों के अवसर कम करने के लिए माता को स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे अधिक आवश्यक है। यदि उसे किसी प्रकार का रोग होगा तो उसके दूध की मात्रा भी घट जायगी और उसमें कई प्रकार के विकार भी आ जायेंगे; और तब बच्चे की पाचन-शक्ति पर उसका अवश्य ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। माता का दूध पीनेवाले बच्चे को प्रायः अधिक दूध पीने के कारण अपच हो जाया करता है, और इसका कारण या तो यह होता है कि माताये अपने बच्चे को बार बार और जल्दी जल्दी दूध पिलाती है और आवश्यकता से बहुत अधिक समय तक दूध पिलाती हैं, अथवा ये दोनों ही कारण एक साथ हो सकते हैं। जो बच्चे दाई का दूध पीते हैं, उन्हे इस प्रकार के विकार होने की और भी अधिक सम्भावना रहती है। प्रायः दाइयों की छातियां दूध से बहुत भरी हुई होती हैं। ऐसी दाइयाँ चाहे बच्चे को केवल निश्चित समयों पर ही दूध पिलावें तो भी बच्चे के लिए उनमें से दूध पीना बहुत सहज होता है और इसलिए वह आवश्यकता से अधिक दूध पी लेता है।

जो बच्चे माता या दाई के स्तनों से दूध पीते हैं, उन्हें दूध पिलाने के सम्बन्ध में कोई कठोर नियम नहीं है। यदि उन नियमों का थोड़ा बहुत पालन न किया जाय तो स्वास्थ्य में कुछ थोड़ी ही ख़राबी आती है। पर बच्चों को कृत्रिम रूप से दूध पिलाने के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। कृत्रिम रूप से दूध पिलाने की अवस्था में माता के दूध की जगह

जपरी दूध मिलाने के कारण ही बहुत बड़ा अन्तर पढ़ जाता है। केवल जो बच्चे बहुत ही स्वस्थ होते हैं अथवा जिनकी अवस्था कुछ अधिक हो जाती है और जिन्हे बहुत ही सोच समझ कर उपयुक्त भोजन दिया जाता है, वे ही सन्तोषजनक रीति से रहते हैं और माता का दूध पीनेवाले बच्चों की तरह मज़े में छले चलते हैं। आज-कल कृत्रिम रूप से दूध पिलाने की प्रथा बहुत चल पड़ी है; और इसका कारण शायद यह है कि खिर्या विना किसी विज्ञ-वाधा के जीवन का अधिक से अधिक सुख भोगना चाहती है। टीन में बन्द होकर आनेवाले येटेन्ट भोजनों के विज्ञापन भी सर्वेसाधारण के बहुत कुछ धोखे में डालते हैं। बच्चों को पाचन-सम्बन्धी जो बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही कृत्रिम भोजन है। माँ के दूध की जगह गौ के दूध का व्यवहार करने से भी पाचन-सम्बन्धी बहुत से विकार होते हैं। गौ के दूध और ग्री के दूध में जो रासायनिक अन्तर है, उससे यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि गौ के दूध को पचाने में बच्चे के पाचक अंगों पर अधिक भार पड़ता है। हम यहाँ पाचन-सम्बन्धी केवल उन्हीं विकारों का वर्णन करेंगे जो साधारणतः सभी स्थानों में पाये जाते हैं, जिसमें मातायें उन्हे रोकने के लिए उचित व्यवस्था कर सकें।

कैंप और मिली—यदि बच्चे को मिली होने लगे तो वह समझ लेना चाहिए कि उसके पेट में आवश्यकता से अधिक दूध पहुँच गया है या उसमें और कोई ख़राबी आ गई है। ग्रायः होता यह है कि या तो माता बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी छातियों से दूध पिलाती है और या यदि उसे हाय से दूध पिलाया जाता है तो एक ही बार में उसे बहुत अधिक दूध पिला दिया जाता है। यदि दूध पीने के बाद नुरन्त ही बच्चा बहुत सा दूध फेंक दे तो साधारणतः यही समझना चाहिए कि उसे बहुत अधिक दूध पिला दिया गया था। बच्चे को सरदी लग जाने से, बहुत अधिक इधर-उधर हिलाने

हुलाने से या बहुत तंग कपड़े पहनाने से भी वह कै करने लगता है।

इलाज—मिच्छी के द्वारा बच्चा प्राकृतिक रूप से अपना बचाव करता है और यह बतलाता है कि मुझे ऐसा भोजन मत दो जो मेरे लिए उपयुक्त या अच्छा नहीं है। छाती के अथवा ऊपरी दूध से बच्चे का पेट कभी बहुत अधिक नहीं भर देना चाहिए। यदि बच्चा बार बार कै करता हो तो उसे कम से कम चार घंटे के अन्तर पर दूध दिया जाना चाहिए; फिर चाहे वह उमर में कुछ ही सप्ताहों का क्यों न हो। यदि इस उपाय से भी उसे कै आना बन्द न हो तो किसी डाक्टर को दिखलाकर उसका इलाज कराना चाहिए; क्योंकि बहुत अधिक मिच्छी शरीर के अन्दर के किसी और रोग के कारण भी हो सकती है।

कृष्णयत—बच्चों को ग्राय. इसकी तकलीफ देखी जाती है। हचिन्सन साहब का मत है—“बड़े होने पर लोगों को जो बराबर कृष्णयत बनी रहती है, यदि उसके मूल का पता लगाया जाय तो ग्रायः यही निश्चित होगा कि छोटी अवस्था में इस रोग को दूर करने का पूरा पूरा प्रयत्न नहीं किया गया था।” स्थायी रूप से बनी रहनेवाली कृष्णयत को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे को नियमित रूप से और ठीक समय पर पाख़ाने जाने की आठत डाली जाय। उस छोटी अवस्था में ही उसे यह आठत पढ़ जानी चाहिए कि वह बराबर नियमित रूप से पाख़ाने जाया करे। ग्रायः मातायें ऐसी होती हैं जो दो ढो और तीन तीन दिन तक बच्चों को पाख़ाना फिराती ही नहीं और तब उन्हें रेष्टी के तेल की एक खराक दे देती है। उस समय तो इससे काम चल जाता है, परंतु इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और वह फिर तीन चार दिन तक पाख़ाना नहीं फिरता। माता को फिर चिन्ता होती है और वह फिर वही पहलेवाला इलाज करती है। यह बड़ी भारी भूल है; क्योंकि इससे यह रोग जड़ पकड़ लेता और पुराना हो जाता है।

रोकने का उपाय—माता को चाहिए कि वह पहले कैस्करा (Cascara) या तरल पैराफिन (Liquid Paraffin) पीकर अपनी कृष्णयत दूर करे; और यदि बच्चा कुछ महीनों का हो तो उसे बराबर नियमित समय पर पाख़ाना फिराया करे। इससे कृष्णयत को रोकने में बहुत कुछ सहायता मिलेगी।

इलाज—यदि बच्चे को लाज़ी और खुली हवा में रखा जाय और वहा उससे व्यायाम कराया जाय और उसे हाथ-पैर मारने या पटकने का अवसर दिया जाय तो इससे भी कृष्णयत बहुत कुछ दूर हो जाती है। पेट के ऊपर मालिश करने से भी बहुत लाभ होता है। पर ऐसा करने से पहले हाथ में मीठा तेल, घी या मक्खन आदि लगा लिया जाना चाहिए जिससे मालिश करने से पेट के ऊपर का चमड़ा न छिल जाय। यदि पानी उबालकर ठंडा कर लिया जाय और दूध पिलाने के कुछ देर बाद दोबारा दूध पिलाने से कुछ पहले उसे वह पानी पिला दिया जाय तो भी पाख़ाना साफ़ हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पीने के लिए काफ़ी पानी ही नहीं दिया जाता। यदि उन्हें पीने को काफ़ी पानी दिया जाया करे तो उसका फल बहुत सन्तोष-जनक होता है। कुछ अधिक अवस्था के बच्चे को यदि दिन में एक बार एक या दो छोटे चमच भर नारंगी या सन्तरे का रस दिया जाय तो उससे भी बहुत खाभ होता है। अधिक दस्त या पतला पाख़ाना लानेवाली दवाओं का अवश्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कृष्णयत पुरानी होकर जड़ पकड़ लेती है। कभी दस्तावर दवाएँ खाकर कृष्णयत दूर करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि हस्तका और सादा भोजन करके ही उसे दूर करना चाहिए। यह एक विशिष्ट नियम है कि सभी प्रकार की कृष्णयत केवल भोजन में सुधार या परिवर्तन करके ही दूर की जा सकती है। माता को चाहिए कि वह लगातार हफ्तो बल्कि महीनों लगकर बच्चे की कृष्णयत दूर करने का इलाज करे। इस विषय में उसे कभी इत्तेल्साह नहीं होना चाहिए।

पेट में वायु या उसका द्रट्ट—बच्चों में यह रोग भी प्रायः देखा जाता है और यह बच्चे के अधिक दूध पीने का एक बहुत कष्टदायक लकड़ा है। यह बच्चे को ज़रा भी चैन नहीं लेने देता। मर्म का दूध पीनेवाले बच्चों को भी यह रोग होता है और कृत्रिम रूप से दूध पीनेवाले को भी। पर मर्म का दूध पीनेवाले बच्चों की अपेक्षा कृत्रिम रूप से दूध पीनेवाले बच्चों को यह अधिक होता है। इसमें दोनों ही प्रकार का दूध बच्चे को अनुकूल नहीं पड़ता। इससे आर्ती में मल सहने लगता है जिससे गैस या वायु उत्पन्न होती है और बहुत अधिक पीड़ा होती है। यदि माता पूरा पूरा ध्यान न रखे तो उसका दूध पीनेवाले बच्चे को यह रोग हो जाता है। अथवा स्वयं बच्चा ही जल्दी जल्दी बहुत सा दूध पी लेता है, जिसके कारण उसे यह रोग हो जाता है। जिन बच्चों को बोतल आदि से दूध पिलाया जाता है, उन्हें यह रोग या तो बोतल की गन्दगी के कारण होता है और कभी उसके ऊपर की रबर की घुंडी में कोई दोष आ जाने और उसके द्वारा पेट में वायु उत्तर जान के कारण होता है। कभी कभी पेट या पेड़ में सरदी लग जाने के कारण भी यह रोग हो जाता है।

जिस बच्चे को यह रोग होता है, वह बेचैन हो जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता चिल्लाता है और हाथ-पैर पटकता है। उसका पेट छूने से कहा जान पड़ता है। जब बच्चा बराबर रोता चिल्लाता रहे, तब माता को समझ लेना चाहिए कि इसके पेट में वायु के कारण पीड़ा हो रही है।

रोकने का उपाय—इसमें दूध बहुत वियमित रूप से पिलाना चाहिए और जाड़े के दिनों में बच्चे का पेट काफ़ी गरम रखना चाहिए।

इलाज—रेढ़ी के तेल की एक मात्रा दे देनी चाहिए जिसमें आर्ती में भरा हुआ सद्गुरु मल बाहर निकल जाय; पेट पर गरम पानी की बोतल रखकर उसे सेंकना चाहिए; और दूध पिलाने में जो दोष

हो रहे हैं दूर करना चाहिए। इन सब दयार्थों में बच्चा अच्छा हो जायगा।

बच्चों को दस्त की बीमारी—ग्राम: छोटी अवस्था में बच्चों को दम्भ आने लगते हैं और जीवन के आरम्भ में ही बहुत से बच्चे इसी गैर के कारण भर जाते हैं। जिन देशों में माताओं ग्रामः छाती से ही बच्चों को दूब पिलाना है, उन देशों में तो दस्तों के कारण अधिक बच्चे नहीं मरते; पर जहाँ बोनल आदि की मदायना में दूब पिलाया जाता है, वहाँ और अवस्थाओं या बानों के भमान होने पर भी बच्चों की मृत्यु की संभ्या अधिक होती है। भारत में ग्रामः और विशेषनः जूल, जूलाई, आगल तथा पितम्बर के गन्म महीनों में दस्त आने के कारण बहुत से बच्चे भर जाते हैं। गर्भ का मौत्रिम, रहने के स्वास्थ्यलाशक स्थान, घन्डी नालियाँ, पुक स्थान पर बहुत अधिक आदमियों का रहना और बाजार में मिलनेवाला चुगच दूब आदि अनेक कारण हैं जिनसे यह बीमारी होती है।

छाती से दूब पीनेवाले बच्चों को ग्रामः बहुत अधिक दूब पीने के कारण अथवा माता के अस्वस्थ होने पर उनका दूब बच्चे को अनुकूल न पड़ने के कारण दस्त आने लगते हैं। यदि माता अस्वस्थ न भी हो, पर उसे बढ़ाइयाँ हो, वह दिन-नात चिन्तित या दुखी गहनी हो अथवा वह गर्भवती हो सों भी उनका दूब पीने के कारण बच्चे को दस्त आने लगते हैं। कर्मी कर्मी अनुपशुक भोजन, पेट के ऊपरी मार में सूखी जूर जाने से या द्रान निकलने के समय भी बच्चों को दस्त आने लगते हैं। यदि गौ का दूब जूराब हो, उसमें उचित मात्रा में पानी न मिलाया जाय अथवा उचित अनुर पर दूब न किया जाय तो भी वह रोग हो जाना है। दूब में अधिक चीज़ मिलाने या डिढ़वों में बन्द होकर आनेवाले पदार्थ माता के साने से भी बच्चों को दस्त आने लगते हैं।

जिन अवस्थाओं या परिस्थितियों में बच्चे को दम्भ आने लगते हैं, उन्होंने के अनुभाव उपरी लक्षण भी हल्के

या कठोर हुआ करते हैं। कुछ बच्चों को तो अचानक बहुत दूसरे आने लगते हैं और कुछ बच्चों को पहले कम आते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। साधारणतः दिन में दो या तीन बार पाख़ाना फिरने की जगह बच्चा छ़. छ़: और आठ आठ बार और कभी कभी इससे भी अधिक बार पाख़ाना फिरने लगता है। कभी कभी उसे दस्तों के साथ कै भी आने लगती है और बुखार भी चढ़ आता है। बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्काता है और इस प्रकार हाथ-पैर पटकता है, मानो उसे बहुत अधिक पीड़ा होती हो। कभी कभी सफ़ेद और जमा हुआ मल भी निकलता है। वह बेचैन रहता है, उसे पूरी तरह से नोद नहीं आती और उसकी जैसी अवस्था होती है, उसी के अनुसार उसे थोड़ा या अधिक कष्ट होता है।

बच्चे को दूध पिलाने की अवस्था में माता को चाहिए कि वह अपना स्वास्थ्य बहुत ही ठीक रखे। बच्चे को छातियों से दूध पिलाये, खूब सफ़ाई से रहे, ऐसा भोजन करे जो सहज में और अच्छी तरह पच और स्वास्थ्य-रक्षा के सब नियमों का पूरा पूरा पालन करे। यदि माता बच्चे को छातियों से दूध पिलाती हो और दूध की अधिकता के कारण बच्चे को दस्त आते हों तो माता को चाहिए कि भोजन कम करे और न्यायाम अधिक करे। वह ऐसा भोजन न करे जो उसे अनुकूल न पह़ता हो और बिना पके हुए फल, मिठाइर्या या इसी प्रकार के और पदार्थ न खाय। बच्चे को दूध पिलाने के दिनों में शराब और मादक द्रव्यों आदि का बिलकुल व्यवहार न करना चाहिए। बच्चे को दिये जानेवाले दूध की मात्रा कम कर देनी चाहिए और उसे थोड़ा सा उबालकर ठंडा किया हुआ पानी देकर सन्तुष्ट करना चाहिए। छातियों में भरा हुआ बाकी दूध पम्प की सहायता से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। यदि बच्चे को कुछ अधिक पाख़ाने आते हुए दिखाई दे तो उसको कम और नियमित रूप से दूध पिलाना चाहिए और दूध पिलाने के बीच के अन्तर कुछ बढ़ा देने चाहिए।

यदि किसी समय बच्चे को साधारण सा पतला द्रुत आ जाय तो उसके लिए चिन्ता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार तो प्रहृति मानों अपना बौक हलका करने का प्रयत्न करती है। पर यदि रोग के लक्षण अधिक तीव्र हों और दिन-नात में आनेवाले दस्तों की संख्या बहुत अधिक हो और बच्चा कमज़ोर होता जाता हो तो इस सूराबी को रोकने के लिए तुरन्त पूरा पूरा ध्याय करना चाहिए।

उपयोगी सूचनाएँ—

(१) ऐसी अवस्था में बच्चे को दूध पिलाना बहुत कम कर देना चाहिए और उसे आठ से दस घंटों तक बिल्डुल भूखा रखना चाहिए।

(२) बच्चे को तरल पदार्थ बहुत अधिक देने चाहिए। उबालकर हँडा किया हुआ सादा पानी या चावल का पानी (देखो परिशिष्ट) दिया जा सकता है। यदि एल्ब्यूमिन जल (Albumin water) (देखो परिशिष्ट) दिया जाय तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जिन अँडों से वह तैयार किया जाय, वे बिल्डुल ताजे हों।

(३) यदि रोग का रूप विकट न हो तो पेट में का दूषित मल निकालने के लिए रेंझ के तेल की एक मात्रा देनी चाहिए। यदि इन सीधे-साइ उपायों से परिणाम सन्तोषजनक न हो तो डाक्टर को बुलाकर दिखाना चाहिए।

सरदी या ज़ुकाम—प्रायः बच्चों को हतनी जलदी जलदी और अधिक सरदी होती है कि उस पर उतना ध्यान ही नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। जब बच्चा क़़ महीने का हो जाता है, तब उसे बहुत जलदी जलदी सरदी होने लगती है। साधारणतः बच्चे को ज़ुकाम या सरदी हो जाना एक बहुत ही मामूली और तुच्छ बात समझी जाती है और प्रायः योड़े समय के बाद वह आपसे आप अच्छा भी हो जाता है। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ज़ुकाम अच्छा हो जाने पर भी बच्चों के शरीर पर उसके जो ग्रभाव बाकी रह जाते हैं, वे कभी कभी धातक

सिद्ध होते हैं। इसके कारण अन्त में उसका कान वहने लगता है, उससे तेज़ खासी हो जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी न्यूमोनिया भी हो जाता है। जो बच्चे स्वभावतः बहुत ही दुर्बल होते हैं, वे यदि भिज्ञ भिज्ञ तापमानों में रहते हैं तो उन्हें बहुत जलदी जुकाम हो जाता है।

जुकाम एक हृत की बीमारी है। बच्चों को और विशेषतः दूध पीनेवाले बच्चों को बड़े और वयस्क लोगों की अपेक्षा अधिक जलदी जुकाम हो जाता है। साधारण जुकाम होने का एक मुख्य कारण सुखली हवा में रहना है। यदि छोटे बच्चों को लापरवाही से स्थान कराया जाय या तेज़ हवा में बाहर लाया जाय तो भी उन्हें जुकाम हो जाता है। धूल, कमरे में आग जलने के कारण होनेवाली गरमी या घरों में सफाई का न होना भी बार बार जुकाम हो जाने का कारण हुआ करता है।

जुकाम की दशा में बच्चे को हल्का या तेज़ हुखार हो जाता है और उसके दूध पीने में कुछ बाधा पड़ती है। उसकी नाक कफ़ और पानी से बन्द रहती है, वह ठीक तरह से सांस नहीं ले सकता और इसलिए उसके दूध पीने में रुकावट होती है। जिस बच्चे को जुकाम होता है, वह सुँह से सांस लेने के लिए एक एक दो दो मिनट पर सुँह से स्तन की घुंटी छोड़ देता है। इस प्रकार एक ओर तो वह बीमार रहता है और दूसरी ओर उसका पूरा पूरा पोषण नहीं होता। उसे सांस लेने के लिए पूरी पूरी हवा नहीं मिलती, इसलिए उसकी नींद में भी बाधा होती है। हवा की उस कमी का वह बारी बारी से नाक और सुँह के द्वारा सांस लेकर पूरा करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार वह सहज में बहुत थक जाता है और प्रायः ऐसा होता है कि थकावट के कारण उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है और अचानक उसके प्राण निकल जाते हैं।

रोकने के उपाय—माता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को ऐसे लोगों के पास न जाने दे जिन्हें जुकाम हो। चाज़ी हवा इसका

सबसे अच्छा और बढ़िया हलाज है। बच्चे को कमरे में बन्द नहीं रखना चाहिए। जब बच्चे को जुकाम हो, तब उसे अधिक कपड़ों में लपेट कर रखना भी भूल है। इसके बदले उसे ताजी हवा में रखना चाहिए। जिस बच्चे को जुकाम हो, उसे ऐसे कमरे में रखना चाहिए जिसमें खूब हवा आती हो; और यदि उसे बुखार भी हो तो उसे विस्तर पर लिटाये रखना चाहिए। उसके स्नान के विषय में भी बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि मुँह से दूध पीने से बच्चे का पूरा पूरा पोषण न हो तो माता को चाहिए कि वह पम्प की सहायता से अपनी छातियों में से दूध निकालकर उसके से उसे-पिलावे।

साँस की नालियों की सूजन—छोटे बच्चों की छाती में जितने रोग होते हैं, वे सभी बिकट होते हैं और दुर्भाग्य से बच्चों को ऐसे रोग प्रायः हुआ करते हैं। यदि सरदी का ठीक ठीक हलाज न किया जाय और उसकी उपेक्षा की जाय तो साँस की नालियों में एक प्रकार की सूजन हो जाती है जिसे ऑगरेजी में ब्रॉन्काइटिस (Bronchitis) कहते हैं। छः महीने से तीन बरस तक की अवस्था के बच्चों को यह रोग प्रायः हुआ करता है। सरदी या जुकाम की तरह यह रोग भी घरों की गन्दगी, घरों में धूप न आने और सावधानी न रखने आदि के कारणों से होता है। जाड़े के दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने या भौसिम में कुछ परिवर्तन होने, अधिक समय तक घर में बन्द रहने और उसके द्वारा रोगों का सामना करने की शक्ति के क्षीण हो जाने और जुकाम तथा खांसी के रोगियों के साथ रहने या इसी प्रकार के और कारणों से यह रोग होता है।

इसके लक्षण—इसके लक्षण बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं; और यदि किसी दिन रात भर बच्चे को चैन से नीद न आवें, तो सबैरे ही उसमें ये लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। बच्चा जल्दी जल्दी और कठिनता से साँस लेता है। उसे कुछ हरारत हो

जाती है और वह बेचैन रहता है। यदि बच्चे को ज्यानपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि हर बार सास लेने में नयने अन्दर की ओर जाते और फिर बाहर आते हैं; और यद्यपि वह सास जल्दी जल्दी और कष्ट से लेता है, परं फिर भी उसकी छाती की गति मन्द होती है।

रोकने के उपाय—बच्चे को केवल घर के बाहर ले जाकर ताजी हवा में व्यायाम ही नहीं कराना चाहिए, बल्कि घर के अन्दर भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें उसे बराबर ताजी हवा मिलती रहे। जिस कमरे में बच्चा रहता हो, उसमें पूरा प्रकाश और साफ़ हवा आती रहनी चाहिए। यदि हो सके तो बच्चे को रहने के लिए एक अलग अच्छा कमरा दे देना चाहिए। रात के समय उसे ओढ़ने के लिए गरम कपड़ा देना चाहिए। उसके सोने के कमरे की लिंगिर्या इस प्रकार खुली रहनी चाहिए जिसमें हवा के तेज़ मोके न आने पावे। उसमें प्रकाश को रोकनेवाले परदे और क़ालीन आदि न रहने चाहिए; क्योंकि उसमें धूल और गर्द आकर जमती है। बच्चे के पहनने के कपड़े जल्दी और समय के अनुसार होने चाहिए। जाड़े के दिनों में उसे गरम मोजे पहनाने चाहिए। उन दिनों उसकी टाँगें नंगी या खुली नहीं रहने देनी चाहिए। यदि बच्चे के शरीर का कोई खुला हुआ अंग लूने से ढंडा जान पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उसे जो कपड़े पहनाये गये हैं, वे काफ़ी गरम नहीं हैं।

यदि बच्चे का स्वास्थ्य ऐसा हो कि वह साधारण जाड़ा सह सके और उसे ऐसे कपड़े पहनाकर बाहर निकाला जाय जो बहुत अधिक गरम न हों, तो इससे बच्चे की रोगों का सामना करने की शक्ति बहुत बढ़ती है। जिस बच्चे की सांस की नालियों में सूजन हो गई हो, उसके लिए पाखाना साफ़ होना बहुत आवश्यक है, और इस बीमारी की दशा में उसे हल्का और जल्दी पचनेवाला भोजन ही दिया जाना चाहिए।

न्यूमोनिया (Pneumonia)—यदि जुकाम और साईंस की नालियों की सूजन की पूरी तरह से चिकित्सा न की जाय तो इससे छोटे बच्चों को न्यूमोनिया नामक भीषण रोग हो जाता है। ज्यों ही माता देखे कि बच्चे को जुकाम हुआ है और उसकी सास की नालियों में सूजन हो गई है, तों ही उसे सचेत हो जाना चाहिए। छोटी अवस्था में न्यूमोनिया का रोग प्रायः हुआ करता है और अधिकांश बच्चों का यह रोग छः महीने से लेकर दो वर्ष तक की अवस्था में होता है। इसलिए माता को चाहिए कि इस बीच में वह बहुत अधिक सचेत रहे और बच्चे के स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान रखे। यदि उसे ज़ोर की स्वास्थी हो और वह जल्दी जल्दी सास के तो उसे समझ लेना चाहिए कि यह रोग जड़ पकड़ रहा है। साथ ही उसे यह भी समझ रखना चाहिए कि बच्चे की अवस्था जितनी ही कम होती है, उतना ही रोग भी उसके लिए भीषण और विकट होता है। जिन बच्चों को पहले वर्ष यह रोग होता है, उनमें से बहुत से इसी कारण मर जाते हैं। जब पहले से ही बच्चे का पूरा पूरा ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी पाचन-शक्ति में विकार आ जाता है और उसका साधारण स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तब उसे यह रोग होने का बहुत बड़ा डर रहता है; क्योंकि इस प्रकार वह मानो इस रोग के लिए पहले से ही तैयार होता है।

रोकने के उपाय—न्यूमोनिया मुख्यतः एक ऐसा रोग है जिसे पहले से ही न होने देना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके हो जाने पर पीछे बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। यदि इसका ठीक तरह से इलाज किया जाय तो इससे बहुत कुछ रक्षा हो सकती है; परं फिर भी सब तरह का इलाज होने पर भी इसके कारण बहुत से बच्चे मर ही जाते हैं। जहा किसी बच्चे को जुकाम, इन्प्लूएन्जा या व्यान्काइटिस की बीमारी हो, वहाँ समझ लेना चाहिए कि न्यूमोनिया हो जाने की बहुत कुछ सम्भावना है। यदि इन सबमें से किसी एक रोग के होते ही आरम्भ से

पूरा पूरा ध्यान रखना जाय और उसका इलाज किया जाय तो न्यूमोनिया के कारण मरनेवाले बच्चों की संख्या बहुत कम हो सकती है।

ज्यों ही घर मे किसी को न्यूमोनिया हो, त्यों ही तुरन्त डाक्टर को हुलचाना चाहिए। इसमे ऊपर की पूरी व्यवस्था और रोगी की सेवा-शुश्रूषा आदि बाते सबसे अधिक आवश्यक और महत्व की है। रोगी को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था मे रखना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह बिस्तर पर पढ़ा पढ़ा ही पेशाब और पाखाने की हाजत पूरी कर लिया करे। जहाँ तक सम्भव हो, उसे बहुत ही कम हिलाया हुलाया जाय; यहाँ तक कि डाक्टर से उसकी परीक्षा कराने के समय भी उसे अधिक हिलने-डोलने न दिया जाय। उसके शरीर मे जितनी शक्ति हो, वह सबकी सब रोग का सामना करने और उसे दूर करने मे ही लगानी चाहिए। रोगी को भोजन कुछ अधिक, पर ऐसा दिया जाना चाहिए जो बहुत जरूरी पच सके। अधिक उत्तम यही होगा कि उसे थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा भोजन दिया जाय। रोगी को तब तक बहुत ही शान्तिपूर्वक रखना चाहिए जब तक उसके बिल-कुल अच्छे हो जाने की पूरी पूरी आशा न हो जाय; और जब किसी बहुत अच्छे डाक्टर का ठीक तरह से इलाज होता हो, तब माता-पिता को कभी निराश नहीं होना चाहिए।

उपयोगी सूचनाये——ज्यों ही किसी बच्चे को जुकाम हो या उसकी सांस की नालियों मे सूजन (Bronchitis) हो, त्यों ही—

(१) उसे वही कमरा दिया जाय जो घर भर मे सबसे अच्छा हो और जिसमे खूब धूप आती हो।

(२) उसमे सजावट आदि का जो फालतू सामान, मेज़, कुरसी आदि हो, वह सब हटा दिया जाय।

(३) जो लोग यों ही व्यर्थ रोगी को देखने के लिए आवे, उन्हें उससे दूर ही रखना चाहिए; और विशेषतः जिन लोगो को जुकाम या गले के और रोग हों, उन्हें रोगी के पास बिलकुल नहीं आने देना चाहिए।

(४) पेंडी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें थोड़ी थोड़ी देर पर कमरे का गन्दा हवा बाहर निकल जाय और उनमें याफ़ ताज़ा हवा भर जाय।

(५) यदि वच्चा बहुत छोटा हो तो उसे कमरे में एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत यात्राधारी रखनी चाहिए।

(६) यदि वच्चा कुछ बड़ा हो तो बोच बोच में उसे विनाश पर करबट बढ़ावा देनी चाहिए। या उसकी स्थिति बढ़कर देनी चाहिए।

(७) वच्चे कं जिए अच्छे योग्य भोजन की टीक व्यवस्था होनी चाहिए।

(८) उसे पीने के लिए दूध पानी देना चाहिए।

यह यदा न्यरण रखना चाहिए कि जिस जुकाम को लोग बहुत ही यात्रागत न्यमको दें, उसके होन पर भी कोभल वच्चों को घासक न्यूमोनिया हो सकता है।

काली खाँसी—काली खाँसी पुक छृतवाला गेग है जो पुक वच्चे से प्रत्यक्ष रूप में दूसरे वच्चे को हो जाता है। यह गेग सुख्ततः वच्चपन में ही हुआ करता है। जिस मलबूत वच्चे की अवस्था कुछ अधिक हो जाय, उसे प्रायः यह गेग होन का डर नहीं रहता। पर जो वच्चा कमज़ोर हो, या बगवार बीमार रहना हो, या बहुत छोटा हो, उसे यदि यह गेग हो जाय तो उसका जान जोखिम में पड़ जानी है। बहुत छोटे और दूध पीनेवाले जितने वच्चे इस गेग से मरते हैं, उतने अधिक अवस्थावाले वच्चे नहीं मरते। इस गेग में प्रायः कै हुआ करती है। इसनियु बहुत क्षेत्र और दूध पीते वच्चों को दूसरे कान्धे पोयण करन योग्य दूध नहीं मिलने पाता। इनमें वे वच्चे बहुत ही कमज़ोर हो जाने हैं और उन्हें प्रायः न्यूमोनिया या हर्मी प्रकार के और योग्य दूध नहीं पड़ता। यदि इस गेग में खाँसी के दौरं दिन-गत में भाड़ में अधिक हों तो न्यमक लेना चाहिए कि अवस्था विकट है। पर यदि इसके दौरं इसकी अपेक्षा बहुत कम हों और यात्रागत:

बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो यह रोग जल्दी अच्छा हो जायगा । यह रोग बहुत ही साधारण आदमी भी पहचान सकता है ।

रोकने के उपाय—इसका आरम्भ तो साधारण जुकाम की तरह ही होता है, पर खांसी बढ़ती जाती है और उसके दौरे होने लगते हैं । इसमें थोड़ी देर तक बहुत ज़ोर से और बार बार खांसी होती है और तब बच्चा अन्दर को लम्बी रसास खीचता है । बच्चे का रझ नीला पड़ जाता है और माता-पिता बहुत भयभीत हो जाते हैं । उसे कैं भी हो सकती है । माता-पिता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन दिनों शहर में काली खांसी बहुत फैली हो और उनके बच्चे को साधारण खांसी भी आवे, तो उन्हे सन्देह करना चाहिए कि कहीं इसे काली खांसी तो नहीं है या आगे चलकर न हो जायगी । घर के जिन लोगों को काली खामी न हो, उन्हे काली खांसीवाले बच्चों से बहुत दूर रखना चाहिए । इस रोग में हरतहारी दवाओं से कुछ भी लाभ नहीं होता । स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों और जलवायु का इस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । खांसी का ज़ोर घटाने के लिए माता-पिता को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करें जिसमें उनके आस-पास की हवा सदा बिलकुल ताज़ा, साफ़ और गरम रहे और उसमें कुछ भी धूल या गरदा आदि न हो । यदि बच्चे को बिना इधर-उधर अधिक हिलाये-बुलाये उसे काफ़ी ताज़ा हवा पहुँचाई जा सके तो उससे बहुत कुछ लाभ हो सकता है । उसे हवा के तेज़ झोंकों और ठण्डी हवा से भी बचाना बहुत लाभ-दायक होता है । कभी कभी केवल इन्हीं रुपायों से काली खांसी का दौरा बहुत जल्दी रुक जाता है । काली खांसी से बच्चों को प्रायः रात के समय बहुत अधिक कष्ट होता है । इसलिए जिस कमरे में बच्चा सोता हो, उसमें ताज़ा हवा आने का माता को पूछा प्रबन्ध रखना चाहिए । यदि रोग बहुत विकट हो और बच्चा बहुत दुर्बल हो गया हो तो उसको सदा बिल्कुल पर ही लेटाये रखना चाहिए; और विशेषतः जब उसे बुखार हो आवे, तब उठने-बैठने नहीं देना चाहिए । जाड़े के

दिनों में माता को चाहिए कि बच्चे को कपड़े पहनाने या ओढ़ाने आदि के समय उन्हें किसी प्रकार कुछ गरम कर ले, बहुत ठंडा न रहने दे।

जिस बच्चे को काली खासी आती हो, उसके पहनने के कपड़े जल्द के अनुसार ही होने चाहिए।

अन्त में हम यह भी कह देना चाहते हैं कि बच्चे के भोजन और पोषण आदि पर माता को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए और उसे बहुत ही समझदारी के साथ यह निर्णय करना चाहिए कि बच्चे को कब, कितना और कैसा भोजन दिया जाय। इस बीमारी के दिनों में उसे बहुत उत्तम और स्वादिष्ट भोजनों का विलकुल परिस्थाग कर देना चाहिए; क्योंकि पेसे पदार्थों से खासी का ढौरा बहुत बढ़ जाता है।

क्षय या तपेदिक—यह छूतवाला रोग है और लोग बहुत ग्राचीन काल से इस रोग को बहुत ही दुष्ट और भीषण समझते चले आये हैं। इधर कुछ दिनों से सारे संसार में सब लोगों को यह समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि इस रोग से क्या क्या अनर्थ होते हैं। इस ज्ञेय में जो लोग काम कर रहे हैं, वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि जहाँ तक हो सके, इस रोग से कम लोग मरें। इधर दस वर्षों में यह रोग भारत में इतनी तेज़ी के साथ फैला है कि सरकार और सर्व साधारण दोनों ही इस बात पर बहुत मनोयोग के साथ विचार कर रहे हैं कि देश की परिस्थितियों को देखते हुए इसकी भयंकरताओं को रोकने का क्या प्रयत्न किया जा सकता है। यह रोग वास्तव में समाज के लिए बहुत अधिक भयंकर है और इसकी वृद्धि रोकने के लिए जो प्रयत्न हो, उसका स्वागत होना चाहिए। इस रोग के फैलने का एक बहुत बड़ा कारण दरिद्रता है। जिस देश में जितनी ही दरिद्रता होती है, उस देश में उतना ही क्षय रोग भी कैलता है। इसके सिवा दूसरी बात यह है कि लोगों को इसके सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं है। इस रोग को रोकने के जो नियम हैं, वे सर्वसाधारण को समझाये जाने चाहिए। इस पुस्तक

में बच्चों को होनेवाले रोगों को रोकने पर विचार किया गया है। पाठकों को बहुत ध्यानपूर्वक यह समझ लेना चाहिए कि दूध पीने-वाले छोटे बच्चों में और आगे चलकर उनके बड़े होने पर उनको इस रोग के भीषण और नाशक परिणामों से बचाने के लिए क्या क्या काम किये जाने चाहिएँ। साधारणतः लोग यह समझते हैं कि जीवन की चरम सीमाओं में अर्थात् एक तो बाल्यावस्था में और दूसरे बुढ़ापे में यह रोग नहीं होता, पर यह समझना भूल है। इसी अमपूर्ण विश्वास के कारण लोग इसकी ओर से बहुत निश्चिन्त और उदासीन रहते हैं जिससे उन्हें इसके भीषण परिणाम भोगने पड़ते हैं। इस रोग से दूध पीते बच्चों के प्राण नष्ट होने का विशेष रूप से भय रहता है।

बहुत ही छोटी अवस्था के जिन बच्चों को यह रोग होता है, उनमें से अधिकांश बच्चे यह रोग होने के कुछ ही दिनों या हफ्तों में मर जाते हैं। कभी कभी यह रोग महीनों बहिक बरसो बुलाता रहता है और बहुत दिनों तक भारी कष्ट में रख कर अन्त में उनके प्राण ले लेता है। पर इस रोग का यही जो यह भीषण चित्र दिखाया गया है, इसे देखकर सर्वसाधारण को बिलकुल दिल नहीं छोड़ बैठना चाहिए। यदि उचित समय पर स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का ठीक ठीक पालन किया जाय और ज्यों ही यह निश्चय हो जाय अथवा इस बात का सन्देह ही हो कि यह रोग हो रहा है, त्यों ही यदि पोषण की ठीक और उचित व्यवस्था की जाय तो बच्चों और वयस्क पुरुषों का शरीर इस योग्य हो सकता है कि इस रोग को दूर करके उस पर विजय प्राप्त कर सके। पर यह बात माता-पिताओं अथवा उन लोगों के साधनों और सावधानी पर ही पूर्णरूप से विर्भर करती है जिनकी देख-न-रेख में छोटे बच्चे रहते हैं। माता-पिता का बहेश्य यह होना चाहिए कि वे बच्चों की जीवनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करें और इस प्रकार उन्हें इस रोग की कूत न लगने दें और उनमें इतनी शक्ति उत्पन्न करें कि वे इसकी नाशकता के सुकाढ़ले में उहर सकें।

यहाँ कुछ ऐसी बातें बतखाई जाती हैं, जिनसे पाठकों को पता चल जायगा कि दूध पीनेवाले अथवा उनसे कुछ बड़े बच्चों में यह रोग किस प्रकार उत्पन्न होता और बढ़ता है। यदि ये सब बातें पूरी तरह से समझ ली जायें तो इस रोग को रोकना बहुत सहज हो जाय। कुछ बच्चे बहुत ही दुर्बल माता-पिता से उत्पन्न होते हैं और जन्म से बहुत ही दुर्बल होते हैं। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि बच्चे को इस रोग का अंश उनके माता-पिता से ही प्राप्त हो जाता है; पर ही, माता-पिता से उन्हे इतनी दुर्बलता अवश्य प्राप्त होती है कि वे इस रोग के शिकार हो जाते हैं।

गन्दे और स्वास्थ्यनाशक स्थानों में रहने और बहुत ही कम पोषक भोजन मिलने के कारण शरीर इस रोग का रोगी होने के योग्य हो जाता है। जिस बच्चे के पिता या माता को यह रोग होता है, वह सहज में इस रोग का शिकार हो जाता है और विषेशतः ऐसी अवस्था में जब कि वह इस रोग के रोगियों के बीच में रहता है। जब इस रोग का रोगी स्वास्ता, बोलता, छूंकता या थूकता है, तब इस रोग के कीटाणुओं से भरा हुआ कुछ कफ या थूक आदि निकलता है और उसके सूख जाने पर उसके छोटे छोटे कण धूल में मिल जाते हैं। वे ही कण छोटे छोटे बच्चों के रेगने के समय सांस लेने पर उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार रोग की खूत लग जाती है—शरीर में यह रोग प्रवेश कर जाता है।

प्रायः यह भेद बच्चों से ही खुलता है कि इनके माता-पिता को भी यह रोग है। बच्चे की देख-रेख के लिए जो नौकर और दाहर्या रक्ती जायें, उनकी भी बहुत अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए; क्योंकि **प्रायः** उनके साथ मिलने-जुलने से भी छोटे बच्चों को यह रोग हो जाता है।

गुरीब लोगों के घरों में इस रोग के कीड़ों को रहने के लिए विशेष स्थान मिलता है, क्योंकि वे ऐसी धनी बस्तियों में रहते हैं जिनमें

हवा या सूर्य का प्रकाश बिलकुल आ ही नहीं सकता। इस रोग के कीटाणुओं से भरी हुई धूल तो सांस के साथ बच्चों के शरीर में चली ही जाती है; इसके सिवा बच्चे जो प्रायः गन्दी चीज़ें, जैसे चुसनियाँ, खिलौने आदि, मुँह में रख लिया करते हैं, उनके द्वारा भी यह रोग बच्चों के शरीर में पहुँच जाता है। जो बच्चे जमीन पर मुटनों के बल चला करते हैं, उन्हे इस प्रकार यह रोग होने की विशेष सम्भावना रहती है। धूल, मिट्टी आदि से भरे हुए बड़े बच्चों के हाथ के द्वारा भी यह रोग शरीर में पहुँच जाता है, इसलिए माताओं को चाहिए कि वे बच्चों को भोजन कराने के समय उनके हाथ खूब अच्छी तरह धुला लिया करें।

रोकने के उपाय—इस बात का प्रयत्न करना बहुत ही आवश्यक है कि छोटी अवस्था में बच्चों को इस रोग की छूत न लग जाय, क्योंकि प्रायः इसी छोटी अवस्था में यह रोग शरीर में घर करता है, चाहे कुछ बड़े होने तक भी यह रोग स्पष्ट रूप से अपने लक्षण न प्रकट करे। इस रोग को रोकने के लिए जहां तक हो सके, खूब खुली हवा और धूप में रहना आवश्यक है। इन प्राकृतिक साधनों से बच्चों में इस रोग का सामना करने की शक्ति बढ़ती है।

बच्चे को छातियों का दूध पिलाने से उनकी जीवनों शक्ति बढ़ती है। पर यदि माता अथवा दूध पिलानेवाली दाई को यह रोग हो तो उसका दूध कभी और किसी दशा में भी बच्चे को नहीं पीने देना चाहिए। यदि बच्चे को कृत्रिम रूप से दूध पिलाया जाता हो तो पिलाया जानेवाला दूध ऐसा होना चाहिए जिसमें इस रोग के कोटाणु बिलकुल न हो। माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को साफ़ और अच्छा दूध पिलाने पर पूरा पूरा ध्यान दे। बच्चे को दूध बहुत सोच समझ कर देना चाहिए और उसकी मात्रा आदि के सम्बन्ध में बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि बच्चे को आवश्यकता से अधिक या कम दूध पिलाया जायगा तो अवश्य ही उसे हानि पहुँचेगी। इन

दोनों ही बातों से उसकी रोग का सामना करनेवाली शक्ति घटेगी।

नियमित रूप से व्यायाम, स्नान और शरीर की मालिश करने से वज्रे के रण-पुढ़े मज़बूत होते हैं और खुली हवा में सास लेने का व्यायाम करने से फेफड़े मज़बूत होते हैं। प्रायः धनवान् लोगों के वज्रे जो बहुत दुखले-पतले और पीले दिखाई पड़ते हैं, उसका कारण यही होता है कि अधिक भोजन करने के कारण उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। वज्रों को घर के अन्दर चुपचाप पड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाहर निकलकर खूब ताज़ी और साफ़ हवा खानी चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। नहीं तो वे पीले पड़ जायेंगे और कमज़ोर हो जायेंगे। ऐसे वज्रे बहुत जल्दी इस रोग का शिकार हो जाते हैं।

वज्रों को इस रोग से बचाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि जहाँ कोई अजनबी आदमी आवे, वहाँ वे यह सन्देह कर लें कि कहाँ इसे ज्यय-रोग तो नहीं है; और बहुत छोटे वज्रों को अजनबी आदमियों की गोद में न जाने दें और वे लोग वज्रों को चूमन न पावें। जिन लोगों को यह रोग रहता है, उनके खांसने, बोलने, छाँकने और चूमने आदि से तो वज्रों को यह रोग होता ही है, बल्कि उनके पास रहने से भी वज्रों को यह रोग हो जाने का भय रहता है। ऐसे लोगों से, फिर चाहे वे वज्रे के माता-पिता या घर के ही लोग क्यों न हों, वज्रों को बहुत दूर रखना चाहिए और उन्हें कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने देना चाहिए। जिन लोगों को यह रोग हो, उनके विस्तर पर वज्रे को कभी सुलाना नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे बुड़े हुआ करते हैं जो बारहों महीने डिन-रात खांसा करते हैं। ऐसे लोगों का साधारण खासी का रोग नहीं होता, बल्कि फेफड़ों का तपेड़िक होता है। इसलिए छोटे और विशेषतः दूध पीनेवाले वज्रों को कभी ऐसे बुड़े आदमियों के पास नहीं रहने देना चाहिए। घर के मालिक का

यह कर्तव्य है कि अगर घर में किसी को पुरानी खासी हो और उसके मुँह से बराबर कफ आदि निकलता रहता हो तो वह उस खासी के कारण का पता लगावे और उसके थूक या कफ की कई बार अच्छी तरह जांच करावे; और इस बात का प्रबन्ध करे कि जब तक वह खासी बनी रहे, तब तक उसके अनुसार स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का ठीक ठीक पालन हो। जब घर में किसीको यह रोग हो, तब माता को इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इस रोग के कीड़े थूक और खलार आदि के द्वारा चारों ओर फैलने न पावें; क्योंकि ये सब चीज़ें सूखकर धूल में मिल जाती हैं और हवा के फोकों के साथ बच्चों के शरीर के अन्दर चली जाती हैं और तब उन्हें यह रोग हो जाता है। इस रोग के रोगी जिन बरतनों या थालियों आदि में खाते पीते हों, उन बरतनों में बच्चों को कभी भोजन न देना चाहिए। जिन माता-पिता को ज्यारे रोग हो, उन्हें बच्चों का भोजन कभी रखना नहीं चाहिए और न उनके खाने की चीज़ें मुँह से फूंक कर ढंडी करनी चाहिए।

जब माता-पिता बड़े नगरों में अपने रहने का घर बदले या गरमी के दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जायें, तब उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। यह पता लगा लेना चाहिए कि जो मकान हम ले रहे हैं, उनमें पहले कौन और कैसे लोग रहते थे। यदि उस घर में ज्य का कोई रोगी रह चुका हो या मर गया होतो उसे बिना पूरी तरह से और वैज्ञानिक रीति से साफ़ कराये और उसमें के कीटाणुओं को नष्ट किये अपने ज्यवहार में नहीं लाना चाहिए। इन्हीं कारणों से किराये के क़ालीन और मेज़-कुर्सियां आदि नहीं लेनी चाहिए। यदि ऐसी चीज़े ली भी जायें तो उनका ज्यवहार करने से पहले उन्हें कई दिनों तक खूब अच्छी तरह तेज़ धूप में रख कर साफ़ कर लेना चाहिए। फिर पहले एक बार ऐसा करके ही निश्चन्त नहीं हो जाना चाहिए। वीच वीच में बार बार उन्हें धूप दिखलाते रहना चाहिए और मकान में पूरी तरह से धूप और हवा आने का प्रबन्ध रखना चाहिए।

इससे ज्यय रोग के कीड़ों को नष्ट करने में बहुत कुछ सहायता मिलेगी। ऐसी अवस्था में बच्चों के कमरे में मेज़, कुरसी आदि नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि इधर-उधर छुटनों के बल चलने से बच्चे किसी प्रकार रोके नहीं जा सकते। जो सजावट का सामान किराये पर लिया गया हो, उस पर पहले एक साफ़ आदर बिछा देनी चाहिए और तब बच्चों को उन पर बैठने या लेटने देना चाहिए।

जिन बच्चों को ज्यय रोग हो, उनकी देख-रेख और पालन-पोषण बहुत ही सावधानी के साथ होना चाहिए। यदि उन्हें जुकाम या खांसी हो तो तुरन्त किसी अच्छे डाक्टर से उनकी चिकित्सा करानी चाहिए। यदि उन्हें खसरा या काली खांसी हो तो उन्हें बीमारी की दशा में और उसके बाद कुछ अच्छे होने की दशा में साफ़ और ताज़ी हवा पहुँचाने का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए; और स्वास्थ्य-रक्षा के सब नियमों का पूरा पूरा पालन करना चाहिए, जिसमें रोग बढ़ कर ज्यय का रूप न घारण कर ले। जिन बच्चों का ज्यय रोग वाले परिवार में जन्म हो, उन्हें अच्छा और पोषक भोजन दिया जाना चाहिए; और जहा तक हो सके, उन्हें शारीरिक और मानसिक परिश्रम और चिन्ता आदि से बचाना चाहिए।

पहाड़ की हवा का बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा और बलकारक प्रभाव पड़ता है। यदि माता-पिता की आर्थिक अवस्था अच्छी हो तो उन्हें चाहिए कि वे गरमी के दिनों में अपने उन बच्चों को पहाड़ पर भेज दिया करें जिन्हें ज्यय रोग हो।

खसरा—छोटे बच्चों को होनेवाला यह भी एक बहुत कूत-खाला रोग है। जो बच्चे इस रोग के प्रभाव-क्षेत्र में रहते हैं, प्रायः उन सभी को यह रोग हो जाता है। माता-पिता इस रोग की प्रायः कोई विशेष चिकित्सा नहीं करते। पर यह बहुत ही भीषण रोग है जो बहुधा छोटे बच्चों के लिए धातक सिद्ध होता है। इस-लिए जब बच्चे को यह रोग हो, तब माता-पिता को चाहिए कि उसे किसी अच्छे और अनुभवी चिकित्सक की देख-रेख में रखें।

इसमें पहले बच्चे को साधारण जुकाम होता है, उसकी अखिले और नाक से पानी बहता है, उसे छाँकें आती है और बुखार हो आता है। कभी कभी तो बहुत तेज़ बुखार हो आता है। चेहरे में सूजन हो जाती है। बुखार होने के चौथे या पांचवे दिन इसके दाने दिखाई पड़ने लगते हैं। पहले ये दाने कान के नीचे और चेहरे पर निकलते हैं और तब धीरे धीरे सारे सरीर में फैल जाते हैं। ये दाने क़रीब छः दिन तक रहते हैं। खसरे में जो खांसी होती है, उससे बच्चे को बहुत अधिक कष्ट होता है। इसमें साथ साथ सर्स की नालियों की सूजन या ब्रान्काइटिस (Bronchitis) नामक रोग भी हो जाता है जो आगे चल कर न्यूमोनिया का रूप भी धारण कर सकता है। जिन दिनों बच्चे को बुखार आता हो, उन दिनों यदि उसे भोजन देने में कुछ भूल की जाय और उसे ठोस भोजन दिया जाय तो उसके पाचन में भी विकार आ जाने की सम्भावना रहती है।

(१) उपयोगी सूचनायें—सेवा-सुशूषा बहुत ही ध्यानपूर्वक करने की आवश्यकता होती है।

(२) रोगी को बहुत काफ़ी साफ़ और ताज़ी हवा पहुँचानी चाहिए; पर साथ ही इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें हवा के तेज़ और ढंडे झोके न लगने पावें।

(३) उसका भोजन सदा तरल या द्रव रूप में होना चाहिए।

मलेरिया—यह भी एक छूतवाला रोग है और मच्छड़ के काटने से शरीर के रक्त में एक विशेष प्रकार के कीड़ों के पहुँच जाने से होता है। यह रोग छोटे बड़े सभी को हो सकता है; इसके लिए उमर का कोई बन्धन नहीं है। दूध पीते और छोटे बच्चों को यह रोग होने का और भी अधिक डर रहता है और उन्हें नया और पुराना दोनों ही प्रकार का यह रोग हो सकता है; अर्थात् यह भी हो सकता है कि एक बार होने पर जल्दी पीछा न छोड़े और पुराना पढ़ जाय। जब यह बुखार एक या दो बार होता है, तब उस पर विशेष ध्यान

नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चों को बुखार होना माता-पिता एक साधारण सी बात समझते हैं। हाँ जब इसके आक्रमण बार बार होने लगते हैं, तब उन्हें उसकी विशेष चिन्ता होने लगती है। बच्चों को मलेरिया के विष से होनेवाला बुखार बहुत तेज़ हो सकता है; पर वह दिन-रात में नित्य एक बार बिलकुल उत्तर जाता है। लेकिन केवल इसी कारण माता-पिता को यह उचित नहीं है कि वे आरम्भ में इसकी चिकित्सा की ओर से निश्चिन्त या बदासीन रहें। बार बार यह बुखार होने से शरीर बहुत हुर्मूल हो जाता है और रोगों का सामना करने की शक्ति इतनी घट जाती है कि जब यह बुखार आगे चलकर न्यूमोनिया या क्षय रोग का रूप धारण करता है, तब बच्चा उसके कारण बहुत जल्दी मर जाता है। बहुत से बच्चों को जो फेफड़े के रोग हुआ करते हैं, यदि उनका मूल देखा जाय तो पता चलेगा कि वे रोग इस मलेरिया ऊंचर की पूरी पूरी चिकित्सा न करने और इससे बे-परवाह रहने के कारण ही होते हैं। इसलिए इस रोग के होते ही आरम्भ में इसकी पूरी पूरी चिकित्सा करनी चाहिए, जिसमें यह पुराना होकर जड़ न पकड़ ले। यदि मलेरिया का इलाज आरम्भ में ही और पूरा पूरा किया जाय, तो समाज में क्षय रोग के जो इतने अधिक रोगी देखने में आते हैं, उनकी संख्या बहुत ही घट जाय।

(१) रोकने के उपाय—जिन प्रान्तों में मलेरिया होता हो, वहाँ मच्छरों का पूरी तरह से नाश कर देना चाहिए। दलदल-बाली भूमि को अच्छी तरह साफ़ कर देना चाहिए; क्योंकि गन्दे तालाबों और दलदलों आदि के कारण उनके आस-पास रहनेवाले दूध-पीते और दूसरे बच्चों को मलेरिया का आक्रमण होने का बहुत भय रहता है। यह काम सरकार, म्यूनिसिपैलिट्या और दूसरी स्थानीय संस्थाएं कर सकती है।

(२) बीच बीच में कमरों में धूप और इसी प्रकार के दूसरे सुग-निधत् द्रव्य जलाने चाहिए, जैसा कि प्राचीन काल में भारत में हर घर

मे हुआ करता था। इससे मलेरिया ज्वर का प्रसार बहुत कम हो जाता है। मैन्सन साहब का मत है कि सुखाये हुए सूरजमुखी के फूलों का खुर्चा घर मे करना चाहिए।

(३) रसोई-घर मे और उसके आस-पास गन्दगी नहीं रहने देनी चाहिए; क्योंकि उससे मक्खियाँ और मच्छर बहुत बढ़ते हैं।

(४) कमरे के दरवाजों और खिड़कियों मे परदे लगे रहने चाहिए और बच्चों की पलंगड़ियों पर मसहरी लगी रहनी चाहिए।

(५) जहाँ तक हो सके, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि बच्चों को सरदी न लगाने पावे और जुकाम न हो सके।

(६) मलेरिया ज्वर की सबसे अच्छी दवा कुनीन है। इस रोग को दूर करने के लिए यह हर घर मे रखी जाने के योग्य है। इसका व्यवहार कराने से बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता और यह बुखार बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है।

पेचिश या मरोड़—भारत में बच्चों को यह रोग प्रायः हो जाया करता है। इससे बच्चे प्रायः बहुत अधिक दुखले और कमज़ोर हो जाते हैं और कभी कभी तो मर भी जाते हैं। इसमे लेसदार भल निकलता है, जिसमे कुछ खून भी मिला होता है; पेट मे बहुत दरद होता है और कठिनाई से पाखाना उतरता है और रोगी बहुत दुखला हो जाता है। ये सब लक्षण देखकर एक साधारण आदमी भी समझ लेता है कि यह पेचिश या मरोड़ का रोग है। जिन बच्चों को यह रोग होता है, वे प्रायः पाखाने मे ही बैठे रहते हैं और वहां से हटना नहीं चाहते। दिनरात मे दस से पचास बार तक और कभी कभी इससे भी अधिक पाखाने होते हैं। बच्चे के बार बार पाखाना फिरने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, उसके पेट मे बहुत तेज़ दरद या मरोड़ होता है और उसे बहुत घ्यास लगती है जिससे उसे बहुत अधिक कष्ट होता है। रात को उसे अच्छी तरह नींद नहीं आती और न भूख ही लगती है। पाखाने के रास्ते खून

जाने के कारण बच्चे का बल बहुत घट जाता है और वह बहुत दुखला दिखाई पड़ने लगता है। यदि इस रोग का अच्छी तरह इलाज न किया जाय तो वह बार बार होने लगता है। जो मल आदि निकले, वह अच्छी तरह वहा डिया जाय या दूर कर दिया जाय। माता को चाहिए कि वह स्वयं अपने कल्याण के विचार से भी और आस पास रहनेवाले दूसरे लोगों के कल्याण के विचार से भी सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखे।

टाइफायड ज्वर—यह छूतबाला रोग भी बच्चों के ग्रायः हुआ करता है। माँ का दूध पीनेवाले बच्चों को भी यह रोग होता हुआ देखा जाता है। सम्मवतः यह स्नान करने के जल की खुखारी के कारण होता है। साधारणतः जल, पेशाव और मक्खियों के द्वारा यह रोग फैलता है। इस रोग का मूल आर्तों में होता है और वह भी एक प्रकार के कीढ़ों के ही कारण होता है। माता-पिता के लिए यही जान लेना काफ़ी है कि इस खुखार में रोगी को दो या तीन हफ्तों तक लगातार खुखार चढ़ा रहता है। कुछ अवस्थाओं में तो यह खुखार चालीस दिनों तक या इससे भी और अधिक दिनों तक रहता है। सबेरे के समय ग्रायः हल्का और सन्ध्या के समय तेज़ खुखार रहता है।

अधिक तेज़ खुखार रहने, भूख घट जाने, अधिक ठस्त होने और रात के पूरी तरह से नोंद न आने के कारण शरीर बहुत दुर्बल हो जाता है। पर जब यह रोग अच्छा हो जाता है, तब बच्चा फिर बहुत जलदी स्वस्थ और बलवान् हो जाता है। इस टाइफायड ज्वर की पहचान करने के लिए माता-पिता ग्रायः यह ढेखते हैं कि बच्चे के पेट, छाती और गरदन पर ढाने निकले हैं या नहीं। पर उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि वे ढाने सहज में नहीं देखे जा सकते; क्योंकि वे बहुत ही थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाते या दब जाते हैं। इसके सिवा उन्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कुछ रोगियों को सारी बीमारी की अवस्था में ये ढाने बिलकुल निकलते ही नहीं।

रोकने के उपाय—बच्चों को इस रोग से बचाने के जो उपाय किये जाते हैं, उनमें प्रायः अधिक सफलता नहीं होती। पर आदि साफ़ पानी का व्यवहार किया जाय, टाइफायड ज्वर के रोगी का पाखाना और पेशाव खूब अच्छी तरह साफ़ करके वहां दिया जाय और उस स्थान पर कीटाणुनाशक उपाय (Disinfection) किये जायें, खाने पीने की चीज़ों को मनिखयों से बचाया जाय और जब वच्चे धूल-मिट्टी में खेलकर आवे, तब उनके हाथ-पैर आदि खूब अच्छी तरह साफ़ करके छुला दिये जायें तो इस रोग से बच्चों की बहुत कुछ रक्षा हो सकती है। पाखाना फिरने और पेशाव करने की जगह पर आदि फिनाइल डाल दी जाय और पहनने के कपड़े गरम पानी में अच्छी तरह उबाल लिये जायें तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग टाइफायड के रोगियों की सेवा-सुश्रूपा करते हों, उन्हें अपने हाथ सदा खूब अच्छी तरह साफ़ कर लेने चाहिए।

इस ज्वर की अवस्था में उबाल कर ढंडा किया हुआ पानी बहुत अधिकता से देना चाहिए। रोगी के रहने के कमरे में सदा साफ़ और ताज़ी हवा आने देनी चाहिए और ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि उसमें हवा और रोशनी अच्छी तरह आवे। मुँह खूब अच्छी तरह साफ़ कराना चाहिए जिसमें सुँह भे अन्दर इस रोग के कीटाणु अपना दुरा प्रभाव न डाल सके। यह काम गरम पानी से कुख्ला करके अच्छी तरह किया जा सकता है। वच्चे की सब चीज़ों की सफाई पर और विशेषतः उसके पाखाना फिरने के बाद की सफाई पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से रोगी की पीठ में बे दाने और ज़ख्म आदि न हो सकेंगे जो विस्तर पर पड़े रहने के कारण हुआ करते हैं। बीच बीच में वच्चे की करबट बदल देने से भी यही बात होती है।

उपयोगी सूचनायें—इस रोग में देचारे छोटे वच्चों की कोई अग्रिय और कष्टदायक चिकित्सा करने के बढ़ले उन्हें यों ही छोड़ देना अधिक उत्तम है। अनेक प्रकार की दवायें देने से वच्चों के टाइफायड-

बवर का न तो समय ही कम होता है और न उसकी विकटता ही घटती है। हाँ, कभी कभी वे दवायें विशेषरूप से धातक अवश्य सिद्ध होती हैं। कभी कभी तो डाक्टर लोग नुसख़ों में ऐसी दवाये भर देते हैं जो बच्चे के स्वस्थ होने में और भी बाधक होती हैं। छोटे बच्चे यह बुखार बहुत अच्छी तरह सह सकते हैं और यदि उन्हे अधिक बाधा न पहुँचाई जाय तो वे १०२ डिग्री या इससे भी अधिक बुखार होने पर भी अच्छी तरह से विस्तर पर बैठकर खेल सकते हैं।

इस रोग की दशा में बच्चे को पोषक भोजन देने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस रोग में यह बात सबसे अधिक महत्व की है। जब तक यह बुखार रहे, तब तक उसे केवल दूध, शोरबा, रस या इसी प्रकार के और तरल पदार्थ ही खाने को देने चाहिए। ये चीज़े थोड़ी थोड़ी देर पर और थोड़ी थोड़ी मात्रा में दी जानी चाहिए। दो से तीन घंटों के अन्तर पर ये चीज़े दी जा सकती हैं। जब तक यह बुखार रहता है, तब तक प्रायः कुछ खाने पीने को जी नहीं चाहता; और यदि बच्चा जिही होता है तो तरल पदार्थ पीने से इनकार कर देता है। ऐसी अवस्था में माता-पिता को चाहिए कि वे उसकी नाक के नथने बन्द कर दे जिसमें वह मुँह खोल दे और उसके मुँह खोलने पर वह तरल पदार्थ उसके मुँह में ढाल दे; और जब तक वह पदार्थ उसके गले से नीचे न उतर जाय, तब तक उसकी नाक बन्द ही रखे। दवायें देने के लिए भी यही उपाय किया जा सकता है।

जब यह बुखार घटने लगता है, तब बहुत ज़ोरों की भूख लगती है और बच्चा प्रायः ऐसी चीज़े खाने को मांगता है जो उसे सहज में पच नहीं सकतीं। इसलिए उचित समय से पहले ही कभी ठोस भोजन देकर उसकी खाने की इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए। यदि माता-पिता बच्चे की दशा पर दया करके उसे मांस, रोटी, मिठाई या इसी प्रकार का और कोई ठोस पदार्थ खाने को दे देंगे, तो वह बहुत अधिक धातक होगा। बुखार घटने की अवस्था में या उसके बाद

कमज़ोर रहने की दशा में यदि माता-पिता इडता से काम न लेगे और बच्चे को किसी प्रकार का ठोस भोजन दे देंगे, तो रोग के फिर से उभड़ आने का भय रहेगा। बुखार पूरी तरह से उत्तर जाने के कम से कम एक सप्ताह बाद तक बच्चे को कभी ठोस भोजन न देना चाहिए; और यदि यह रोग अधिक बिकट और भीषण रूप में हुआ हो तो इससे भी कुछ और अधिक समय तक कभी ठोस भोजन नहीं देना चाहिए।

ग्यारहवाँ प्रकरण

बच्चों में मस्तिष्क के विकार^१

माता के प्रति—इस प्रकरण में यह बतलाया गया है कि यदि जन्म से ही बच्चे के मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार हो तो घर में ही उसका अव्यवन्ध और इलाज करने के लिए तुम्हें किन किन बातों के जानने की आवश्यकता है।

सबसे पहले तो तुम्हे यह जानना चाहिए कि जो समस्या तुम्हारे सामने उपस्थित है, वह कितने अधिक महत्त्व की है। जिन बच्चों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार होता है, वे जन्म लेने के समय से लेकर मरने के समय तक माता-पिता के लिए बहुत ही चिन्ता और दुःख का कारण हुआ करते हैं और दूसरे लोगों को भी उनसे बहुत कुछ कष्ट पहुँचता है। वे समाज के लिए भी भय का कारण होते हैं, क्योंकि वे समाज को बहुत कुछ हानि भी पहुँचा सकते हैं और उत्पात या उपद्रव भी कर सकते हैं। इसके सिवा वे कुछ धन नहीं कमाते और माता-पिता पर अपने ख़र्च का जो ब्यर्थ भार लादते हैं, वह अलग है। बच्चों का कोई ऐसा रोग नहीं है जिसमें माता-पिता के धैर्य और अध्यवसाय की उसनी अधिक परीक्षा होती हो जितनी कि

(१) इस प्रकरण का अधिक अंश एडिन्बरा के डा० जान थासन के उपदेशों के आधार पर लिखा गया है, जो मस्तिष्क-सम्बन्धी विकारों की चिकित्सा करने में सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। मई १९२४ के एडिन्बरा मेडिकल जरनल में मानसिक त्रिटियों के सम्बन्ध में उनके जो व्याख्यान छपे थे, उनसे मुझे इस प्रकरण के लिखने में विशेष सहायता मिली है और इसलिए मैं उनका बहुत अधिक ज्ञानी हूँ।

बच्चों की मानसिक त्रुटि में होती है। साथ ही तुम्हे यह भी समझ रखना चाहिए कि भारत में ऐसी बहुत ही थोड़ी स्थिति है जो इस प्रकार के बच्चों की ठीक तरह से देखने-रेख करती हो। इसलिए ऐसे बच्चे को पूरी तरह से स्वयं तुम्हारे ही ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धैर्य और अध्यवसाय पर निर्भर रहना पड़ता है। हम ज़ोर देकर यह बात भी समझा देना चाहते हैं कि यदि तुम समय रहते ही यह समझ लोगी कि तुम्हारे बच्चे के मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार है, तो सम्भव है कि तुम्हारे इलाज का बहुत कुछ अच्छा फल हो सके; या कम से कम यही होगा कि इस तरह के बच्चे स्वयं अपने आपको और दूसरों को जो कष्ट पहुँचाते हैं, वही बहुत कुछ कम हो जायगा।

इसलिए तुम उन सब उपायों को बहुत अच्छी तरह सीखने का चढ़ निश्चय कर लो जिनसे ऐसे बच्चों की व्यवस्था करने में सफलता हो सकती है। इस ज्ञान से तुमसे आत्म-विश्वास उत्पन्न होगा, तुम्हारा दुःख और चिन्ता दूर हो जायगी और मनुष्य-जाति में जो बच्चे प्रकृति की ओर से ही अभागे उत्पन्न होते हैं, उनके प्रति तुमसे सहायता, सहनशीलता और दया आदि के उच्च और शेष गुण उत्पन्न होंगे।

आरम्भिक बातें—मानसिक त्रुटि या विकार की ठीक और पूरी व्याख्या करना बहुत अधिक कठिन है; पर मातान-पिता को मार्ग दिखाने के लिए फिर भी यहाँ इतना कहा जा सकता है कि जिन बच्चों में नीचे लिखी त्रुटियाँ पाई जायें, उन्हें त्रुटिपूर्ण मस्तिष्कवाले बच्चों के चर्ग से रखा जा सकता है।

मानसिक त्रुटि में केवल बुद्धिमत्ता या समझदारी का अभाव ही नहीं होता, बल्कि इच्छा-शक्ति की भी कमी होती है। जिस बच्चे के मस्तिष्क में किसी प्रकार की त्रुटि या विकार होता है, वह अपने करने के लिए जो बात निश्चित करता है, उसे पूरा करने के लिए उसमें अथेष्ट दृढ़ता नहीं होती। वह न तो कोई नया काम करने का ढंग

सोच सकता है और न उसका परिणाम ही समझ सकता है। वह अच्छी और बुरी बातों को नहीं पहचान सकता; समझदारी से काम नहीं ले सकता; और जिस ढंग से कोई काम करना चाहिए, उस ढंग से काम नहीं कर सकता और अपने बराबर के बच्चों के समान शिक्षा नहीं पा सकता। उसमें साधारण समझ इतनी कम होती है कि न तो वह अपनी उमर ही बतला सकता है और न वीस तक गिनती ही गिन सकता है। यह ठीक है कि कहीं तो मस्तिष्क-सम्बन्धी विकार बहुत कम और कहीं बहुत अधिक होते हैं; लेकिन फिर भी ऊपर जो कई बातें बतलाई गई हैं, उनसे माता-पिता यह समझ सकते हैं कि उनके बच्चों में इनमें से कोई लक्षण है या नहीं। जिस बच्चे में मस्तिष्क-सम्बन्धी विकार बहुत अधिक होता है, वह साधारण शारीरिक संकट आने पर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, न अपनी जीविका के लिए कुछ धन ही कमा सकता है; और न साधारण परिणामदर्शिता के साथ अपना या अपने कामों का ठीक ठीक प्रबन्ध ही कर सकता है। अथवा बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका पाखन-पोषण और शिक्षा आदि का प्रबन्ध करने पर भी उसकी तबीयत का मुकाब अनेक प्रकार के अपराध करने की ओर हो सकता है, जो ढंड देने से या तो विलक्षण रुकती ही नहीं और या बहुत ही कम रुकती है। तापर्य यह कि वह अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में असमर्थ होता है।

यहाँ विशेषतः ऐसे ही छोटे बच्चों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है जिनमें आगे चलकर इस प्रकार के दोप उत्पन्न हो सकते या विकसित हो सकते हैं। इस प्रकरण में यही बतलाया जायगा कि मे दोप किन किन कारणों से होते हैं, आरम्भ में ही उनकी पहचान किस प्रकार की जानी चाहिए और ऐसे बच्चों की किस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए।

आरम्भ में ही किसी छोटे बच्चे को देखकर यह समझ लेना कोई सहज काम नहीं है कि इसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार या

नुष्टि है। पर यदि नीचे लिखी बातों पर माता पूरा पूरा ध्यान देगी, तो यदि उसके बच्चे में किसी प्रकार का मस्तिष्क-सम्बन्धी दोष होगा, तो वह अपेक्षाकृत कुछ जल्दी ही उसे समझ जायगी और परिस्थितियों के अनुसार उसे दूर करने के उपाय भी जल्दी कर सकेगी। बच्चे के जन्म लेने के बहुत दिनों बाद तक भी स्वयं माता-पिता यह नहीं जानते कि बच्चे में किसी प्रकार का मस्तिष्क-सम्बन्धी विकार है या नहीं। यह प्रायः ठीक ज्ञान न होने के कारण ही होता है। पर किया क्या जाय; माताये अपने बच्चे की अपूर्णतायें और दोष आदि देखने में बिलकुल अनंगी ही होती हैं; उन्हें अपने बच्चे का कोई दोष या अपूर्णता दिखाई ही नहीं देती।

कारण — बच्चे की इस अवस्था के लिए माता-पिता ही कम या अधिक अंश में उत्तरदायी होते हैं; और जो अनुचित काम वे जान बूझकर या अनजान में करते हैं, उनका दंड उन्हे सुगतना ही पड़ता है। शराब और गरमी आदि के कुछ ऐसे विष होते हैं जो यदि माता-पिता के शरीर में हो, तो उनसे उनकी सन्तान को भी हानि पहुँचती ही है। यदि माता या पिता किसी में स्नायु-सम्बन्धी बहुत अधिक दुर्बलता हो तो उनके बच्चों के मस्तिष्क में भी कुछ न कुछ कमी या ख़राबी हो जाती है। जिस परिवार में किसी को अथवा कई आदमियों को ज्यय-रोग हुआ हो, उस परिवार के बच्चों में भी मस्तिष्क-सम्बन्धी दोष पाये जाते हैं। यदि माता-पिता में सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति बहुत घट गई हो और उस दशा में भी वे सन्तान उत्पन्न करे तो भी उनकी सन्तान के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विकार होते हैं। यदि गर्भाधान के समय माता या पिता को किसी प्रकार का मानसिक रोग हो, गर्भ की अवस्था में माता यदि दूषित या ख़राब भोजन करे, उसका स्वास्थ्य ख़राब हो जाय, किसी दुर्घटना आदि के कारण उसे भारी शारीरिक या मानसिक आघात पहुँचे, तो भी उनकी सन्तान के मस्तिष्क में बहुत कुछ विकार आ जाते हैं। डा० वैडेलो स्मिथ ने “मस्तिष्क का स्वास्थ्य और रोग” (The Mind

in Health and Disease) नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने बतलाया है कि माता-पिता की किन किन अवस्थाओं का बच्चे के मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव पड़ता है और बच्चों का दिमाग् किस तरह ख़राब होता है। वे नियम इस प्रकार हैं।

(१) यदि साधारण अवस्था के माता-पिता हो और उन दोनों के परिवारों में कभी किसी को कोई मानसिक या मस्तिष्क-सम्बन्धी विकार न हुआ हो, तो उनसे उत्पन्न होनेवाली सन्तान का मस्तिष्क भी साधारण ही होगा। साथ ही ऐसी माता से उनकी सन्तान में किसी प्रकार का मस्तिष्क-सम्बन्धी विकार न पहुँच सकेगा।

(२) यदि साधारण अवस्था का कोई पुरुष या स्त्री, जिसके बंश में किसी को कभी कोई मस्तिष्क-सम्बन्धी विकार न हुआ हो, किसी ऐसे पुरुष या स्त्री से विवाह करे जिसमें मस्तिष्क-सम्बन्धी कोई दोष या विकार हो तो चाहे उनके सभी बच्चे मस्तिष्क के विचार से साधारण अवस्था के ही बच्चों न हो, परं फिर भी उनमें से कुछ बच्चे अवश्य ऐसे होंगे जिनके दिमाग् में कुछ न कुछ ख़राबी होगी ही। यदि माता या पिता में से किसी एक का मस्तिष्क पूरी तरह से ख़राब या त्रुटिपूर्ण होगा तो उनके आधे बच्चों के मस्तिष्क में ख़राबी या त्रुटि होगी। परं यदि माता या पिता में से किसी एक के मस्तिष्क में कोई ऐसा विकार होगा जो ऊपर से दिखाई न पड़ता हो, तो उनके चार बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसके मस्तिष्क में कुछ न कुछ ख़राबी या विकार के लक्षण पाये जायेंगे।

(३) यदि माता और पिता ऊपर से देखने में तो साधारण अवस्था के जान पड़ेंगे, परं फिर भी उनके दिमाग् में किसी तरह की छिपी हुई ख़राबी होगी तो उनके चार बच्चों में से एक बच्चे का दिमाग् ख़राब होगा। साथ ही यदि उनके बच्चों में से ऊपर से देखने पर कोई ख़राबी न जान पड़े तो भी उनके हर तीन बच्चों में से दो बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग् के अन्दर कुछ न कुछ ख़राबी होगी और एक बच्चा ऐसा होगा जिसके दिमाग् में कुछ भी ख़राबी न होगी।

(३) यदि माता और पिता दोनों का दिमाग़ ख़राब होगा तो उनके हर एक बच्चे का दिमाग़ भी ख़राब होगा।

ऊपर बतलाये हुए कारणों के सिवा कुछ ऐसे अज्ञात कारण भी हैं जिनसे बच्चों के दिमाग़ में ख़राबी होती है।

बच्चे के मस्तिष्क-सम्बन्धी विकार जानना—यदि बच्चे को दूध पिलाने में बहुत कठिनता होती हो और बच्चे तथा माता दोनों की अच्छी तरह जाँच कराने पर इसके किसी शारीरिक कारण का पता न चले तो यह सन्देह करना चाहिए कि बच्चे के मस्तिष्क में किसी प्रकार की त्रुटि या विकार है। जो बच्चा साधारणतः स्वस्थ होता है, वह दो महीने का होने पर सुन्दर और चमकीला प्रकाश देखकर या मधुर शब्द सुनकर प्रसन्न होता है। जिधर से शोर सुनाई पड़ता हो, उधर इस उमर में वह देखने लगता है और उसके स्वरूप के अनुसार अपना सन्तोष या दुःख प्रकट करता है। इसके विपरीत जिस बच्चे का मस्तिष्क ठीक नहीं होता, वह किसी एक ही ओर बिना किसी उद्देश्य या लिंगित वस्तु की ओर देखे यें ही टक लगाकर देखा करता है और शोर आदि की ओर से उदासीन रहता है। इससे यह पता चलता है कि उसकी आखिं और कान ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं और उसके दिमाग़ में इन सब बातों को समझने और इनका अनुभव करने की शक्ति नहीं है।

जो बच्चा साधारणतः सब प्रकार से स्वस्थ होता है, वह प्रायः तीन महीने का होने पर अपना सिर सीधा कर सकता है। चौथे महीने अथवा पांचवे महीने से पहले तो वह अवश्य ही सिर उठाने के योग्य हो जाता है। पर जिस बच्चे में साधारणतः कोई कमी होती है, वह इस अवस्था का होने पर अपना सिर ऊपर उठाने की कौन कहे, उसे सीधा करने या सँभालने का प्रयत्न भी करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता।

जो बच्चा साधारणतः स्वस्थ होता है, वह चार महीने का होने वर्लिंग इससे कुछ पहले ही अर्थात् तीन महीने का होने पर अपनी माँ

या ढाई को पहचानने लगता है। यदि इतना खड़ा हो जाने पर भी बच्चा अपनी ढाई या दूध पीने की ओरत न पहचाने तो यह सन्देह करना ठीक हो सकता है कि इसका दिमाग़ ठीक नहीं है, उसमें कोई ख़राबी है।

जो बच्चा साधारणतः सब प्रकार से स्वस्थ होगा, वह छः महीने का होने पर खिलौनों आदि से खेलने लगेगा। और यदि उस समय उसे खिलौने आदि लेने में आनन्द न मिलता हो तो माता को समझ लेना चाहिए कि इसके दिमाग़ में कुछ ख़राबी है। जिन बच्चों का दिमाग़ ठीक नहीं होता, उन्हें चमकीले रङ और खिलौने अपनी ओर नहीं खींचते। ऐसे बच्चे बहुत बोडे होते हैं और उनके मस्तिष्क पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माताये अपने अज्ञान के कारण बच्चे के इस बोडेपन और मूर्खता को उसका सीधापन समझ लेती है। पर ऐसा समझना भूल है।

साधारणतः बच्चे आठ या नौ महीने की अवस्था में उठकर बैठने के योग्य हो जाते हैं। पर यदि उनके दिमाग़ में कोई ख़राबी या असाधारण बात होती है तो वे ऐसा नहीं कर सकते।

साधारणतः तन्हुरुस्त बच्चा बारह महीने का होने पर दूसरे आठमी के सहारे से उठकर खड़ा होने के योग्य हो जाता है। पर जिसमें कोई ख़राबी होती है, उसे उठकर खड़े होने में बहुत देर लगती है।

ऊपर अलग अलग बातों के जो अलग अलग समय बताये गये हैं, वे श्रीसत हिसाब से ठीक हैं। पर स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण कुछ बच्चों में इन बातों में महीने दो महीने का अन्तर भी पड़ सकता है। यदि किसी बच्चे को अपना सिर सँभालने या उठाने, उठकर बैठने, छुटनों के बल चलने, खड़े होने और पैरों से चलने में उचित से अधिक समय लगे या उसे चीज़ें पकड़ने में आनन्द न आता हो तो माता को समझ लेना चाहिए कि ये लक्षण अच्छे नहीं हैं। जिस बच्चे का दिमाग़ ठीक नहीं होता, वह जब तक ढाई बरस का नहीं होता,

तब तक आप से आप बिना किसी सहारे के बैठ नहीं सकता। पर यदि ढेढ़ बरस का होने पर भी वह बिना किसी सहारे के आपसे बैठने का प्रयत्न न करे तो माता को समझ लेना चाहिए कि इसके दिमाग मे कुछ ख़राबी है।

जन्म लेने पर पहले कुछ सप्ताहों तक बच्चा बिना किसी उड़ेश्य के यो ही हाथ-पैर पटका करता है। पर यदि कुछ बड़ा होने पर भी वह यों ही बिना किसी उड़ेश्य के हाथ-पैर पटकता रहे तो समझना चाहिए कि उसके दिमाग मे कुछ न कुछ चिलचाशता या ख़राबी ज़रूर है। ज्यों ज्यो उसका मस्तिष्क विकसित होता जाता है, त्यो वह अधिक इड़ता के साथ और अधिक व्यवस्थित रूप मे ये सब चेष्टायें करता है। पहले तो ये चेष्टायें आपसे आप होती हैं, पर आगे चलकर ये जानबूझकर और हज़ारपूर्वक की जाती हैं। उदाहरण के लिए वह किसी प्रकाश की ओर देखेगा या आवाज़ उसका ध्यान अपनी ओर खींचेगी। जो चीज़ उसे अच्छी लगेगी, वह उसके पास पहुँचने का प्रयत्न करेगा या उसकी ओर बढ़ने लगेगा। और जब वह चीज़ उसके हाथ मे आ जायगी, तब वह उसे अपने मुँह के पास ले जायगा। यदि वह साधारण स्वस्थ बच्चे की तरह हाथ-पैर न पटक सकता हो या बिना कोई यथेष्ट करण हुए छाती या बोतल से दूध पीने से इनकार करे तो समझ लेना चाहिए कि उसके दिमाग मे कुछ ख़राबी है।

कुछ और बड़ा होने पर बच्चा यह देखने लगता है कि माँ किस ओर जाती है या किधर से आती है। जब माँ उसकी आँखों से ओमल हो जाती है, तब वह रोने चिल्लाने लगता है और जब वह फिर उसके सामने आ जाती है, तब वह हँसने और मुस्कराने लगता है। बच्चे के कुछ विशेष लक्षणों और चेष्टाओं से माता यह समझ लेती है कि बच्चा भूखा है। जो बच्चा साधारणतः सब प्रकार से ठांक होता है, उसमे छोटी अवस्था मे ही भय, क्रोध आदि मनोविकार प्रकट होने लगते हैं। मातायें यह बात अच्छी तरह जानती है कि जब बच्चे का सरदी या

भूख लगती है, तब वह किस तरह बेचैन होता और रोता चिल्लाता है; और जब उसकी वह आवश्यकता पूरी कर दी जाती है, तब वह कैसा शान्त हो जाता है।

ज्यों ज्यों बच्चे के ये मनोभाव बलवान् होते जाते हैं, त्यों त्यों उसका स्वभाव और चरित्र बनता जाता है। उदाहरण के लिए बच्चा यह समझने लगता है कि माता क्या चाहती है और वह अपना व्यवहार उसी की इच्छा के अनुकूल करता है। उसके मन में माता की अप्रसलता का जो भय होता है, वही मानो उसमें बुद्धि या ज्ञान उत्पन्न होने का आरम्भ है। पर जिन बच्चों के दिमाग् में कोई ख़राबी होती है, उनमें यह बात नहीं आती।

बच्चे में बोलने की शक्ति का जो विकास होता है, माता को चाहिए कि उसे बहुत व्यानपूर्वक देखती रहे। यह शक्ति पहले वर्ष के आरम्भ में प्रकट होती है। पहले पहल बच्चे के सुँह से जो शब्द निकलते हैं, वे निरर्थक होते हैं। धीरे धीरे वह उन शब्दों के उच्चारण की नक़ल करना आरम्भ करता है जिसे दूसरे लोग उसके सामने बार बार दोहराते हैं और तब वह उनका अर्थ समझने लगता है। जब वह एक वरस का हो जाता है, तब उसमें कुछ साधारण समझ आ जाती है; पर वह समझ उसी शिक्षा पर निर्भर करती है जो उसे माता-पिता से मिलती है। कुछ बच्चों में तो बोलने की शक्ति कुछ जल्दी आ जाती है और कुछ में देर से आती है। पर साधारणतः दो वरस का हो जाने पर बच्चा क्लोटे क्लोटे वाक्य कहने के योग्य हो जाता है। यदि माता यह देखे कि बच्चे का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता, उसे शब्दों का अर्थ समझने में आवश्यकता से अधिक देर लग रही है और अपनी इच्छाएँ प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करने में भी अधिक समय लग रहा है, तो उसे यह सन्तुष्ट करना चाहिए कि इसके दिमाग् में कुछ ख़राबी है।

माता को चाहिए कि वह आगे लिखी बातों में अपने बच्चे की उतनी ही अवस्था के दूसरे बच्चों के साथ तुलना करे—

(१) आर्थिकों के डेलो और सिर को बार बार इधर से उधर करना बच्चे के लिए एक अस्वाभाविक बात है और माता प्राची की उतनी अवस्था के दूसरे बच्चों में इस प्रकार की गति नहीं दिखलाई पड़ेगी।

(२) यदि बच्चा प्रायः निरर्थक रूप से चिल्जाया करे या बार बार अर्थ ही हँसे तो यह भी उसके लिए उतनी ही अस्वाभाविक और असाधारण सी बात है जितना कि उसका बिलकुल ही न हँसना या न सुस्करना।

यदि बच्चे का सिर या चेहरा आकार में उसके शरीर के और और अंगों के समान न हो, अधिक छोटा या बड़ा हो, तो समझना चाहिए कि इसके दिमाग में कोई ख़राबी है। यदि सिर बहुत ही छोटा हो तो भी समझना चाहिए कि दिमाग में कोई ख़राबी है। यदि उसका मुँह सदा खुला रहता हो या ज़बान बड़ी हो और बाहर की ओर निकली हुई हो तो ये लक्षण भी अच्छे नहीं हैं। यदि हगने और सूतने को काढ़ा में रखने में भी उसे देर लगे तो भी समझना चाहिए कि उसके दिमाग में कोई ख़राबी है।

स्वास्थ्य-रक्षा के उपाय—साधारणतः स्वास्थ्य की रक्षा करने और उसे सुधारने के लो नियम हैं, उन्हीं नियमों का पालन करने से मस्तिष्क के विकार भी कम होते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है कि चयन-रोग को रोकने के सभी उचित उपाय ज़ोरें से किये जाएँ। लोगों को इस बात पर भी पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए कि शराब और नशे की चीज़ों का अवश्यक कम हो और लोगों में गरमी और सूज़ाक आदि जननेन्द्रिय-सम्बन्धी घृणित रोग न फैलने पावें। पहले गर्भिणी खी की देख-रेख के सम्बन्ध में जो बातें बतलाई गई हैं (देखो दूसरा प्रकरण), यदि उनका पूरा पूरा ध्यान रक्षा जाय तो भी समाज में मस्तिष्क-सम्बन्धी विकारों का अतिक्रम और प्रसार बहुत कुछ रोका जा सकता है।

माता-पिता को चाहिए कि वे शराब आदि का विलक्षण व्यवहार न किया करें; और यदि उन्हे गरमी का रोग हो तो उसका पूरा पूरा इलाज करके उसे अच्छी तरह दूर कर ले। बिना इसके उन्हें स्वस्थ सन्तान होने की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि माता या पिता मे से किसी को स्नायु-सम्बन्धी विकार या रोग हो तो वह भी दूर करा देना चाहिए।

जहाँ तक हो सके, बच्चे को साफ़ और ताजी हवा में रखना चाहिए; पर यदि मौसिम ख़ुराब हो तो, उससे उसे बचाना चाहिए। स्वास्थ्य-रक्षा के सम्बन्ध मे जो साधारण नियम हैं, माता के लिए उनके अनुसार चलाना बहुत अच्छा होगा। बच्चे के स्नान, कपड़े, कसरत और भोजन आदि की ठीक ठीक व्यवस्था रखनी चाहिए और उन्हें नियमित रखना चाहिए। यदि हो सके तो एक ऐसा नक़शा बना लेना चाहिए जिसमे प्रतिदिन की और मिन्न मिन्न समयों की दिनचर्यां लिखी रहे और उस नक़शे मे लिखी हुई सब बातों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इस व्यवस्था से बहुत अधिक लाभ होगा।

शरीर के ऊपरी चमड़े या त्वचा की पूरी तरह से रक्षा करना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बीच बीच मे बच्चे को बराबर स्नान कराने और मालिश करने से भी लाभ होता है। घर के बाहर मैदान मे खूब कसरत करना आवश्यक है।

हाथ पैरों की गतिशीलता—बीच बीच मे बच्चे को फूर्झ पर लिटा देना चाहिए और उसे खेलने तथा हाथों पैरों से व्यायाम करने के लिए उत्साहित करना चाहिए।

स्वच्छता—जहाँ तक हो सके, सब प्रकार से बच्चे को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि वह खूब साफ़ रहा करे। कपड़े-कत्ते और दूसरी सभी वातों मे जहाँ तक हो सके, साधारण बच्चों के समान उसकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए।

नियमन—जिन बच्चों के दिमाग् में कोई ख़राबी होती है, उन्हे पाख़ाना ठीक तरह से और साफ़ नहीं होता। उन्हे पाख़ाने और पेशाब के सम्बन्ध में नियमित करने के लिए बहुत कुछ धैर्य और अध्यवसाय की आवश्यकता है। यदि बच्चे को विस्तर पर ही पाख़ाना फ़िरने और पेशाब करने की आदत पढ़ गई हो तो रात को सोने के समय उसे तरल पदार्थ थोड़ी मात्रा में देना चाहिए, उसकी खटोली आदि का पैताना कुछ ज़ैचा कर देना चाहिए और ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि वह चित लेटकर न सोए। इन सब बातों से उसकी यह आदत बहुत कुछ कृष्ट जायगी।

मुँह से लार बहना—यदि बच्चे के मुँह से अधिक लार बहती हो तो उसके होठों के पट्टों को ढङ्क करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें सीटी या विशुल आदि बजाने से बहुत सहायता मिलती है।

भोजन कराना—जिन बच्चों का दिमाग् ठीक नहीं होता, वे बहुत कठिनता से दूध पीते या और कोई चीज़ खाते हैं; इसलिए उन्हे दूध पीने या भोजन करने की शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। जब पहले उन्हे दूध या खाने की ओर कोई चीज़ दी जाती है, तो वे उसे ग्रहण नहीं करते। इस विषय में सफलता प्राप्त करने के लिए माता को धैर्य और अध्यवसाय से काम लेना पड़ेगा। यदि माता इसके लिए कुछ कष्ट न उठावेगी तो बच्चे को उस सीमा तक केवल तरल पदार्थों पर ही रखना पड़ेगा जर्हा तक कि तरल पदार्थ उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक होंगे। बच्चों को भोजन ठीक तरह से चबाने की शिक्षा देने में भी माता को कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, पर उसे धैर्य और अध्यवसाय से काम लेना चाहिए।

जिन बच्चों का दिमाग् ठीक न हो, उन्हें ठीक तरह से भोजन कराने के लिए नीचे लिखी सूचनाओं पर ध्यान देने से बहुत सहायता मिलेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि माता को स्नायु-सम्बन्धी दुर्बलता हो या उसके मनोविकार बहुत जल्दी प्रवल हो जाते

हों, तो स्वयं उसके स्वास्थ्य के विचार से भी और बच्चे के स्वास्थ्य के विचार से भी, यही अच्छा है कि वह बच्चे को अपना दूध न पिलावे। पर यदि स्वयं उसका स्वास्थ्य बिलकुल ठीक हो और बच्चा ही उसका दूध पीने के योग्य न हो तो उसे चाहिए कि वह पन्थ की सहायता से अपनी छातियों का दूध निकाल कर बच्चे को चम्मच की सहायता से पिलाया करे।

यदि कृत्रिम रूप से दूध पिलाने की आवश्यकता पड़े तो सदा इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस समय कितना दूध पिलाना आवश्यक है और कब उसमें कितना पानी मिलाना चाहिए। सब प्रकार के कृत्रिम भोजनों में सादा पानी या बाली का पानी मिलाना अधिक उत्तम है; और इस प्रकार के भोजनों में सबसे अच्छा गौ का ताजा दूध है।

जब बच्चा कुछ और बढ़ा हो जाय, तब उसे जई (ओटमील Oatmeal) का देखिया दिया जाना चाहिए; क्योंकि इससे उसकी हड्डियों और मस्तिष्क की रचना में अधिक सहायता मिलेगी।

ख़राब दिमाग़वाले बच्चों का प्रबन्ध—जिन बच्चों का दिमाग़ जन्म से ही ख़राब हो, उन्हें यदि ठीक तरह से शिक्षा न दी जाय और उनकी पूरी देख-नेख न की जाय तो उनकी सभी बात बिगड़ जाती हैं; वे किसी के वश में या व्यवस्थित नहीं रहते, अनेक प्रकार के हुक्मों और अपराध करने लगते हैं और उनके जीवन में न तो कोई व्यवस्था रह जाती है और न कोई उद्देश्य। इसलिए यह बात सबसे अधिक आवश्यक और महत्त्व की है कि ज्यों ही यह पता चले कि इस बच्चे का दिमाग़ ठीक नहीं है, त्यों ही आरम्भ से उसे ठीक तरह की शिक्षा देने और सुधारने में कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिए।

ख़राब दिमाग़वाले बच्चे की माता को यदि उसने अब तक न समझा हो तो अब यह समझ रखना चाहिए कि ऐसे बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों ही इष्टियों से बहुत कमज़ोर होते हैं और उनके

उतनी समझदारी की आशा नहीं करनी चाहिए जितनी समझदारी उतनी ही अवस्था के दूसरे स्वस्थ बच्चों में देखने से आती है। अतः शुभ फलों की प्राप्ति के लिए समय और शिक्षा की आवश्यकता होती है। माता-पिता अपने बच्चों को जितना समझदार बनाना या देखना चाहते हैं, उन्हे सब प्रकार से स्वस्थ होने की दशा में भी उतना समझदार बनाने के लिए इन दोनों बातों की आवश्यकता होती है। तब जिन बच्चों का दिमाग् ख़राब हो, उनके लिए तो इन बातों की और भी अधिक आवश्यकता होना स्वाभाविक है। माता का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मेरा बच्चा जीवन के साधारण कर्तव्यों का पालन करने के योग्य हो जाय और कुछ असमर्थता के रहते हुए भी जर्हा तक हो सके, प्रसन्नतापूर्ण और बपयोगी जीवन विता सके। यह उद्देश्य सिद्ध करने के लिए उसे बहुत अधिक सहानुभूति, निष्ठा और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। इस प्रकार के मनोभावों से उसमें दया उत्पन्न होती है और वह उस अभागे बच्चे की अवस्था करने में दैर्घ्य और अध्यवसाय से काम लेने के योग्य होती है। यह सबसे पहली बात है, जिस पर हम ज़ोर देना चाहते हैं। बिना इन गुणों के सफलता प्राप्त करना असम्भव है। मतखब यह कि माता अपने ऐसे बच्चे की शिक्षा के लिए जितना ही अधिक कष्ट उठाती है, वह बच्चा उतनी ही अधिक उज्ज्ञाति करता है। यदि माता अपने बच्चों की दिनचर्या आदि के सम्बन्ध में कुछ अच्छे नियम बना लेगी और उन नियमों का पूरी तरह से पालन करेगी, तो वह अपने काम में बहुत कुछ चिन्ताओं और कष्टों से बच जायगी।

सबसे पहले बच्चे को यह सिखलाने की आवश्यकता होती है कि वह मल और मूत्र आदि का लाग ठीक तरह से किया करे। जो बच्चा साधारणतः सब प्रकार से स्वस्थ होगा, उसे ये सब बातें सिखलाने की कोई आवश्यकता न होगी। परं जिसका दिमाग् ठीक न होगा, उसे सिखलाने की आवश्यकता होगी। साधारणतः सभी बच्चे

कुछ लिखित अन्तरों पर मल और मूत्र का लाग करते हैं। ख़ुराब दिमाग़वाले बच्चे की माता को चाहिए कि ध्यानपूर्वक देखकर यह पता लगावे कि प्रायः उसका बच्चा किस समय और किसने अन्तर पर मल-मूत्र करता है; और तब उतने ही अन्तर पर और उसी समय उसे पाख़ाना फिरावे और पेशाब करावे। माता के ऐसा करने से बच्चा भी कुछ कुछ प्रथम करने लगेगा और इससे उसे आदत पढ़ने में सहायता मिलेगी। यदि वह इस विषय में पूरे धैर्य और अध्यवसाय से काम लेगी, तो उसे बच्चे को मल-मूत्र का लाग करने और उनको बश में रखने की शिक्षा देने में सफलता होगी और वह उन सब कठिनाइयों और कष्टों से बच जायगी जो इस सम्बन्ध में बच्चे को गन्दी आदतें पढ़ने के कारण बढ़ाने पड़ते हैं।

माता को यह ध्यान रखना चाहिए कि साधारणतः स्वस्थ बच्चा कई काम और बातें बिना सिखाये आपसे आप सीख लेता है, पर ख़ुराब दिमाग़वाले बच्चे को वे सब बातें और काम सिखाने की आवश्यकता होती है; और यदि माता बराबर अध्यवसाय से काम लेती रहे तो समय पाकर वह बच्चे को अच्छी तरह वे सब बातें सिखासकती है। उसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि प्रथम करते ही बच्चा सुधरने लगेगा। यह तो हर बात को बार बार दोहराने और लगातार समझाने दुम्भाने से ही होगा। इसलिए माता को चाहिए कि पहले यह पता लगावे कि बच्चा कौन सा काम सहज में आपसे आप कर लेता है; और उसे बार बार वही काम करने के लिए उत्साहित करती रहे। इससे बच्चे में अपने आप पर विश्वास उत्पन्न होगा और उसे कोई काम करने और किसी के लिए प्रयत्न करने में आनन्द आने लगेगा। यदि वह आप ही कोई काम करने का प्रयत्न करे और पूरा पूरा प्रथम करके उसमें सफलता प्राप्त कर ले तो यही उसके लिए एक बहुत अच्छी शिक्षा हो जायगी। जो काम बच्चा कर सकता हो माता को उसके लिए वह काम नहीं करना चाहिए। जैसे मुझमुझा हिलाना,

सीटी बजाना या रबर का गुब्बारा उड़ाना आदि ऐसे काम हैं जो बच्चा आप ही कर सकता है। ऐसे काम माता को नहीं करने चाहिए। यदि बच्चा इस प्रकार के खिलौनों से खेलना चाहे तो उसे इस प्रकार के कामों के लिए उत्साहित और प्रवृत्त करना चाहिए। इसके बाद उसके सामने कोई कठिन काम रखना चाहिए; पर ऐसा कठिन काम नहीं रखना चाहिए जो उसकी सामर्थ्य के बाहर हो। यद्योंकि यदि उससे वह काम न हो सकेगा तो उसका उत्साह भंग हो जायगा और इस प्रकार उसे मानसिक शिक्षा देने का जो वास्तविक उद्देश्य है, वह पूरा न हो सकेगा। ज्यों ज्यों वह बढ़ा होता जायगा, ज्यों ज्यों उसमें अधिक समझ आती जायगी, उसे अपने आस-पास की चीज़ों से अधिक प्रेम होने लगेगा और वह अधिक काम करने का प्रयत्न करेगा। यह ठीक है कि साधारण बच्चे जितनी जल्दी और सन्तोषजनक रूप से कोई काम सीखते हैं, उतनी जल्दी और सन्तोषजनक रूप से वह नहीं सीख सकेगा, पर निरन्तर प्रयत्न करते रहने से अन्त में सफलता अवश्य होगी। माता को यह स्मरण रखना चाहिए कि साधारण बच्चों को किसी काम के लिए प्रयत्न करने का जितना शौक होता है, उतना शौक ख़राब दिमाग़वाले बच्चों को नहीं होता। माता को चाहिए कि बच्चे को उत्तेजित करती रहे और उसमें शौक पैदा करे। फिर उसके लिए जितना ही परिश्रम किया और कष्ट बढ़ाया जायगा, उतनी ही अधिक सफलता होगी।

माता को चाहिए कि वह ऐसे बच्चे को वही बातें सिखावे जिनसे किसी प्रकार की हानि न हो सकती हो। उसे उपद्रव या उत्पात करना नहीं सिखाना चाहिए। स्वस्य बच्चों का बहुत शोर मचाना माता को अच्छा नहीं लगता। ख़राब दिमाग़वाले बच्चे को भी बहुत शोर नहीं करने देना चाहिए।

ख़राब दिमाग़वाले बच्चों की उपवस्था करने में सबसे अधिक मुख्य सिद्धान्त यह है कि उनमें कोई बुरी आदत नहीं पढ़ने देनी

चाहिए। माता का उद्देश्य सदा यह रहना चाहिए कि बच्चा अच्छी आदतें सीखे और बुरी आदतें न सीखने पावे। डा० थाम्सन कहते हैं—“तुम्हे सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे में बुरी आदतें न पढ़ने पावें, क्योंकि जब एक बार बच्चे में बुरी आदतें पढ़ जाती हैं, तब तुम्हारे ख़राब दिमाग़वाले बच्चे की वे आदतें छुड़ाना ऐसे बच्चों की ख़राब आदतें छुड़ाने की अपेक्षा बहुत अधिक कठिन होता है जिन्हें दूसरी बाहरी चीज़ों का भी शौक होता है।”

बच्चों के लिए खेल-कूद का बहुत अधिक महत्व है। खेलने-कूदने से बच्चों की बुद्धि भी बढ़ती है और उनका चरित्र भी बनता है। एक पुरानी कहावत है कि जो बच्चा दिन-रात काम ही करता रहता है और खेलता-कूदता नहीं, वह बोदा हो जाता है। ख़राब दिमाग़वाले बच्चों के सम्बन्ध में यह बात और भी अधिक सत्य है। यदि इस प्रकार के बच्चे आपसे आप कोई काम करने या खेलने-कूदने का प्रयत्न करें तो इसे बहुत अच्छा लक्षण समझना चाहिए और उसके लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए। इस सम्बन्ध से माता-पिता को यह स्मरण रखना चाहिए कि साधारण और स्वस्थ बच्चों को देखकर ख़राब दिमाग़वाले बच्चे अपनी त्रुटियों का अनुभव करते हैं जिससे और आगे प्रयत्न करने में उन्हें उत्साह नहीं होता। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जहाँ तक हो सके ख़राब दिमाग़वाले बच्चों का अच्छे बच्चों से संग-साथ न होने देना चाहिए, जिसमें उन पर इस प्रकार के बुरे प्रभाव न पढ़ने पावें।

माता को यह स्मरण रखना चाहिए कि ख़राब दिमाग़वाले बच्चों को बोलना सीखने में देर लगती है। किसी हद तक इसका कारण यह होता है कि वे बातों पर ध्यान नहीं देते। अपर यह बतलाया जा सका है कि बच्चे को जिस चीज़ का शौक हो या उसे जो चीज़ अपनी ओर खीचती हो, उसी के द्वारा उसके ध्यान देने के योग्य बनाना चाहिए। मानसिक शक्तियों के उत्पन्न और विकसित करने

के लिए यह बात बहुत ही आवश्यक है। बच्चे को बोलना सिखाने के लिए माता को बहुत अध्यवसाय दिखलाना पड़ेगा। पर जब एक बार बच्चे के मुँह से शब्दों का उच्चारण कराने में उसे सफलता हो जायगी, तब उसकी बोलने की शक्ति अवश्य ही कुछ बढ़ेगी; यह बात दूसरी है कि उसकी बोली का रूप बहुत स्पष्ट न हो। जीवन में साधारणतः जिन चीज़ों का काम पड़ता है, माता को चाहिए कि उन चीज़ों की ओर बच्चे का ध्यान बराबर दिखाती रहे, बार बार उसके सामने उस चीज़ का नाम दोहराती रहे, उसे दिखलाई हुई चीज़ों को पहचानना सिखलावे और उनके नामों का उच्चारण करने के लिए उसे उत्तेजित करती रहे। इससे वह चीज़ों पर ध्यान भी देने लगेगा और शब्दों के उच्चारण का भी प्रयत्न करने लगेगा। माता जो कुछ कहेगी, उच्चा उस पर ध्यान न देगा; पर केवल इसी कारण उसका उत्साह भझ न होना चाहिए; अद्वित उसे बराबर चीज़ों के नाम बताते रहना चाहिए और जबरदस्ती उनकी ओर उसका ध्यान दिलाना चाहिए। साधारणतः स्वस्थ बच्चे को भी शब्दों का अर्थ बतलाने और समझाने के लिए उसके सामने शब्द बार बार दोहराने पड़ते हैं। फिर खराब दिमाग़ वाले बच्चे के लिए तो इस बात का और भी अधिक प्रयत्न होना चाहिए।

बच्चों का ध्यान शब्दों की ओर दिलाने के लिए सबसे पहले संगीत के स्वरों का व्यवहार किया जा सकता है; और तब उससे छोटे और सहज शब्द कहे जा सकते हैं। उन शब्दों को बराबर दोहराते रहना चाहिए और विशेषतः सबेरे के समय और रात को सोने से पहले वे शब्द उसे बार बार सुनाने चाहिए। उदाहरण के लिए “ऊपर” और “नीचे” सरीखे शब्द संकेत या गति आदि की सहायता से समझाने चाहिए। ऐसा करने से बच्चे की बोलने की शक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी।

डा० थाम्सन बतलाते हैं—“ज्यों ज्यों बच्चे की समझ बढ़ती जाय, त्यों त्यों माता को चाहिए कि उसका आत्म-संयम बढ़ाकर और

जहाँ तक हो सके, उसे स्वयं इसी पर छोड़कर उसका चरित्र संघटित करने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करती रहे। वह अपना काम जितना आप करेगा, उतना ही अधिक प्रसन्न होगा; और उसके उदास या दुःखी रहने का अवसर उतना ही कम हो जायगा। ज्यों ज्यों वह बढ़ा होता जाय, यों यों उसे यह समझाते चलना चाहिए कि यथापि तुम और लड़कों के समान नहीं हो, तो भी इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम जो छोटे छोटे काम कर सकते हो, वह काम भी न करो।

धैर्य, उत्तम स्वभाव और उत्तम आचरण आदि ऐसी और भी बातें हैं जिनमें बच्चे को यह सिखलाया जा सकता है कि वह अपने आपको वश में रखे। लेकिन दूसरे लोगों को यह नहीं चाहिए कि वे बार बार उसे छेड़ या खिलाकर उसे विकट परीक्षा में डाला करें।

सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे से जो कुछ कहा जाय, वह तुरन्त वह काम करे। पर इसके लिए माता को ऐसा प्रयत्न और अवहार करना चाहिए कि बच्चा आज्ञाओं का जो पालन करे, वह माता को केवल प्रसन्न करने की इच्छा से करे; इस ढर से न करे कि यदि मैं आज्ञा का पालन न करूँगा तो मुझे उसका कुछ दंड भोगना पड़ेगा।

बच्चे का चरित्र घटित करने और उसे प्रसन्न रखने के लिए यदि उसे अपने आस-पास में रहनेवाले लोगों के साथ प्रेम करना सिखलाया जा सके तो यह बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चा दूसरे लोगों यहा तक कि पशु-पक्षियों और गुड़े-गुड़ियों आदि से हृदय से प्रेम करता है, उसका जीवन बहुत प्रसन्नापूर्ण और अच्छा हो जाता है।

खराब दिमाग़वाले बच्चों में इच्छा-शक्ति या प्रेरक-शक्ति ग्रा तो बहुत कम होती है और या विलक्ष्य होती ही नहीं। इसी लिए डा० थार्म्सन ऐसे बच्चों की माताओं से कहते हैं—“यदि प्रकृति ने तुम्हारे बच्चे को कोई काम करने की और उस पर ध्यान देने की शक्ति अभी तक न दी हो तो वह कमी तुम्हारी शिक्षा और ग्रोसाहन से

पूरी होनी चाहिए। जब तक बच्चा अपने अंगों और हृन्दियों का स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग न करेगा, तब तक उसका दिमाग़ नहीं बढ़ेगा। उस प्राकृतिक कमी को पूरा करना मात्रा के भ्रेम और शक्ति का काम है। उसमें जो शक्ति नहीं है, वह शक्ति उसमें लाना तुम्हारा काम है।”

खराब दिमाग़वाले बच्चों को शिखा देनेवाले स्कूलों में काम करके जिन लोगों ने अच्छा अनुभव प्राप्त किया है, उनका कहना है कि खराब दिमाग़वाले बच्चों को सुधारने का एक बहुत अच्छा उपाय यह है कि उनकी प्रशंसा की जाय। ऐसे बच्चों का उत्साह कभी भड़क नहीं करना चाहिए, बल्कि मानाओं को चाहिए कि जब जब प्रशंसा करने का कोई ठीक अवसर आवे, तब तब बच्चे की खूब प्रशंसा करनी चाहिए; क्योंकि इससे उन्हें आगे और भी उसी तरह के और अच्छे काम करने की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत यदि उनका उत्साह भंग किया जायगा, उन्हें मिडकिर्या दी जायेंगी और उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जायगा, तो परिणाम उलटा ही होगा।

इस विषय में डा० थार्म्सन यह सलाह देते हैं—“जब जब बच्चा कोई अच्छा काम करे, तब तब तुम उसकी प्रशंसा करना अपना एक नियम सा बना लो; और उसे यह दिखलाया करो कि जब उसे किसी काम में सफलता होती है, तब तुम कितनी प्रसन्न होती हो। जो काम थोड़े कठिन हो, वे काम करने के लिए उसे विशेष रूप से उत्साहित करना चाहिए। पर जो काम इतने कठिन हों कि उससे हो ही न सकते हो, उन कामों के लिए उससे बार बार प्रयत्न नहीं कराना चाहिए। यदि उसे कोई काम करने में बिलकुल सफलता न होगी तो उसका मन छोटा हो जायगा। पर जिस काम में उसे सफलता होगी, उससे उसको बहुत लाभ पहुँचेगा—उसका बहुत सुधार होगा। पर वह काम उपद्रव या उत्पात का नहीं होना चाहिए।”

यदि ठीक समय पर ऐसे बच्चों की उचित प्रशंसा की जाय और उन्हे कुछ छोटा-मोटा हनाम भी दिया जाय तो उनमें से अधिकांश

बच्चों को बहुत लाभ पहुँचेगा। बच्चे की अवस्था का सुधार करने में माता के प्रेम का बहुत ही अद्भुत ग्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत यदि उस पर ध्यान न दिया जायगा और उसके साथ सहानुभूति न रखी जायगी तो उसकी वह आयोग्यता स्थायी हो जायगी—कभी दूर ही न होगी। यदि आरम्भ में परिणाम सन्तोषजनक न हों तो भी माता को बराबर उद्योग करते चलना चाहिए। और ऐसा अध्यवसाय केवल प्रेम से ही आ सकता है।

॥० क्लासर्सन कहते हैं—“प्रेम से ही संसार चलता है, प्रेम के कारण ही हम लोग ख़राब दिमाग़वालों की देख-रेख में प्रवृत्त होते हैं। जे बच्चे हमसे भी प्रेम करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भी प्रेम करते हैं; इसी लिए हम भी जहाँ तक हो सकता है, उनकी देख-रेख करते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं। जिस आदमी में प्रेम का भाव न हो या बहुत कम हो, उसकी और और शक्तियाँ चाहे कितनी ही विकसित करें न हों, पर फिर भी वही सबसे अधिक दया का पात्र है और उसी की दशा सबसे अधिक दुःखी करनेवाली है। ऐसे लोग नैतिक दृष्टि से बहुत ही नीच या तुच्छ और घृणा के बोग्य हैं। यदि प्रेम की महान् शक्ति को प्रबल बनाने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न न किया जाय तो यह शक्ति-सदा के लिए नष्ट हो जायगी। जो आदमी ख़राब दिमाग़वाले बच्चों से घृणा करता हो, उनकी उपेक्षा करता हो अथवा उन्हें ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए विवश करता हो जो उनकी इस शक्ति के विकास में बाधक हों, उस आदमी के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि उसके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाय और उसे समुद्र में डुबा दिया जाय।”

यह एक बहुत ही विकट समस्या है और इस बोग्य नहीं है कि इसका सारा भार बेचारी दुःखी और विकल माताओं पर ही छोड़ दिया जाय। समाज-शास्त्र की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्त्व की

और आवश्यक समस्या है और सरकार को इस पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए; और उसे या तो शिक्षा-विभाग के द्वारा और या किसी दूसरी संघटित व्यवस्था के द्वारा राष्ट्र के स्तराव दिमाग़ बाले बच्चों की टीक और उपयुक्त शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। इस विशाल महादेश के सभी स्थानों में और कम से कम हर प्रान्त में एक ऐसी विशेष संस्था या विद्यालय स्थापित होना चाहिए जिसमें मानवजाति के इस असहायवर्ग को उपयोगी ढंग से काम में लागाया जा सके।

परिशिष्ट (क)

एलब्यूमिन का पानी (Albumin Water) बनाना—

एक ताज़ा अंडा खेकर उसकी सफेदी और ज़रदी दोनों अलग करनी चाहिए। सफेदी एक कटोरी में रखकर उसमें कुछ कुनकुना या साधारण गरम पानी डालना चाहिए और उसे कटि या इसी प्रकार की किसी और चीज़ से खूब फेटना चाहिए। तब उसमें पहले से उबाल कर ढंडा किया हुआ इतना पानी मिलाना चाहिए कि वह सब मिलकर पाव भर के कृतीब हो जाय। तब मलमल में छानकर स्वाद के अनुसार उसमें नमक मिलाना चाहिए।

परिशिष्ट (ख)

बार्ली का पानी (Barley Water) बनाना—

चाय के दो छोटे चम्मच भर धोया हुआ बढ़िया पर्फूम बार्ली पाव भर ठंडे पानी में मिलाना चाहिए और उसे आग पर रखकर उसका एक तिहाई पानी जला देना चाहिए और तब उसे मलमल में छान लेना चाहिए। यह पानी दिन में दो बार तैयार करना चाहिए; क्योंकि यह कुछ देर तक रखने के बाद खट्टा हो जाता है।

परिशिष्ट (ग)

चावल का पानी बनाना—

दो बड़े चम्मच भर चावल लेकर पहले उसे धोना चाहिए और उसके बाढ़ एक बोतल गरम पानी में उसे डालकर तीन बंटे तक भीरने देना चाहिए। फिर उसे एक बंटे तक बहुत ही धीमी आच पर पकाकर कपड़े से छान लेना चाहिए।

परिशिष्ट (घ)

साबुन और पानी का एनिमा लेना। आवश्यक सामग्री—

- (१) एक इरीगेटर जिसमें एक बड़ी बोतल भर पानी आ सके।
- (२) डेढ़ गज़ लम्बी रवर की एक नली।
- (३) हड्डी या शीशे की बनी हुई एक टोटी जो गुदा के अन्दर डाली जाती है।
- (४) रवर की नाली में पानी रोकने का क्लैम्प (Clamp)।
- (५) एक चिलमची या खुले सुँह का बरतन।
- (६) एक टिकिया साबुन।
- (७) थोड़ा सा गरम किया हुआ पानी जो कुछ ढंडा हो गया हो।

बरतन में गरम पानी डालकर और उसमें थोड़ा साबुन धोलकर उसका काग बना लेना चाहिए। साबुन का वह पानी एक बोतल भर लेकर इरीगेटर में डालना चाहिए और वह इरीगेटर विस्तर से डेढ़ ढो हाथ की बैंचाई पर टांग देना चाहिए। और तब नली की टोंटी सोलकर उसमें का कुछ पानी बहा देना चाहिए जिसमें रवर की नली के अन्दर की हड्डा निकल जाय।

विस्तर पर बाईं करचट लेटकर चूतड़ और कमर के नीचे एक तौलिया या मोमजामा बिड़ा लेना चाहिए जिसमें पानी विस्तर पर न

गिरने पावे, उसी पर रुका रह जाय। इसके बाद एनिमा की टोंटी में तेल या और कोई चिकना पदार्थ लगाकर वह टोंटी अपने हाय से गुड़ा के अन्दर कर लेनी चाहिए और तब पानी धीरे धीरे वहकर अन्दर जाने देना चाहिए। दीच दीच में रवर की नली या क्लैम्प को ढाकते रहना चाहिए जिसमें पानी नियमित रूप से गुड़ा के अन्दर जाता रहे, आवश्यकता से अधिक न चला जाय।

जब सारा पानी अन्दर जा चुके, तब टोटी गुड़ा में से विकाल देनी चाहिए। चुपचाप पढ़े रहना चाहिए और वह पानी दृस मिनट तक गुड़ा के अन्दर रहने देना चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो पाखाना फिरने का बरतन चूतड़ के नीचे रख लेना चाहिए। इसमें बहुत ज़ोर नहीं लगना चाहिए।

परिशिष्ट (च)

लाइसोल लोशन (Lysol Lotion) बनाना—

ग्रस्व के समय साधारणतः लो लाइसोल लोशन तैयार किया जाता है, उसमें सौ हिस्से पानी में दो हिस्से लाइसोल होना चाहिए। साधारणतः आधी बोतल या आध सेर के लगभग कुच्छ गरम या कुनकुना पानी लेना चाहिए और उसमें एक छोटे चम्मच भर लाइसोल मिला देना चाहिए।
